



Repelente de Aves

Produce Repelencia y Aversión a la Alimentación.

Efecto Sensorial



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

Registro RSCO-REP-1801-X0005-334-40.0

Uso: Agrícola.
Ingrediente Activo: Antranilato de metilo.
Composición: 40.00%, equivalente a 432.0 g i.a./L.
Formulación: Concentrado Dispersable.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Precaución).

El antranilato de metilo se encuentra en forma natural en semillas de uvas, conocido por su aroma floral - frutal, Generalmente Reconocido como Seguro (GRAS) por la U.S. Food and Drug Administration, no tóxico y exento del requisito de tolerancia de residuos en alimentos, utilizado para el manejo integrado de aves en la agricultura. A través del aroma, estimula e irrita las membranas mucosas y quimiorreceptores (nervio trigémino, olfativo y gustativo), produciendo repelencia y aversión a la alimentación, efecto sensorial que induce a la reubicación espacial pacífica no letal para aves. Es un producto que no se absorbe en el cuerpo del ave, actúa por inhalación e ingesta al tener contacto o picotear las superficies tratadas, generando rechazo sin causar daño fisiológico; es biodegradable, amigable con el ambiente, seguro para los usuarios, animales domésticos, y no afecta a los polinizadores (abejas y abejorros) ni interfiere con su actividad.

Patrón de Uso

Tural® es un repelente de origen natural, formulado en solución oleosa de liberación sostenida, listo para diluirse directamente en agua y aplicarse por aspersión directa o en mezcla, durante la madurez de los productos de consumo. Es un producto sin efecto letal para las aves, solo tiene efecto irritante.

Cultivo	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Arroz	Gorrión común (<i>Passer domesticus</i>)	0.5 a 1.5 L/ha	2	14	600 L/ha
Avena					
Cebada					
Centeno	Tordo (<i>Molothrus ater</i>)				
Maíz					
Sorgo					
Trigo					
Triticale					
(SL)					
Arándano	Gorrión común (<i>Passer domesticus</i>)	2.0 - 3.0 mL/L de agua	3	1, 22	650 L/ha
Frambuesa					
Fresa					
Grosella	Tordo (<i>Molothrus ater</i>)				
Kiwi					
Vid					
Zarzamora					
(SL)					

Tiempo de reentrada: 4 h portando el equipo de protección personal, y 12 h sin protección personal.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (SL= Sin Límite).

Límite máximo de residuos: Exento.

Intervalo entre aplicaciones: 1, 14 y 22 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usar para una suspensión uniforme. Utilice agua limpia para la aspersión. No lo mezcle con agua de elevada dureza y acondicione el agua de aspersión a un pH de 7.0. Utilice recipientes plásticos o fibra de vidrio para realizar la mezcla. Vierta la mitad de agua a utilizar en un contenedor, agregue la dosis total de producto y posteriormente el agua restante. Agite para lograr una mezcla homogénea. En cada ocasión que recargue el aspersor, deberá agitar la mezcla del contenedor. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.

Aplicación del producto: En gramíneas, realizar 2 aplicaciones foliares dirigidas a la panoja y follaje a intervalos de 14 días, la primera aplicación cuando inicie la maduración de la panoja. En Berries, realizar 3 aplicaciones foliares; con intervalo entre la primera y segunda aplicación de 1 día, y entre la segunda y tercera de 22 días; realizar la primera aplicación cuando inicie la maduración de frutos.

Compatibilidad: No mezclar con otros productos. En caso necesario, realizar una prueba de compatibilidad física previa a la aplicación.


Contraindicaciones: No lo exponga directamente a los rayos solares. Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO₃).
- Acondicione el agua para un pH de 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con alta temperatura, baja humedad relativa y presencia de humedad superficial.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Su efecto es temporal y se recomienda realizar aplicaciones periódicas considerando los hábitos de aves.
- Brinda niveles adicionales y espectro de control para evitar daños por aves durante la germinación, etapa de planta y la madurez de los productos de consumo.
- Aplicar con equipos pulverizadores convencionales para disuadir aves en estructuras o en aplicación directa sobre sus fuentes de alimento.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M), con tamaño de gota de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en los sitios donde se desee repeler las aves.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimia.com

Elaboración: 04-Feb-2026.
 Actualización: 04-Feb-2026.
 Versión: 01.
 Página: 1 de 1.