



Uso Urbano

Insecticida
Contacto



FICHA TÉCNICA - Ultralite BEA B

RSCO-URB-INAC-0195-X0020-009-0.40

Clasificación: Plaguicida Microbiano.
Ingrediente Activo: *Beauveria bassiana*.
Composición: 0.40% en peso, equivalente a 3.678 g i.a./L (1.0 x 10¹¹ UFC/L).
Formulación: Concentrado Emulsionable.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Verde).

Patrón de Uso

Insumo para el control de plagas en áreas urbanas,
predios baldíos y vías de ferrocarril

Plaga	Nombre científico	Dosis
Cucaracha	<i>Blattella germanica</i>	5 ml/10 g de cebo alimenticio.
Hormiga	<i>Atta</i> spp.	10 a 15 ml/L de agua

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque la aspersión.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 6 a 7, con dureza inferior a 100 ppm. La mezcla del producto con el agua debe realizarse cuando ésta tenga el pH adecuado. Utilice recipientes de plástico para realizar la mezcla. Vierta el producto directamente con el volumen total de agua manteniendo agitación constante para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Agite la mezcla cada vez que cargue el equipo de aplicación. Aplique al observar las primeras infestaciones, siempre por la tarde para no exponer al hongo a condiciones de temperatura y de radiación adversas. Procure que el producto tenga contacto con los insectos aplicando sobre ellos; para el control de cucarachas deberá aplicar sobre cebos que contengan alimento - azúcar glas - agua - ácido bórico (0.2 g), colocándolo en los sitios donde se encuentran o refugian las cucarachas, mientras que para el para el control de hormigas se deberá aplicar en solución asperjado sobre las plantas de las que se alimenta y directamente en el orificio de entrada del nido.

Compatibilidad: Compatible con argemónina, berberina, ricinina, α -Terthienil, aminoácidos, extracto de *Azadirachta indica*, *Bacillus subtilis* y *Bacillus thuringiensis*. No debe ser mezclado con fungicidas ni productos de reacción alcalina o que alteren el rango de pH de la mezcla. Evite el uso de coadyuvantes iónicos. Cuando se desconozca su compatibilidad con otros productos, se recomienda realizar una prueba previa a la aplicación.


Contraindicaciones: No lo exponga directamente a los rayos solares. Evite temperaturas superiores a los 30 °C durante tiempos prolongados. Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración a 3 °C a 4 °C sin llegar a congelarlo. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO₃).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 7.

Orden de Mezcla del Producto




- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M), de 136 μ m a 218 μ m (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en los tejidos donde se localiza la plaga.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

02-Feb-2024.
02-Feb-2024.
01.
1 de 1.