

Geometria

Aula 05

Gustavo Ale

EduCursinho - Faculdade de Engenharia

gustavo.engca@gmail.com

19 de Setembro de 2021

Sumário

- 1 Aulas anteriores
 - Revisão
- 2 Lei dos Cossenos
- 3 Exemplos
- 4 Exemplos

Até agora vimos como trabalhar com problemas que podem ser decompostos em um ou mais triângulos retângulos, tanto através das funções trigonométricas e suas relações com o triângulo retângulo, como também utilizando do Teorema de Pitágoras.

Relações trigonométricas

$$\text{sen}(\theta) = \frac{CO}{hip}$$

$$\text{cos}(\theta) = \frac{CA}{hip}$$


$$\text{tg}(\theta) = \frac{CO}{CA}$$

Teorema de Pitágoras

$$a^2 = b^2 + c^2$$


Lei dos Cossenos

Assim como o Teorema de Pitágoras, a lei dos Cossenos assemelha os comprimentos dos lados do triângulo, sendo possível determinar qualquer uma de suas grandezas quando se sabe o comprimento de ao menos 2 lados e 1 ângulo.



Enquanto o Teorema de Pitágoras funciona apenas para triângulos retângulos, a Lei dos Cossenos pode ser aplicada para **qualquer triângulo**.

Lei dos Cossenos



A Lei dos Cossenos é composta por 3 equações, sendo elas:


$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(\alpha)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos(\beta)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(\gamma)$$

Mas como decorar essa joça?

Lei dos Cossenos



Supondo que queremos o comprimento a , então começamos com a^2 sendo igual a soma do quadrado das demais medidas. Depois subtraímos por 2 vezes o produto das demais medidas e o cosseno do ângulo oposto à aresta a , no caso o ângulo α

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(\alpha)$$

Isso serve para qualquer um dos lados.

Lei dos Cossenos

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(\alpha)$$


$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos(\beta)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(\gamma)$$


Exemplos

Exemplo 1.

Dado o triângulo abaixo, calcule o comprimento de x :



Exemplos



Vamos começar por escrever a equação que rege esse problema.

$$x^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos(60^\circ)$$

$$x^2 = 25 - 24 \cos(60^\circ)$$

$$x^2 = 25 - \frac{24}{2} = 25 - 12 = 13$$


$$x = \sqrt{13} \approx \boxed{3,60}$$

Exemplos


Podemos também encontrar o valor de um ângulo dado as dimensões do triângulo.

Exemplo 2.

Dado o triângulo abaixo, calcule o ângulo α :



Exemplos



$$7^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \cos(\alpha)$$

$$49 = 25 + 9 - 30 \cdot \cos(\alpha)$$

$$49 - 34 = -30 \cdot \cos(\alpha)$$

$$15 = -30 \cdot \cos(\alpha)$$

$$-\frac{15}{30} = \cos(\alpha)$$

$$\cos(\alpha) = -\frac{1}{2}$$

$$\alpha = 120^\circ$$

Perguntas?