

# Introdução à Probabilidade e Estatística

## Distribuição conjunta

Carlos Trucíos  
[ctruciosm.github.io](https://ctruciosm.github.io)

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Semana 9

# Introdução

# Introdução

- Até agora, estudamos modelos probabilísticos de uma única variável aleatório

# Introdução

- Até agora, estudamos modelos probabilísticos de uma única variável aleatório
- Porém, um mesmo experimento aleatório pode envolver várias variáveis de interesse

# Introdução

- Até agora, estudamos modelos probabilísticos de uma única variável aleatório
- Porém, um mesmo experimento aleatório pode envolver várias variáveis de interesse
- Por exemplo

# Introdução

- Até agora, estudamos modelos probabilísticos de uma única variável aleatório
- Porém, um mesmo experimento aleatório pode envolver várias variáveis de interesse
- Por exemplo
  - $X$  e  $Y$  podem ser altura e peso

# Introdução

- Até agora, estudamos modelos probabilísticos de uma única variável aleatório
- Porém, um mesmo experimento aleatório pode envolver várias variáveis de interesse
- Por exemplo
  - $X$  e  $Y$  podem ser altura e peso
  - $X$ ,  $Y$  e  $Z$  podem ser salário mensal, gasto mensal com educação e valor da fatura do cartão

# Introdução

- Até agora, estudamos modelos probabilísticos de uma única variável aleatório
- Porém, um mesmo experimento aleatório pode envolver várias variáveis de interesse
- Por exemplo
  - $X$  e  $Y$  podem ser altura e peso
  - $X$ ,  $Y$  e  $Z$  podem ser salário mensal, gasto mensal com educação e valor da fatura do cartão
  - $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  e  $X_4$  podem ser o total em compras feito com os cartões da bandeira Visa, MasterCard, American Express e Elo.



# Introdução

- Até agora, estudamos modelos probabilísticos de uma única variável aleatório
- Porém, um mesmo experimento aleatório pode envolver várias variáveis de interesse
- Por exemplo
  - $X$  e  $Y$  podem ser altura e peso
  - $X$ ,  $Y$  e  $Z$  podem ser salário mensal, gasto mensal com educação e valor da fatura do cartão
  - $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  e  $X_4$  podem ser o total em compras feito com os cartões da bandeira Visa, MasterCard, American Express e Elo.
  - $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  e  $X_5$  podem sexo, idade, IMC, quantidade de glóbulos brancos e quantidade total de colesterol no sangue.

# Introdução

- Até agora, estudamos modelos probabilísticos de uma única variável aleatório
- Porém, um mesmo experimento aleatório pode envolver várias variáveis de interesse
- Por exemplo
  - $X$  e  $Y$  podem ser altura e peso
  - $X$ ,  $Y$  e  $Z$  podem ser salário mensal, gasto mensal com educação e valor da fatura do cartão
  - $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  e  $X_4$  podem ser o total em compras feito com os cartões da bandeira Visa, MasterCard, American Express e Elo.
  - $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  e  $X_5$  podem sexo, idade, IMC, quantidade de glóbulos brancos e quantidade total de colesterol no sangue.
  - etc

# Introdução

- Até agora, estudamos modelos probabilísticos de uma única variável aleatório
- Porém, um mesmo experimento aleatório pode envolver várias variáveis de interesse
- Por exemplo
  - $X$  e  $Y$  podem ser altura e peso
  - $X$ ,  $Y$  e  $Z$  podem ser salário mensal, gasto mensal com educação e valor da fatura do cartão
  - $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  e  $X_4$  podem ser o total em compras feito com os cartões da bandeira Visa, MasterCard, American Express e Elo.
  - $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  e  $X_5$  podem sexo, idade, IMC, quantidade de glóbulos brancos e quantidade total de colesterol no sangue.
  - etc

# Introdução

- Até agora, estudamos modelos probabilísticos de uma única variável aleatório
- Porém, um mesmo experimento aleatório pode envolver várias variáveis de interesse
- Por exemplo
  - $X$  e  $Y$  podem ser altura e peso
  - $X$ ,  $Y$  e  $Z$  podem ser salário mensal, gasto mensal com educação e valor da fatura do cartão
  - $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  e  $X_4$  podem ser o total em compras feito com os cartões da bandeira Visa, MasterCard, American Express e Elo.
  - $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  e  $X_5$  podem sexo, idade, IMC, quantidade de glóbulos brancos e quantidade total de colesterol no sangue.
  - etc

O estudo desse conjunto de variáveis é o interesse desta aula

# Distribuição conjunta

## Distribuição conjunta: Caso discreto

### Função de probabilidade conjunta

Sejam  $X$  e  $Y$  duas v.a. discretas definidas no espaço amostral  $S$ . A função de probabilidade conjunta  $p(x, y)$  é definida por

$$p(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

- $p(x, y) \geq 0$
- $\sum_x \sum_y p(x, y) = 1$

Assim, para qualquer conjunto  $A$  de pares de valores  $(x, y)$ ,

$$P((X, Y) \in A) = \sum_{(x,y) \in A} p(x, y)$$

## Distribuição conjunta: Caso discreto - Exemplo

- 1 A função de probabilidade conjunta das v.as  $X$  e  $Y$  é apresentada na seguinte Tabela

$x / y$	1	2	3	4
1	0.1	0.0	0.1	0.0
2	0.3	0.0	$k$	0.2
3	0.0	0.2	0.0	0.0

- Qual o valor de  $k$ ?
- Calcule:  $P(X \geq 2, Y \geq 3)$
- Calcule:  $P(X = 2)$

## Distribuição conjunta: Caso discreto - Exemplo

x / y	1	2	3	4
1	0.1	0.0	0.1	0.0
2	0.3	0.0	k	0.2
3	0.0	0.2	0.0	0.0

- Sabemos que  $\sum_x \sum_y p(x, y) = 1 \gg \gg k = 0.1$



## Distribuição conjunta: Caso discreto - Exemplo

x / y	1	2	3	4
1	0.1	0.0	0.1	0.0
2	0.3	0.0	k	0.2
3	0.0	0.2	0.0	0.0

- Sabemos que  $\sum_x \sum_y p(x, y) = 1 \ggg k = 0.1$
- $P(X \geq 2, Y \geq 3) = p(2, 3) + p(2, 4) + p(3, 3) + p(3, 4) = 0.1 + 0.2 + 0 + 0 = 0.3$

## Distribuição conjunta: Caso discreto - Exemplo

x / y	1	2	3	4
1	0.1	0.0	0.1	0.0
2	0.3	0.0	k	0.2
3	0.0	0.2	0.0	0.0

- Sabemos que  $\sum_x \sum_y p(x, y) = 1 \ggg k = 0.1$
- $P(X \geq 2, Y \geq 3) = p(2, 3) + p(2, 4) + p(3, 3) + p(3, 4) = 0.1 + 0.2 + 0 + 0 = 0.3$
- $P(X = 2) = p(2, 1) + p(2, 2) + p(2, 3) + p(2, 4) = 0.3 + 0 + 0.1 + 0.2$

## Distribuição conjunta: Caso discreto

Em muitas situações, temos a função de probabilidade conjunta, mas estamos interessados apenas na distribuição marginal de  $X$  ou  $Y$ .

## Distribuição conjunta: Caso discreto

Em muitas situações, temos a função de probabilidade conjunta, mas estamos interessados apenas na distribuição marginal de  $X$  ou  $Y$ .

### Função de probabilidade marginal

Dada uma função de probabilidade conjunta  $p(x, y)$ , a função de probabilidade marginal de  $X$  e  $Y$ , denotadas por  $p_X(x)$  e  $p_Y(y)$  são dadas por

$$p_X(x) = \sum_y p(x, y) = \sum_y P(X = x, Y = y)$$

e

$$p_Y(y) = \sum_x p(x, y) = \sum_x P(X = x, Y = y)$$

## Distribuição conjunta: Caso discreto - Exemplo

- ② Obtenha as funções de probabilidade marginal de  $X$ .

x / y	1	2	3	4
1	0.1	0.0	0.1	0.0
2	0.3	0.0	0.1	0.2
3	0.0	0.2	0.0	0.0

## Distribuição conjunta: Caso discreto - Exemplo

- 2 Obtenha as funções de probabilidade marginal de  $X$ .

x / y	1	2	3	4
1	0.1	0.0	0.1	0.0
2	0.3	0.0	0.1	0.2
3	0.0	0.2	0.0	0.0

$$p_X(x) = \sum_y P(X = x, Y = y)$$

## Distribuição conjunta: Caso discreto - Exemplo

- 2 Obtenha as funções de probabilidade marginal de  $X$ .

x / y	1	2	3	4
1	0.1	0.0	0.1	0.0
2	0.3	0.0	0.1	0.2
3	0.0	0.2	0.0	0.0

$$p_X(x) = \sum_y P(X = x, Y = y)$$

x	1	2	3
p(x)	0.2	0.6	0.2

## Distribuição conjunta: Caso contínuo

### Função densidade conjunta

Sejam  $X$  e  $Y$  duas v.a.contínuas definidas no espaço amostral  $S$ . A função densidade conjunta,  $f(x, y)$  para essas duas v.as, é uma função  $f$  t.q.

- $f(x, y) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$

Assim, para qualquer subconjunto  $A$ ,

$$P((X, Y) \in A) = \int_A \int f(x, y) dx dy$$

Em particular, se  $A = \{(x, y) : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ , então

$$P((X, Y) \in A) = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy$$



## Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo

- 3 Suponha que a função densidade conjunta de  $X$  e  $Y$  é dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & \text{se } x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

- Qual o valor de  $c$ ?
- Calcule  $P(X \geq Y)$

## Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo


- 3 Suponha que a função densidade conjunta de  $X$  e  $Y$  é dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & \text{se } x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

- Qual o valor de  $c$ ?
- Calcule  $P(X \geq Y)$

**Precisamos definir os limites de integração**

# Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo



## Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = \int_{-1}^1 \left( \int_{x^2}^1 cx^2 y dy \right) dx = \int_{-1}^1 cx^2 \left( \frac{y^2}{2} \Big|_{x^2}^1 \right) dx$$

## Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy &= \int_{-1}^1 \left( \int_{x^2}^1 cx^2 y dy \right) dx = \int_{-1}^1 cx^2 \left( \frac{y^2}{2} \Big|_{x^2}^1 \right) dx \\ \int_{-1}^1 cx^2 \left( \frac{1}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx &= \int_{-1}^1 \frac{cx^2}{2} dx - \int_{-1}^1 \frac{cx^6}{2} dx = \frac{cx^3}{6} \Big|_{-1}^1 - \frac{cx^7}{14} \Big|_{-1}^1\end{aligned}$$

## Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy &= \int_{-1}^1 \left( \int_{x^2}^1 cx^2 y dy \right) dx = \int_{-1}^1 cx^2 \left( \frac{y^2}{2} \Big|_{x^2}^1 \right) dx \\&= \int_{-1}^1 cx^2 \left( \frac{1}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx = \int_{-1}^1 \frac{cx^2}{2} dx - \int_{-1}^1 \frac{cx^6}{2} dx = \frac{cx^3}{6} \Big|_{-1}^1 - \frac{cx^7}{14} \Big|_{-1}^1 \\&= \frac{2c}{6} - \frac{2c}{14} = \frac{28c - 12c}{14 \times 6} = \frac{4c}{21}\end{aligned}$$

## Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy &= \int_{-1}^1 \left( \int_{x^2}^1 cx^2 y dy \right) dx = \int_{-1}^1 cx^2 \left( \frac{y^2}{2} \Big|_{x^2}^1 \right) dx \\ \int_{-1}^1 cx^2 \left( \frac{1}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx &= \int_{-1}^1 \frac{cx^2}{2} dx - \int_{-1}^1 \frac{cx^6}{2} dx = \frac{cx^3}{6} \Big|_{-1}^1 - \frac{cx^7}{14} \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{2c}{6} - \frac{2c}{14} = \frac{28c - 12c}{14 \times 6} = \frac{4c}{21}\end{aligned}$$

Logo,  $c = 21/4$

## Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo


$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy &= \int_{-1}^1 \left( \int_{x^2}^1 cx^2 y dy \right) dx = \int_{-1}^1 cx^2 \left( \frac{y^2}{2} \Big|_{x^2}^1 \right) dx \\ \int_{-1}^1 cx^2 \left( \frac{1}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx &= \int_{-1}^1 \frac{cx^2}{2} dx - \int_{-1}^1 \frac{cx^6}{2} dx = \frac{cx^3}{6} \Big|_{-1}^1 - \frac{cx^7}{14} \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{2c}{6} - \frac{2c}{14} = \frac{28c - 12c}{14 \times 6} = \frac{4c}{21}\end{aligned}$$

Logo,  $c = 21/4$

Para calcular  $P(X \geq Y)$ , precisamos definir os limites de integração



# Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo



## Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo

$$\text{Então, } P(X \geq Y) = \int_0^1 \int_{x^2}^x \frac{21}{4} x^2 y dy dx = \int_0^1 \frac{21}{4} x^2 \left( \int_{x^2}^x y dy \right) dx$$

## Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo

$$\begin{aligned}\text{Então, } P(X \geq Y) &= \int_0^1 \int_{x^2}^x \frac{21}{4} x^2 y dy dx = \int_0^1 \frac{21}{4} x^2 \left( \int_{x^2}^x y dy \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{21}{4} x^2 \left( \frac{y^2}{2} \Big|_{x^2}^x \right) dx = \int_0^1 \frac{21}{8} x^4 - \frac{21}{8} x^6 dx\end{aligned}$$

## Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo

$$\begin{aligned}\text{Então, } P(X \geq Y) &= \int_0^1 \int_{x^2}^x \frac{21}{4} x^2 y dy dx = \int_0^1 \frac{21}{4} x^2 \left( \int_{x^2}^x y dy \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{21}{4} x^2 \left( \frac{y^2}{2} \Big|_{x^2}^x \right) dx = \int_0^1 \frac{21}{8} x^4 - \frac{21}{8} x^6 dx \\ &= \frac{21}{8} \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 - \frac{21}{8} \frac{x^7}{7} \Big|_0^1 = \frac{21}{40} - \frac{21}{56} = \frac{336}{2240} = \frac{3}{20}\end{aligned}$$

## Distribuição conjunta: Caso contínuo

Assim como no caso discreto, no caso contínuo podemos também estar interessados na distribuição marginal de uma das variáveis aleatórias.

## Distribuição conjunta: Caso contínuo

Assim como no caso discreto, no caso contínuo podemos também estar interessados na distribuição marginal de uma das variáveis aleatórias.

### Função densidade marginal

Dada uma função densidade conjunta  $f(x, y)$ , a função de densidade marginal de  $X$  e  $Y$ , denotadas por  $f_X(x)$  e  $f_Y(y)$  são dadas por

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy, \text{ para } -\infty < x < \infty$$

e

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx, \text{ para } -\infty < y < \infty$$

## Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo

4 Se

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & \text{se } x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

## Distribuição conjunta: Caso contínuo - Exemplo

4 Se

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & \text{se } x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

Então,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_{x^2}^1 \frac{21}{4}x^2y dy = \frac{21}{4}x^2 \left( \frac{y^2}{2} \Big|_{x^2}^1 \right) = \frac{21}{8}x^2(1 - x^4)$$



# Variáveis aleatórias independentes

# Variáveis aleatórias independentes

- Em muitas situações, as informações sobre o valor observado de uma das duas variáveis  $X$  ou  $Y$  fornecem informação sobre o valor da outra variável. Quando isto acontece, podemos dizer que existe uma dependência entre as duas variáveis

# Variáveis aleatórias independentes

- Em muitas situações, as informações sobre o valor observado de uma das duas variáveis  $X$  ou  $Y$  fornecem informação sobre o valor da outra variável. Quando isto acontece, podemos dizer que existe uma dependência entre as duas variáveis
- Contudo, não sempre as informações sobre o valor observado de uma das duas variáveis  $X$  ou  $Y$  fornecem informação sobre o valor da outra.

# Variáveis aleatórias independentes

- Em muitas situações, as informações sobre o valor observado de uma das duas variáveis  $X$  ou  $Y$  fornecem informação sobre o valor da outra variável. Quando isto acontece, podemos dizer que existe uma dependência entre as duas variáveis
- Contudo, não sempre as informações sobre o valor observado de uma das duas variáveis  $X$  ou  $Y$  fornecem informação sobre o valor da outra.

# Variáveis aleatórias independentes

- Em muitas situações, as informações sobre o valor observado de uma das duas variáveis  $X$  ou  $Y$  fornecem informação sobre o valor da outra variável. Quando isto acontece, podemos dizer que existe uma dependência entre as duas variáveis
- Contudo, não sempre as informações sobre o valor observado de uma das duas variáveis  $X$  ou  $Y$  fornecem informação sobre o valor da outra.

**Definição:** V.as independentes

$X$  e  $Y$  v.as. são independentes se, para dois conjuntos quaisquer  $A$  e  $B$ ,

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$$

# Variáveis aleatórias independentes

- Em muitas situações, as informações sobre o valor observado de uma das duas variáveis  $X$  ou  $Y$  fornecem informação sobre o valor da outra variável. Quando isto acontece, podemos dizer que existe uma dependência entre as duas variáveis
- Contudo, não sempre as informações sobre o valor observado de uma das duas variáveis  $X$  ou  $Y$  fornecem informação sobre o valor da outra.

**Definição:** V.as independentes

$X$  e  $Y$  v.as. são independentes se, para dois conjuntos quaisquer  $A$  e  $B$ ,

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$$

A definição da origem aos critérios comumente utilizados nos livros texto

# Variáveis aleatórias independentes

## Critério para independência

As v.as  $X$  e  $Y$  são independentes, sss,  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

# Variáveis aleatórias independentes

## Critério para independência

As v.as  $X$  e  $Y$  são independentes, sss,  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

Alternativamente:

## Critério para independência

As v.as  $X$  e  $Y$  são independentes, sss, para cada par de  $(x, y)$ ,

- Se  $X$  e  $Y$  são contínuas:  $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$
- Se  $X$  e  $Y$  são discretas:  $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$



## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- 5 Duas medidas independentes referentes à chuva são tomadas durante um período de tempo na região metropolitana de SP. A função de densidade de cada medida é

$$f(z) = \begin{cases} 2z, & \text{se } 0 \leq z \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- 5 Duas medidas independentes referentes à chuva são tomadas durante um período de tempo na região metropolitana de SP. A função de densidade de cada medida é

$$f(z) = \begin{cases} 2z, & \text{se } 0 \leq z \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

- Qual a função de densidade conjunta?
- Calcule  $P(X \leq 0.5, Y > 0.3)$
- Calcule  $P(X + Y \leq 1)$

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- Como as duas medidas ( $X$  e  $Y$ ) são independentes temos que

$$f(x, y) = f(x)f(y) = \begin{cases} 4xy, & \text{se } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- Como as duas medidas ( $X$  e  $Y$ ) são independentes temos que

$$f(x, y) = f(x)f(y) = \begin{cases} 4xy, & \text{se } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

- $$P(X \leq 0.5, Y > 0.3) = \underbrace{P(X \leq 0.5)}_{\underbrace{\int_0^{0.5} 2x dx}_{x^2 \Big|_0^{0.5}}} \underbrace{P(Y > 0.3)}_{\underbrace{\int_{0.3}^1 2y dy}_{y^2 \Big|_{0.3}^1}} = 0.2275$$

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- $$P(X + Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} 4xy dx dy = 4 \int_0^1 \left( \int_0^{1-x} y dy \right) x dx$$

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- $P(X + Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} 4xy dx dy = 4 \int_0^1 \left( \int_0^{1-x} y dy \right) x dx$
- $P(X + Y \leq 1) = \int_0^1 2x(1-x)^2 dx = x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{4x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- 6 A função de probabilidade conjunta de duas v.as  $X$  e  $Y$  é apresentada a seguir

$x / y$	1	2	3	4
1	0.06	0.02	0.04	0.08
2	0.15	0.05	0.10	0.20
3	0.09	0.03	0.06	0.12

São  $X$  e  $Y$  independentes?

# Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- **Passo 1:** Calcular as funções de probabilidade marginais
- **Passo 2:** verificar de  $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \forall x, y$



## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- **Passo 1:** Calcular as funções de probabilidade marginais
- **Passo 2:** verificar de  $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \forall x, y$

x / y	1	2	3	4	Total
1	0.06	0.02	0.04	0.08	0.2
2	0.15	0.05	0.10	0.20	0.5
3	0.09	0.03	0.06	0.12	0.3
Total	0.30	0.10	0.20	0.40	1

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- **Passo 1:** Calcular as funções de probabilidade marginais
- **Passo 2:** verificar de  $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \forall x, y$

x / y	1	2	3	4	Total
1	0.06	0.02	0.04	0.08	0.2
2	0.15	0.05	0.10	0.20	0.5
3	0.09	0.03	0.06	0.12	0.3
Total	0.30	0.10	0.20	0.40	1

- Verificase que  $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \forall x, y$ ,

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- **Passo 1:** Calcular as funções de probabilidade marginais
- **Passo 2:** verificar de  $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \forall x, y$

x / y	1	2	3	4	Total
1	0.06	0.02	0.04	0.08	0.2
2	0.15	0.05	0.10	0.20	0.5
3	0.09	0.03	0.06	0.12	0.3
Total	0.30	0.10	0.20	0.40	1

- Verificase que  $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \forall x, y$ ,
- Logo  $X$  e  $Y$  são independentes.

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- 1 A função de probabilidade conjunta de duas v.as  $X$  e  $Y$  é apresentada a seguir

$x / y$	1	2	3	4
1	0.1	0.0	0.1	0.0
2	0.3	0.0	0.1	0.2
3	0.0	0.2	0.0	0.0

São  $X$  e  $Y$  independentes?

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- **Passo 1:** Calcular as funções de probabilidade marginais
- **Passo 2:** verificar de  $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \forall x, y$

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- **Passo 1:** Calcular as funções de probabilidade marginais
- **Passo 2:** verificar de  $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \forall x, y$

x / y	1	2	3	4	Total
1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.6
3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
Total	0.4	0.2	0.2	0.2	1

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- **Passo 1:** Calcular as funções de probabilidade marginais
- **Passo 2:** verificar de  $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \forall x, y$

x / y	1	2	3	4	Total
1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.6
3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
Total	0.4	0.2	0.2	0.2	1

São  $X$  e  $Y$  independentes? **Não!**

## Variáveis aleatórias independentes: Exemplos

- **Passo 1:** Calcular as funções de probabilidade marginais
- **Passo 2:** verificar de  $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \forall x, y$

x / y	1	2	3	4	Total
1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.6
3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
Total	0.4	0.2	0.2	0.2	1

São  $X$  e  $Y$  independentes? **Não!**

$$p(1, 1) = 0.1 \neq p_X(1)p_Y(1) = 0.2 \times 0.4 = 0.08$$



# Variáveis aleatórias independentes:

As definições e criterios apresentados para  $X$  e  $Y$  são também validos para  $n$  v.as:

## Variáveis aleatórias independentes:

As definições e criterios apresentados para  $X$  e  $Y$  são também validos para  $n$  v.as:

### V.as Independentes

As v.as  $X_1, X_2, \dots, X_n$  são independentes, se para  $n$  conjuntos quaisquer  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ,

$$P(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = P(X_1 \in A_1) \cdots P(X_n \in A_n)$$

## Variáveis aleatórias independentes:

As definições e criterios apresentados para  $X$  e  $Y$  são também validos para  $n$  v.as:

### V.as Independentes

As v.as  $X_1, X_2, \dots, X_n$  são independentes, se para  $n$  conjuntos quaisquer  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ,

$$P(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = P(X_1 \in A_1) \cdots P(X_n \in A_n)$$

Os criterios de independência também são validos para  $n$  v.as.

# Variáveis aleatórias independentes:

## Critério para independência

As v.as  $X_1, X_2, \dots, X_n$  são independentes, sss,  $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ,

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

# Variáveis aleatórias independentes:

## Critério para independência

As v.as  $X_1, X_2, \dots, X_n$  são independentes, sss,  $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ,

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

Alternativamente:

## Critério para independência

As v.as  $X_1, X_2, \dots, X_n$  são independentes, sss, para cada  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,

- Caso contínuo:  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n)$
- Caso discreto:  $p(x_1, x_2, \dots, x_n) = p_{X_1}(x_1)p_{X_2}(x_2) \cdots p_{X_n}(x_n)$

## Variáveis aleatórias independentes:

- O conceito de v.as independentes é bastante útil e nos permite provar resultados interessantes, como os que veremos a seguir:

### Teorema

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_k$  v.as independentes t.q.  $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i)$ . Então

$$X_1 + \dots + X_k \sim N\left(\sum_{i=1}^k \mu_i, \sqrt{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}\right)$$

## Variáveis aleatórias independentes:

- O conceito de v.as independentes é bastante útil e nos permite provar resultados interessantes, como os que veremos a seguir:

### Teorema

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_k$  v.as independentes t.q.  $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i)$ . Então

$$X_1 + \dots + X_k \sim N\left(\sum_{i=1}^k \mu_i, \sqrt{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}\right)$$

## Variáveis aleatórias independentes:

- O conceito de v.as independentes é bastante útil e nos permite provar resultados interessantes, como os que veremos a seguir:

### Teorema

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_k$  v.as independentes t.q.  $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i)$ . Então

$$X_1 + \dots + X_k \sim N\left(\sum_{i=1}^k \mu_i, \sqrt{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}\right)$$

### Corolário

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.as independentes t.q.  $X_i \sim N(\mu, \sigma)$ . Então

$$\bar{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$



# Leituras recomendadas

## Leituras recomendadas

- Sheldon Ross (6.1–6.3)
- Jay L. Devore (Cap 5)

## Para praticar

- Lista 7 do [gradmat.ufabc.edu.br/disciplinas/ipe/listas/](https://gradmat.ufabc.edu.br/disciplinas/ipe/listas/)