Descubrimiento AgroGenIA v3.1

- **Fecha:** 2026-09-30 19:08
- **Especie:***Manihot esculenta*
- **Rasgo:** tolerancia a sequia
- **Nivel de filtro usado:** Nivel 3
- **Proteoma total:** 59151
- **Candidatas tras filtro:** 57682
- **Con dominios de estres:** 27
- **Noveles priorizados:** 10

Embudo de filtrado

Etapa	Cantidad
Proteoma total	59151
Excluidas (transp/fragmentos)	1469
Candidatas (nivel 3)	57682
Con dominios de estres	27
Noveles priorizados	10

Candidatos noveles

#	Accession	Score	Especulacion	Pista	Dominios	PMC	Novel
1	Manes.14G047368.1.p	85	baja	Dominio NAM (NAC) – factor de transcripción asociado a respuestas de sequía	NAM	0	SI
2	Manes.14G053100.4.p	78	media	Dominios LRR y Pkinase – receptor-like kinase típico de señalización de estrés hídrico	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, Pkinase, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4	0	SI
3	Manes.14G053100.8.p	78	media	Dominios LRR y Pkinase – receptor-like kinase típico de señalización de estrés hídrico	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, Pkinase, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4	0	SI
4	Manes.14G053100.7.p	78	media	Dominios LRR y Pkinase – receptor-like kinase típico de señalización de estrés hídrico	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8,	0	SI

					Pkinase, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4		
5	Manes.14G053100.6.p	78	media	Dominios LRR y Pkinase – receptor-like kinase típico de señalización de estrés hídrico	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, Pkinase, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4	0	SI
6	Manes.14G053100.5.p	78	media	Dominios LRR y Pkinase – receptor-like kinase típico de señalización de estrés hídrico	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, Pkinase, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4	0	SI
7	Manes.14G053100.10.p	78	media	Dominios LRR y Pkinase – receptor-like kinase típico de señalización de estrés hídrico	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, Pkinase, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4	0	SI
8	Manes.14G053100.9.p	78	media	Dominios LRR y Pkinase – receptor-like kinase típico de señalización de estrés hídrico	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, Pkinase, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4	0	SI
9	Manes.14G053100.12.p	78	media	Dominios LRR y Pkinase – receptor-like kinase típico de señalización de estrés hídrico	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, Pkinase	0	SI
10	Manes.14G053100.11.p	78	media	Dominios LRR y Pkinase – receptor-like kinase típico de señalización de estrés hídrico	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, Pkinase	0	SI

Convergencia con genes conocidos (Brazo A)

Manes.14G047368.1.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** El factor de transcripción NAC (dominio NAM) probablemente regula la expresión de genes de respuesta a la sequía como los ERD y C2-domain ABA-related, integrándose en la misma vía de señalización ABA-mediada que los genes conocidos.
- **Confianza:** 72%

Manes.14G053100.4.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** El receptor tipo LRR-RLK con dominio quinasa actúa como sensor de estrés hídrico en la membrana plasmática y activa cascadas de fosforilación que culminan en la inducción de genes ERD y C2-domain ABA-related, compartiendo la vía de señalización de sequía con los genes conocidos.
- **Confianza:** 68%

Manes.14G053100.8.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Isoforma del mismo LRR-RLK que percibe señales externas de déficit hídrico y desencadena la activación de genes de respuesta temprana a la deshidratación, como los ERD, indicando convergencia funcional en la vía de señalización de sequía.
- **Confianza:** 68%

Manes.14G053100.7.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Otra isoforma del LRR-RLK que probablemente coopere con los mismos componentes downstream (p.ej., MAPKs, TFs ERD) que los genes conocidos, reforzando la respuesta al estrés hídrico.
- **Confianza:** 68%

Manes.14G053100.6.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Receptor de membrana con dominios LRR y quinasa que, al activarse por sequía, transduce la señal hacia la transcripción de genes ERD y C2-domain ABA-related, mostrando convergencia funcional en la vía de respuesta al déficit hídrico.
- **Confianza:** 68%

Manes.14G053100.5.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Isoforma adicional del LRR-RLK que participa en la percepción de estrés hídrico y en la activación de la cascada de señalización que culmina en la expresión de genes de deshidratación como los ERD.

- **Confianza:** 68%

Manes.14G053100.10.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Receptor LRR-RLK que, mediante su dominio quinasa, inicia la transmisión de la señal de sequía hacia los reguladores de genes ERD, compartiendo la vía de respuesta al estrés hídrico con los genes conocidos.
- **Confianza:** 68%

Manes.14G053100.9.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Otro miembro del clúster LRR-RLK que probablemente actúe en la misma ruta de señalización que los genes ERD, facilitando la activación temprana de respuestas a la deshidratación.
- **Confianza:** 68%

Manes.14G053100.12.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Receptor LRR-RLK con organización de dominios similar a los anteriores; su activación bajo déficit hídrico debería conducir a la inducción de genes ERD y C2-domain ABA-related, indicando convergencia funcional en la vía de señalización de sequía.
- **Confianza:** 68%

Manes.14G053100.11.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Isoforma LRR-RLK que probablemente participe en la percepción y transmisión de la señal de sequía hacia la regulación de genes de respuesta temprana como los ERD, mostrando convergencia funcional en la vía de respuesta al estrés hídrico.
- **Confianza:** 68%

> *Los candidatos marcados como NOVEL (0 menciones en PMC) son los de mayor interes.*