

Ψάρια



Χριστόψαρο

Το χριστόψαρο ή σανπιέρος (επιστημονική ονομασία *Zeus faber*, ζευς ο σιδηρουργός ή και άλλα είδη του γένους *Zeus*) είναι είδος θαλάσσιου ψαριού της οικογένειας , με ευρεία γεωγραφική κατανομή.

Είναι βενθικό παράλιο ψάρι, φαγώσιμο από τον άνθρωπο, με κατακόρυφα πεπλατυσμένο λαδί σώμα που χαρακτηρίζεται από μία μεγάλη πολύ σκούρα κηλίδα και μακριά αγκάθια στο ραχιαίο πτερύγιο. Η σκούρα κηλίδα του χρησιμεύει για να τρομάζει τους διώκτες του.

Τα μεγάλα μάτια του στην εμπρόσθια όψη της κεφαλής του δίνουν στερεοσκοπική όραση και αντίληψη του βάθους, χαρακτηριστικά σημαντικά για θηρευτές.

Η κηλίδα στα πλευρά του, που αποτελεί απομίμηση ματιού χρησιμεύει και στο να μπερδεύει τη λεία του, παραπλανώντας την ως προς τη θέση του στόματός του, το οποίο είναι μεγάλο.

Το χριστόψαρο φθάνει σε μέγιστο μήκος 65 cm και σε βάρος τα τρία κιλά περίπου. Στην εμφάνισή του κυριαρχούν τα δέκα μακριά αγκάθια στο ραχιαίο του πτερύγιο και τα άλλα 4 στο πρωκτικό.

Τα λέπια του είναι μικροσκοπικά και κοφτερά. Το χρώμα του ψαριού είναι πράσινο λαδί με ασημόχρωμη λευκή κοιλιά και από μία πολύ σκούρα κηλίδα στο κάθε πλευρό του. Τα μάτια του βρίσκονται κοντά στο επάνω μέρος της κεφαλής του. Το σχήμα του σώματός του είναι στρογγυλεμένο και κολυμπά πιο αργά από τα περισσότερα ψάρια.

(edit)fagosimo , doloma = ζωντανής ή νεκρής σαρδέλας , αναπαραγωγική περίοδος του χριστόψαρου διαρκεί τους ανοιξιάτικους μήνες, aggistri = 2/0 kai ano

Χειλού



Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά είδη ψαριών με το όνομα «χειλού», ωστόσο το είδος *Symphodus tinca*, ίσως, να είναι αυτό που συναντάται περισσότερο συχνά στα νερά μας. Είναι ένα μικρό σχετικά ψάρι με μέγιστο μήκος τα 44 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 25 εκατοστά. Ανήκει στην οικογένεια των λαμπριδών (Labridae).

Το είδος *Symphodus tinca* απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από την Ισπανία έως το Μαρόκο, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου. Συναντάται σε βάθη 1 – 50 μέτρα.

Το χρώμα της ποικίλει ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο διαβιεί αλλά και την περίοδο αναπαραγωγής και το φύλλο. Έτσι, μπορεί να παρουσιάζει καφέ αποχρώσεις ή και κάπως χρυσοκίτρινο χρωματισμό με δύο εμφανείς, συνήθως, γραμμές κατά μήκος του σώματος. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτά τα ψάρια παρουσιάζουν και φυλετικό διμορφισμό, δηλαδή διαφορά στα χρώματα μεταξύ αρσενικού-θηλυκού. Τα αρσενικά έχουν πιο έντονα χρώματα ενώ τα θηλυκά λιγότερο έντονα με αποχρώσεις του καφέ και του κίτρινου. Η χειλού είναι βενθικό, κατά βάση, είδος και τρέφεται με εχινόδερμα (αχινούς, οφίουρους), δίθυρα, γαρίδες και καβούρια. Η αναπαραγωγή του είδους πραγματοποιείται μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου. Κατά την περίοδο αυτή τα αρσενικά άτομα του είδους αποκτούν πιο έντονο χρώμα.

(edit)fagosimo , Τα δολώματα που την δελεάζουν είναι όλα τα σκουλήκια και οι ζωντανές γαρίδες και δεν λέει όχι σε κάθε είδους μαλάκιο.

(edit2)Περίοδος ψαρέματος = Όλες οι εποχές , Δόλωμα = Καλαμάρι γαρίδα σκουλήκι ζυμάρι κλπ , Αγκίστρι = 12-16 , Μπετονιά = 0.18-0.25 mm , Θα τη βρούμε κοντά σε βράχια και φυτά στον βυθό.

Χάνος



Ο χάνος είναι ένα μικρό ψάρι με μέγιστο μήκος τα 40 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 25 εκατοστά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Serranus cabrilla* και ανήκει στην οικογένεια των σερανιδών (*Serranidae*).

Ο χάνος απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τα Βρετανικά Νησιά έως το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος, συμπεριλαμβανομένων των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων. Επίσης, είναι αρκετά κοινό είδος στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 5 – 500 μέτρα.

Το χρώμα του είναι καφέ σε διάφορες αποχρώσεις και διακρίνονται ορισμένες κάθετες έντονες καφέ λωρίδες καθώς και δυο – τρεις οριζόντιες κίτρινες γραμμές. Ζει σε βραχώδεις και αμμώδεις βυθούς. Είναι βενθικό είδος και τρέφεται με μικρά ψάρια, κεφαλόποδα και καρκινοειδή. Ο χάνος είναι σύγχρονο ερμαφρόδιτο είδος, δηλαδή έχει ταυτόχρονα γεννητικά όργανα και των δύο φύλων αλλά χρησιμοποιεί ένα από τα δύο για αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή του λαμβάνει χώρα από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο.

(edit)fagosimo , Δόλωμα: Ο Χάνος δεν είναι ιδιαίτερα επιλεκτικός στο δόλωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζωντανές γαρίδες, κομματάκια ψαριού, σκουλήκια θαλάσσης ή ακόμα και τεχνητά δολώματα που μοιάζουν με μικρά ψαράκια.

(edit2)Περίοδος ψαρέματος = Όλες οι εποχές , Δόλωμα = Γαρίδα σκουλήκι καλαμάρι κλπ , Αγκίστρι = 8-12 , Μπετονιά = 0.20-0.25 mm , Θα τον βρούμε κοντά σε βράχια στον βυθό ή σε αμμώδεις παραλίες

Φαγκρί



Το φαγκρί είναι ένα μεσαίου μεγέθους σχετικά ψάρι με μέγιστο μήκος τα 91 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 35 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 7,7 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Pagrus pagrus* και ανήκει στην οικογένεια των Σπαριδών (Sparidae).

Το φαγκρί έχει ευρεία γεωγραφική κατανομή. Απαντάται στον Ανατολικό και Δυτικό Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 0 – 250 μέτρα, συνήθως 10 – 80 μέτρα.

Το χρώμα του είναι ροδοκόκκινο. Ζει, κυρίως, σε περιοχές με καθαρά νερά, βραχώδεις πυθμένες πλούσιους σε τρύπες, που του παρέχουν κάλυψη και ασφάλεια, ενώ απαντά και σε περιοχές με αμμολασπώδη υποστρώματα. Είναι βενθοπελαγικό είδος και τρέφεται με ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή. Η αναπαραγωγή του είδους λαμβάνει χώρα μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 18 εκατοστά.

(edit)fagosimo , μέχρι τα 30 μέτρα περίπου τα νεαρά φαγκριά , Καθώς μεγαλώνουν τα φαγκριά απομακρύνονται από τα ρηχά και κατευθύνονται σε βαθύτερες περιοχές φτάνοντας έως και τα 250 μέτρα μπορεί να επιστρέφουν σε πιο ρηχά νερά κατά τους χειμερινούς μήνες , Η διατροφή του αποτελείται κυρίως από μικρότερα ψάρια όπως σαρδέλες μαλάκια καθώς και μύδια στρείδια γαρίδες και καβούρια

Φρίσσα



Η φρίσσα είναι ένα όμορφο αφρόψαρο που μοιάζει με σαρδέλα αλλά πολύ μεγαλύτερη. Ζει σε μεγάλα κοπάδια που αριθμούν πολλές χιλιάδες άτομα. Δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητή σαν διατροφική αξία αλλά και οι ψαράδες δεν την συμπαθούν γιατί δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία. Τρώγεται τηγανητή και φρέσκια.. Αν είναι μπαγιάτικη δεν έχει μεγάλη διατροφική αξία.

Η φρίσσα απαντάται στον Ανατολικό και Δυτικό Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο και Μαύρη θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 0 – 350 μέτρα.

Το χρώμα της είναι γαλαζοπράσινο στη ράχη και γκρίζο-ασημί στην κοιλιά με μια χαρακτηριστική κίτρινη γραμμή στο μέσο και κατά μήκος του σώματος. Όπως και η σαρδέλα, τρέφεται με πλαγκτονικούς μικροοργανισμούς, φιλτράροντας το νερό καθώς κολυμπάει. Η αναπαραγωγή της λαμβάνει χώρα κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 10 εκατοστά.

(edit)fagosimo , doloma = (ola mallon) + sardela kai monosardela , xrisi poliagkistrou gia erasitexnes(aggistria to ena pano apo to allo)

Τσιπούρα



Η τσιπούρα είναι ένα μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 70 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 35 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 17,2 κιλά. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Sparus aurata* και ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών (Sparidae).

Είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος, δηλαδή γεννιέται ως αρσενικό και μετά από τρία περίπου χρόνια αλλάζει σε θηλυκό.

Η τσιπούρα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τα Βρετανικά Νησιά και το Στενό του Γιβραλτάρ έως το Πράσινο Ακρωτήριο και τα Κανάρια Νησιά; Επίσης στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 1 – 150 μέτρα, συνήθως 1 – 30 μέτρα.

Το χρώμα της είναι ασημόχρυσο με μια χαρακτηριστική μαύρη κηλίδα στο τέλος του βραγχιακού επικαλύμματος. Χαρακτηριστικό είναι και το χρυσό τόξο που ενώνει τα μάτια, πιο έντονο στα ενήλικα ψάρια, ενώ υπάρχει μια κόκκινη γραμμή στο όριο του κάτω μισού του βραγχιο-καλύμματος. Η τσιπούρα έχει έντονα κυρτό προφίλ, οβάλ και ψηλό σώμα. Είναι βενθοπελαγικό είδος, Τρέφεται με οστρακόδερμα και κυρίως μύδια και στρείδια. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους ξεκινά τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 20 εκατοστά.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = Ιούλιος-Νοέμβριος , Δόλωμα = Καλαμάρι γαρίδα ζυμάρι μύδια σκουλήκι κλπ , Αγκίστρι = 6-10 , Μπετονιά = 0.20-0.30 mm

Τόνος



Οι τόνοι (*Thunnus* spp.) είναι αρκετά μεγάλα πελαγικά ψάρια και ανήκουν στην οικογένεια των σκομβριδών (*Scombridae*).

Έχουν σώμα υδροδυναμικό και συμπαγές και μπορούν να φτάσουν σε μεγάλες ταχύτητες, μέχρι 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το κρέας του τόνου είναι κόκκινο, σε αντίθεση με άλλα ψάρια που έχουν λευκό κρέας. Αυτή η απόχρωση οφείλεται στη παρουσία μυοσφαιρίνης στους μύες του τόνου. Η μυοσφαιρίνη είναι μια πρωτεΐνη που προσδένει οξυγόνο και οι τόνοι την έχουν σε υψηλή συγκέντρωση. Κάποια από τα μεγαλύτερα είδη τόνου έχουν χαρακτηριστικά θερμόαιμων οργανισμών, καθώς μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους σε μεγαλύτερη τιμή από το νερό που τους περιβάλλει και με αυτό το τρόπο μπορούν να ζήσουν σε ψυχρές θάλασσες.

Τα ψάρια αυτά αλιεύονται σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, με αποτέλεσμα αρκετά είδη να βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης από την υπεραλίευση και την παράνομη αλιεία. Ο κόκκινος τόνος (*Thunnus thynnus*), το μεγαλύτερο είδος τόνου, κινδυνεύει με εξαφάνιση. Ο κόκκινος τόνος θεωρείται εκλεκτός μεζές στην Ιαπωνία, όπου καταναλώνεται ωμός ως σούσι. Ένα ακόμα είδος που συναντάται στη Μεσόγειο, είναι ο «Τόνος ο μακρόπτερος» (*Thunnus alalunga*).

Ο ερυθρός τόνος (*T. thynnus*) αλιεύεται μόνο από επαγγελματίες αλιείς στην Ελλάδα που έχουν ειδική άδεια για αλιεία τόνου.

(edit)fagosimo , Ο Νοέμβριος «είναι από τους καλύτερους μήνες για να ψαρέψεις τονάκια» , Το καλάμι ψαρέματος από την ακτή δεν είναι κατάλληλο για το ψάρεμα τόνου , exei poli dinami to afinoume na kourasti protou to travijoume ejo , metaliko doloma , Ζωντανά δολώματα χρησιμοποιούνται κυρίως για συρτή βυθού όπως το καλαμάρι η σουπιά και η σαρδέλα , siniuos psarevete me barka , Οι πιο κατάλληλες καιρικές συνθήκες είναι ο ελαφρύς κυματισμός και όχι η γαλήνια θάλασσα. Έτσι το δόλωμα μπαينوβγαίνει και προκαλεί το ψάρι να ορμήσει. Επίσης καλό είναι να έχεις τον ήλιο ή πίσω σου ή μπροστά σου έτσι ώστε να γυαλίζει το δόλωμα και να προσελκύει τους τόνους , αναπαραγωγική περίοδος του ερυθρού τόνου διαρκεί από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο , koradei siniuos 500 metra mallon

(edit2)Περίοδος ψαρέματος = Όλες οι εποχές , Δόλωμα = Ζωντανά ψάρια πλαστικά ψαράκια κουταλάκι , Αγκίστρι = 4-8 , Μπετονιά = 0.25-0.35 mm , Το βρίσκουμε στην ανοικτή θάλασσα, σπάνια στις παραλίες.

Σκουμπρί



Το σκουμπρί ή τσίρος είναι ένα μικρο-μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 60 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 30 εκατοστά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Scomber scombrus* και ανήκει στην οικογένεια των σκομβριδών (*Scombridae*).

Το σκουμπρί απαντάται στον Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό και τη Μεσόγειο θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 0 – 1000 μέτρα, συνήθως 0 – 200 μέτρα.

Το χρώμα του είναι απαλό γκριζοπράσινο στη ράχη με αρκετές κάθετες ακανόνιστες λωρίδες που φτάνουν μέχρι το μέσον του σώματος. Το υπόλοιπο σώμα είναι ασημί και άσπρο προς την κοιλιά. Είναι πελαγικό είδος και τρέφεται με ζωπλαγκτόν και μικρά ψάρια. Η αναπαραγωγική του περίοδος λαμβάνει χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι συγγενικό είδος με τον κολιό (*Scomber colias*).

Ψαρεύεται με συρτή, τσαπαρί και δίχτυα, συνήθως μαζί με σαρδέλες. Η αλίευσή του είχε φτάσει το 1975 τους 1,1 εκατομμύρια τόνους, αλλά από τότε η ποσότητα που αλιεύεται έχει μειωθεί. Όσον αφορά το 2011, αλιεύτηκαν 944.748 τόνοι σκουμπριών. Ανάλογα με την εποχή του χρόνου, η περιεκτικότητα σε λίπος κυμαίνεται μεταξύ 3% την άνοιξη και έως 30% το φθινόπωρο. Η καλύτερη περίοδος για να αλιευθεί είναι το καλοκαίρι όταν το θερμοκλινές βρίσκεται σε βάθος 15 με 20 μέτρα και τα ψάρια δεν μπορούν να ξεφύγουν σε βαθύτερα ύδατα.

Είναι περιζήτητο βρώσιμο ψάρι, όπως και τα υπόλοιπα ψάρια της οικογένειας. Το κρέας του είναι αρωματικό, τρυφερό, ζουμερό, καφεκόκκινο και πιο νόστιμο απ' του κολιού. Στο εμπόριο διατίθεται φρέσκο, καπνιστό, με σάλτσα, κατεψυγμένο, μαριναρισμένο και σε κονσέρβα. Τα ψάρια που αλιεύονται την άνοιξη είναι αδύνατα και αφήνονται να λιάζονται στον ήλιο και είναι ο λεγόμενος τσίρος, ενώ τα παχύτερα ψάρια, που αλιεύονται το φθινόπωρο παστώνονται. Θεωρούνται ιδανικά για το γκριλ ή για τηγάνισμα.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 18 εκατοστά.

Σηκιός



Ο σηκιός ή παντελής ή οσκιός είναι ένα μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 70 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 28 εκατοστά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Sciaenidae* και ανήκει στην οικογένεια των σκιανιδών (*Sciaenidae*). Λανθασμένα αναφέρεται σαν μυλοκόπι, αφού αυτό πρόκειται για στενό συγγενή του, με αρκετές ομοιότητες αλλά με πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και με μεγάλη σπανιότητα.

σηκιός απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από το Νότιο Βискаϊκό κόλπο έως τη Μαυριτανία, περιστασιακά προς τη Νότια Σενεγάλη και φυσικά, στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 1 – 200 μέτρα.

Το χρώμα του είναι βαθύ ασημόχρυσο και σκουραίνει προς το κεφάλι. Τα κοιλιακά και το εδρικό πτερύγιο είναι μαύρα ενώ η πρώτη άκανθα αυτών έχει άσπρο χρώμα. Τα υπόλοιπα πτερύγια είναι γκριζοκίτρινα με ένα μαύρο τελείωμα. Τρέφεται με μικρά ψάρια και καρκινοειδή. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους είναι από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο.

Θα μπορούσε κάποιος να το κατατάξει στα ψάρια των βράχων αφού εκεί συνήθως θα το συναντήσουμε. Μεταναστεύει κι αυτό όπως και τα περισσότερα ψάρια για λόγους που είναι δύσκολο να γνωρίζουμε, αλλά μάλλον ξέρει τι κάνει αφού είναι από τα είδη της ρηχής υποθαλάσσιας ζώνης που έχει καταφέρει να επιβιώσει ικανοποιητικά μέχρι και τη σημερινή δύσκολη εποχή της υπεραλίευσης. Σύμφωνα με τη λίστα του IUCN ο Μεσογειακός πληθυσμός του είδους είναι Τρωτός.

Η κοινή του ονομασία είναι πιθανό να προέρχεται από την αρχαία Ελληνική λέξη «σκαίος» αλλά όχι με την ευρύτερη έννοια του «σκοτεινός», αλλά εκείνου που αρέσκεται να συχνάζει στα σκαιώδη μέρη (σκοτεινά – υποφωτισμένα). Όντως τις συννεφιασμένες ημέρες είναι πιθανότερη η κυκλοφορία και κατ'επέκταση ο εντοπισμός των ψαριών αυτών έξω από τη φωλιά τους και βέβαια αρέσκεται να κυκλοφορεί περισσότερο τις νυκτερινές ώρες για την εξεύρεση της τροφής του.

Σφυρίδα



Η σφυρίδα είναι ένα ευμέγεθες ψάρι με μέγιστο μήκος τα 120 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 60 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 25 κιλά. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Erioperhelus aeneus* και ανήκει στην οικογένεια των σερανιδών (*Serranidae*). Μοιάζει αρκετά με το ροφό και τη στήρα.

Η σφυρίδα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό κατά μήκος της Δυτικής ακτής της Αφρικής έως τη Νότια Αγκόλα, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Μεσογείου. Συναντάται σε βάθη 20 – 200 μέτρα.

Το χρώμα της είναι χαρακτηριστικό πράσινο σκούρο προς χάλκινο, ενώ μερικές φορές μπορεί να είναι και καφέ και με έντονο χαρακτηριστικό πράσινο μάτι. Στο σώμα της σφυρίδας υπάρχουν 4 με 5 λευκές κάθετες ραβδώσεις. Έχει προτεταμένη κάτω σιαγόνα και μεγάλο στόμα. Το καλοκαίρι συνήθως βρίσκεται σε βαθιά νερά, ενώ τον χειμώνα σε πιο ρηχά. Τρέφεται κυρίως, με ψάρια, κεφαλόποδα (χταπόδια, σουπιές, καλαμάρια) και καρκινοειδή (καβούρια, γαρίδες κ.λπ).

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 45 εκατοστά.

Συναγρίδα



Η συναγρίδα είναι ένα ψάρι που μπορεί να φτάσει σε αρκετά μεγάλο μέγεθος με μέγιστο μήκος τα 100 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 50 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 14,5 κιλά. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Dentex dentex* και ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών (*Sparidae*).

Η συναγρίδα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τα Βρετανικά νησιά έως τη Μαυριτανία και σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 0 – 200 μέτρα, συνήθως 15 – 50 μέτρα.

Το χρώμα της είναι γαλάζιο – ασημί, αλλά μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία και το περιβάλλον στο οποίο διαβιεί. Όσο το ψάρι είναι ζωντανό, διακρίνονται ορισμένες έντονες βούλες στη ράχη. Έχει σώμα οβάλ, το οποίο είναι επίπεδο στα πλάγια και έχει μεγάλο κεφάλι. Το στόμα της έχει πολύ ισχυρούς κυνόδοντες και στις δύο σιαγόνες. Η συναγρίδα ζει σε καθαρά νερά, σε πετρώδεις ή αμμώδεις βυθούς. Τρέφεται κυρίως με ψάρια μικρότερου μεγέθους (γόπες, μαρίδες, σαυρίδια), αλλά και με μαλάκια. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους λαμβάνει χώρα από το Μάρτιο έως το Μάιο.

Στήρα



Η στήρα είναι ένα ευμέγεθες ψάρι με μέγιστο μήκος τα 140 εκατοστά, και πιο σύνηθες τα 50 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και 10 κιλά. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Epinerphelus costae* και ανήκει στην οικογένεια των σερανιδών (Serranidae). Συγγενεύει με το ροφό, τη σφυρίδα και άλλα ροφοειδή.

Η στήρα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 1 – 200 μέτρα, συνήθως 4 – 160 μέτρα.

Το χρώμα της είναι καστανό σε σκούρα απόχρωση (περίπου μαύρη) στη ράχη. Τα νεότερα άτομα φέρουν 5-6 λευκές παράλληλες λωρίδες κατά μήκος του σώματος του ψαριού, οι οποίες κατά την ενηλικίωση γίνονται λιγότερο εμφανείς. Επίσης τα ενήλικα έχουν και χρυσή κηλίδα πίσω και πάνω από το βραγχιακό κάλυμμα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Το σώμα της στήρας είναι πιο μικρό από αυτό του ροφού. Σε αντίθεση με το ροφό, δεν έχει κυνόδοντες και το κάτω σαγόνι της εξέχει αρκετά. Είναι βενθικό είδος και τρέφεται με ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια. Είναι ερμαφρόδιτο πρωτόγυνο είδος. Ωριμάζει σεξουαλικά ως θηλυκό άτομο, όταν το μήκος του φθάσει τα 40 περίπου εκατοστά, και μεταβάλλεται σε αρσενικό, όταν φθάσει τα 60 περίπου εκατοστά. Η αναπαραγωγή της λαμβάνει χώρα κατά το καλοκαίρι.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 45 εκατοστά.

Σπάρος



Ο σπάρος είναι ένα μέτριου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 28 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 13 εκατοστά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Diplodus annularis* και ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών (Sparidae). Είναι πολύ στενός συγγενής με το σαργό.

Ο σπάρος απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τα Κανάρια νησιά έως τις ακτές της Πορτογαλίας και το Βискаϊκό κόλπο, τη Μεσόγειο και Μαύρη θάλασσα καθώς και τη θάλασσα του Αζόφ. Συναντάται σε βάθη 0 – 90 μέτρα.

Το χρώμα του είναι ασημόχρυσο με ένα μαύρο δακτύλιο στην ουρά. Τα πτερύγιά του είναι κιτρινωπά. Ζει σε κοπάδια, κυρίως σε ρηχά, αλλά και βαθιά νερά, σε πετρώδεις ή φυκώδεις βυθούς με λάσπη και βούρκο. Τρέφεται με σκουλήκια, μικρά μαλάκια, καρκινοειδή, εχινόδερμα και υδρόζωα. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους είναι από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 12 εκατοστά.

Σμέρνα



Η σμέρνα είναι ένα ψάρι της κλάσης των Οστεϊχθύων. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Muraena helena* και ανήκει στην οικογένεια των μυραινιδών (*Muraenidae*). Μοιάζει πολύ με φίδι ή/και χέλι, γι' αυτό και ανήκει στα εγχελυόμορφα. Το μήκος της μπορεί να φτάσει τα 150 εκατοστά, αλλά πιο σύνηθες είναι τα 80 εκατοστά.

Η σμέρνα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τα Νότια των Βρετανικών νήσων έως τη Σενεγάλη, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου. Συναντάται σε βάθη 1 – 801 μέτρα, συνήθως 100 – 300 μέτρα.

Το χρώμα του σώματός της είναι καφέ με κηλίδες κίτρινου χρώματος. Έχει σχετικά μικρό κεφάλι, με τεράστιο όμως στόμα. Από το δέρμα της εκκρίνει μία βλέννα, με αποτέλεσμα να είναι δυσδιάκριτα τα μικρά λέπια της. Δεν έχει ζυγά πτερύγια, όπως όλα τα εγχελυόμορφα (μουγγρί, χέλι). Κινείται με κινήσεις όπως του φιδιού. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους λαμβάνει χώρα μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου.

Στο στόμα της έχει πολύ ισχυρά δόντια. Δαγκώνει μόνο όταν βρίσκεται σε κίνδυνο. Σπάνια επιτίθεται στους εχθρούς της. Το δάγκωμά της είναι επικίνδυνο, ακόμα και για τον άνθρωπο. Ζει κοντά σε ακτές, μέσα σε κοιλότητες βράχων και τρέφεται με ψάρια, καβούρια και καλαμάρια. Το κρέας της είναι βρώσιμο. Υπάρχουν δεδομένα που μας δείχνουν ότι μπορεί να είναι πιθανός θηρευτής του ξενικού λεονταρόψαρου (*Pterois miles*)

(edit)Περίοδος ψαρέματος = Όλες οι εποχές, Δόλωμα = Νεκρά ή ζωντανά ψαράκια καλαμάρια χταπόδι κλπ, Αγκίστρι = 2-6, Μπετονιά = 0.35-0.45 mm, Ζεί σε τρύπες στους βράχους, ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ όταν πιαστεί ή ενοχληθεί. Τα σαν ξυράφι δόντια της κόβουν εύκολα κομμάτια σάρκας. Μπορεί να παραμείνει ζωντανή για ώρες έξω από το νερό γι' αυτό καλύτερα να κόψουμε το κεφάλι της για σιγουριά

Σκορπιός



Οι σκορπίνες ή σκορπιοί ή σκόρπαινες (*Scorpaena* spp.) είναι ευμεγέθη ψάρια (στην πλειοψηφία τους) των θερμών και εύκρατων θαλασσών. Ανήκουν στην οικογένεια των σκορπαινιδών (*Scorpaenidae*).

Φέρουν σώμα πεπιεσμένο με ογκώδη κεφαλή και με αρκετά ανεπτυγμένα πτερύγια ενώ το σώμα του από την κοιλιά και κάτω είναι λεπτό. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι το κόκκινο ως επί το πλείστον χρώμα και ο μεγάλος αριθμός ακάνθων που φέρουν στο κεφάλι και τη ράχη, των οποίων τα νύγματα είναι οδυνηρά αλλά και λίγο επικίνδυνα περιέχοντας δηλητήριο.

Οι σκορπίνες είναι ψάρια αδηφάγα και τρέφονται με άλλα μικρότερα ψάρια. Το κρέας τους είναι κάτασπρο και από τα πιο κατάλληλα στη παρασκευή εξαιρετού ζωμού. Για το λόγο αυτό, στα εστιατόρια σερβίρονται ως σούπα.

Γνωστότερα είδη στις ελληνικές θάλασσες είναι το *Scorpaena scrofa* και το *Scorpaena porcus*.

Ο σκορπιός αλιεύεται με δίχτυα και με όλα τα είδη αγκιστριών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αφαίρεση του αγκιστρίου, ασφαλέστερο πιάσιμο είναι από το κάτω χείλος του.

Αρκετή ώρα από την αλίευσή του διατηρείται ζωντανός και σε κάθε πλησίασμα μπορεί να φουσκώσει και να αναπηδήσει με κίνδυνο να τραυματίσει όποιον προσπαθήσει να το ακουμπήσει.

Ο πόνος από το δηλητήριο του σκορπιού μπορεί να επουλωθεί αρχικά με ζεστό νερό και κατόπιν με εξέταση από κάποιο γιατρό.

Απαντά σε βάθος από 2 μέχρι 200 μέτρα. Τα μικρότερα άτομα του είδους βρίσκουν καταφύγιο σε ρηχά νερά, μεταξύ 2 και 30 μέτρων ενώ τα μεγαλύτερα άτομα προτιμούν τα πιο βαθιά νερά. Τρέφεται με μαλάκια οστρακόδερμα και ψάρια ακόμα και με μικρότερους σκορπιούς του ίδιου είδους. Είναι καιροσκόπος μοναχικός κυνηγός που караδοκεί καμουφλαρισμένος περιμένοντας τη λεία του να πλησιάσει. Η αναπαραγωγική περίοδος του ξεκινά κατά την άνοιξη. , kirios trogete os soupa(den jero pos akribos alla kai isos kanonika)

(edit)Περίοδος ψαρέματος = Όλες οι εποχές , Δόλωμα = Οτιδήποτε δόλωμα , Αγκίστρι = 4-10 , Μπετονιά 0.20-0.30 mm , Θα το βρούμε κοντά σε βράχια. Πιάνεται τη νύχτα , ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δηλητηριώδες πτερύγιο προκαλεί αφόρητους πόνους

Σκαρμός



Σκαρμός (*Synodus saurus*)

Αυτό το είδος είναι εγγενές σε ένα υποτροπικό κλίμα. Το μέγιστο εγγεγραμμένο μήκος του είναι περίπου 40 εκατοστά. Η κατανομή αυτού του είδους καταλαμβάνει τις περιοχές του Ανατολικού Ατλαντικού, του Μαρόκου, του Πράσινου Ακρωτηρίου, των Αζορών, της Μεσογείου, του Δυτικού Ατλαντικού, των Βερμούδων και των νησιών Leeward.

Το είδος αυτό είναι κυρίως γνωστό ότι βρίσκεται στα νησιωτικά νερά και πάνω από αμμώδεις βυθούς ή πυθμένα άμμου-βράχου. Η διατροφή του σκαρμού περιλαμβάνει κυρίως άλλα είδη ψαριών, αλλά είναι γνωστό επίσης να τρέφονται περιστασιακά και με άλλα ζώα. Ο σκαρμός κρατιέται κρυμμένος και καμουφλαρισμένο στην άμμο. Παρόλο που κρύβεται στην άμμο, αυτό το είδος αποκαλύπτει τα μάτια του έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το θήραμά του και να αναπηδά όταν υπάρχει διαθέσιμο φαγητό.

(edit)(perigrafi)Ο Σκαρμός ή Παπανικολής όπως είναι πολύ κοινό ψάρι στα νερά της Μεσογείου. Είναι βενθικό είδος και ζει σε περιοχές με βραχώδεις πυθμένες με βλάστηση, αλλά, κυρίως, περιφέρεται σε περιοχές με αμμολασπώδη υποστρώματα σε βάθος μέχρι και 400 μέτρα. Το σώμα του είναι στενόμακρο, το κεφάλι κάπως πλακωτό σαν του φιδιού, τα μάτια ψηλά, κοντά το ένα με το άλλο κάτω από ένα εξόγκωμα μετωπικό. Το στόμα του είναι σκιστό, μακρύ ως πίσω απ' τα μάτια, με δόντια μυτερά και στις δυο σιαγόνες. Τα λέπια του είναι λεπτά και παρδαλά και θυμίζουν φιδίσια, η πλευρική γραμμή ολόισια. Το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο τριγωνικό, ένα δεύτερο προς τα κάτω πολύ μικρό, θωρακικά και κοιλιακά όπως και το εδρικό μαλακά, η ουρά διχαλωτή.

(edit)βάθος μέχρι και 400 μέτρα, Είναι καιροσκόπος κυνηγός και караδοкеί καμουφλαρισμένος στην άμμο περιμένοντας τη λεία του να πλησιάσει δηλαδή είναι ένα σαρκοφάγο αρπακτικό ψάρι και τρέφεται με μικρά ψάρια και ασπόνδυλα. Ο σκαρμός δεν διστάζει να επιτεθεί σε δολώματα μεγαλύτερα από τον ίδιο. , Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους αρχίζει το Φεβρουάριο και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο.

Σκαθάρι



Το σκαθάρι είναι ένα μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 60 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 30 εκατοστά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Spondylusoma cantharus* και ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών (Sparidae).

Συγγενεύει με το σαργό, το σπάρο και το μελανούρι. Επίσης, είναι γνωστό ως ασκάθαρος, βαγιούνο ή βαζιούνο. Είναι ερμαφρόδιτο, γεννιέται ως θηλυκό και στη συνέχεια γίνεται αρσενικό.

Το σκαθάρι απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Σκανδιναβία έως τη Βόρεια Ναμίμπια, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου. Συναντάται σε βάθη 5 – 300 μέτρα.

Το χρώμα του είναι ασημόχρυσο ή σκούρο καφέ σε όλη του την έκταση ενώ φέρει ορισμένες σκούρες παράλληλες και κάθετες γραμμές στο σώμα του. Είναι βενθοπελαγικό είδος. Τα μικρά σκαθάρια ζουν σε βραχώδεις περιοχές ή φυκιάδες κοντά στις ακτές, ενώ όταν μεγαλώσουν προτιμούν τα βαθιά νερά με αμμώδεις βυθούς. Τρέφεται με φύκια και μικρά ασπόνδυλα, κυρίως καρκινοειδή. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους είναι από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο.

Σάλπα



Η σάλπα ή σάρπα είναι ένα μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 51 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 30 εκατοστά. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Sarpa salpa* και ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών (Sparidae).

Η σάλπα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από το Βискаϊκό κόλπο έως τη Σιέρα Λεόνε, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου, της Μαδέρα, των Κανάριων Νήσων και του Πράσινου Ακρωτηρίου. Συναντάται σε βάθη 5 – 70 μέτρα.

Το χρώμα της είναι πρασινοκίτρινο στη ράχη και ασημί στην κοιλιά. Η σάλπα αναγνωρίζεται πολύ εύκολα από τις πολλές χρυσές λωρίδες που φέρει κατά μήκος σώματός της. Η σάρπα είναι κοινωνικό ψάρι και σχηματίζει πολυπληθή κοπάδια με άτομα του ίδιου είδους, που έχουν παρόμοιο μέγεθος. Είναι ψάρι που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με φυτικούς οργανισμούς, αλλά σε νεαρή ηλικία είναι σαρκοφάγο και δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στα οστρακόδερμα. Η αναπαραγωγή του είδους λαμβάνει χώρα σε δύο περιόδους. Η πρώτη ξεκινά τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται το Μάιο, ενώ η δεύτερη ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και διαρκεί μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.

Η σάλπα ψαρεύεται εύκολα με καλαμίδι και αγκίστρι δολωμένο με ζυμάρι, και το κρέας της τρώγεται από τον άνθρωπο, αν και δεν θεωρείται τόσο νόστιμο, αλλά χρησιμεύει και ως ζωντανό δόλωμα. Πιάνεται επίσης με δίχτυα και με κιούρτους. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η βρώση ψαριών που έχουν καταναλώσει φύκια(fita) του γένους *Caulerpa*, πιθανόν να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση και στομαχικές διαταραχές στον άνθρωπο.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = Ιούλιος-Νοέμβριος , Δόλωμα = καλαμάρι γαρίδα ζυμάρι κλπ , Αγκίστρι = 10-14 , Μπετονιά = 0.20-0.25 mm

Σαλάχι



Το σαλάχι ή σελάχι είναι η κοινή ονομασία των υποτρηματικών χονδριχθύων, δηλαδή των χονδριχθύων (ψάρια με χόνδρινο σκελετό) που το σώμα τους είναι νωτοκοιλιακά συμπιεσμένο. Τα σαλάχια ανήκουν στην υπερτάξη βατοειδή (Batoidea).

Η γεωγραφική κατανομή των σαλαχιών είναι παγκόσμια. Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά είδη σαλαχιών. Αρκετά από αυτά βρίσκονται υπό το καθεστώς αυστηρής προστασίας, καθώς οι πληθυσμοί τους κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Τα σαλάχια εμφανίζουν ποικιλία μεγεθών και κάποια από αυτά φτάνουν σε πολύ μεγάλα μεγέθη. Το μεγαλύτερο σαλάχι στον κόσμο είναι το Διαβολόψαρο (*Mobula mobular*), με μέγιστο μήκος τα 5,2 μέτρα και βάρος που αγγίζει τον 1,5 τόνο.

Το σώμα των σαλαχιών είναι ατρακτοειδές, ενώ τα θωρακικά πτερύγια (αναφέρονται και ως «φτερά») είναι τόσο μεγάλα που μαζί με τον κεντρικό κορμό και το κεφάλι σχηματίζουν μια ομοιόμορφη πεπλατυσμένη επιφάνεια. Με τα πτερύγια αυτά μπορούν, με διάφορες κινήσεις, να κολυμπούν και να ελίσσονται πολύ γρήγορα. Μια κατηγορία σαλαχιών, οι ρινόβατοι (οικ: *Rhinobatidae*), έχουν πολύ επίμηκες ρύγχος και γενικότερα μακρόστενο σώμα που καταλήγει σε ουρά σαν αυτή των καρχαριών. Το στόμα των σαλαχιών βρίσκεται στην κάτω επιφάνεια, μπροστά από την κοιλιά, ενώ τα δόντια τους είναι πριονωτά. Το δέρμα της ράχης είναι σκληρό και τραχύ με ποικιλία χρωματισμών, γκριζωπό, κιτρινωπό ή ελαιοπράσινο. Σε ορισμένες οικογένειες όπως οι ράγιες (*Rajidae*), ο χρωματισμός είναι, συνήθως, ένας συνδυασμός καφέ απόχρωσης και μαύρων κηλίδων ή στιγμάτων, ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από το περιβάλλον όπου ζει το άτομο.

Η όσφρηση και η όρασή των σαλαχιών είναι εξαιρετικά αναπτυγμένες. Τα μάτια τους βρίσκονται στη ράχη, ενώ σε ορισμένα είδη (*Aetomylaeus* spp.) είναι τοποθετημένα πλευρικά στο κεφάλι, το οποίο καταλήγει σε ένα στρογγυλεμένο ρύγχος. Το άκρο του σώματός τους καταλήγει σε μακριά ουρά που μοιάζει με μαστίγιο, η άκρη της οποίας σε αρκετά είδη έχει δηλητήριο και σε μερικά ηλεκτρισμό. Αποτελεί ισχυρό όπλο αλλά και όργανο αναπαραγωγής.

Τα σαλάχια θεωρούνται ζωτόκα είδη καθώς τα αβγά τους γονιμοποιούνται μέσα στο σώμα της μητέρας και παραμένουν εκεί μέχρι την εκκόλαψη. Τότε, τα μικρά σαλάχια βγαίνουν από το σώμα του θηλυκού πλήρως ανεπτυγμένα μορφολογικά.

Τα σαλάχια είναι σαρκοφάγα και τρέφονται με ψάρια, καρκινοειδή, εχινόδερμα και δίθυρα μαλάκια. Μερικά είδη θεωρούνται επικίνδυνα για τον άνθρωπο, όπως οι μουδιάστρες (οικ: *Torpedinidae*), οι οποίες με σύσπαση των μυών προκαλούν διαφορά δυναμικού και ηλεκτρικούς παλμούς.

Σαρδέλα



Η σαρδέλα είναι ένα μικρό ψάρι με μέγιστο μήκος τα 27,5 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 20 εκατοστά. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Sardina pilchardus* και ανήκει στην οικογένεια των κλυπεϊδών (Clupeidae).

Η σαρδέλα απαντάται στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Βόρεια θάλασσα έως τη Σενεγάλη, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας καθώς και της Θάλασσας του Μαρμαρά. Συναντάται σε βάθη 10 – 100 μέτρα.

Το χρώμα της ράχης είναι πράσινο-καφέ και κατά μήκος των πλευρών φέρει μία μπλε λωρίδα. Η κοιλιά είναι χρώματος ασημί ή λευκού, ενώ τα πτερύγια είναι άχρωμα, εκτός του ραχιαίου που έχει έναν απροσδιόριστο ελαφρύ χρωματισμό. Ζει σε μεγάλα κοπάδια σε βάθος μέχρι και 100 μέτρα κατά τη διάρκεια της μέρας, ενώ ανεβαίνει πιο κοντά στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τρέφεται με πλαγκτόν, φιλτράροντας το νερό καθώς κολυμπάει.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 11 εκατοστά.

Αναπαράγονται σε βάθος 20-25 μ. σε ομάδες τόσο κοντά σε ακτές όσο και στην ανοιχτή θάλασσα. Η αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα τον Απρίλιο στις περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας τον Ιούνιο με Αύγουστο στη Βόρεια Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο στις ακτές της Μεσογείου και Νοέμβριο με Ιούνιο στις αφρικανικές ακτές της Μεσογείου, *doloma = psomi kai isos psari sto edafos?*

Σαργός



Ο σαργός είναι ένα μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 45 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 22 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 2 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Diplodus sargus* και ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών (Sparidae).

Ο σαργός απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Βόρεια Βρετάνη μέχρι τα Κανάρια Νησιά και τη Μαδέρα και φυσικά στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 0 – 50 μέτρα.

Το χρώμα του είναι ασημόχρυσο και πιο σκούρο στη ράχη, ενώ έχει στα πλευρά του 9-12 γκρίζες κάθετες γραμμές που δεν τις ξεχωρίζουμε πάντοτε εύκολα, αλλά το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ένας μαύρος δακτύλιος στη βάση της ουράς και μια έντονη μαύρη απόχρωση στο τέλος του ουραίου πτερυγίου. Ο σαργός ζει σε όλους του τύπους βυθού αν και προτιμά περισσότερο τους βραχώδεις παρά τους αμμώδεις. Τρέφεται με σκουλήκια, οστρακόδερμα, μαλάκια, οστρακοειδή και περιστασιακά με άλγη. Είναι αρκετά δραστήριο και κινητικό ψάρι, ιδίως τις βραδινές και πρωινές ώρες, κατά τις οποίες βγαίνει πιο συχνά από την τρύπα του για να κυνηγήσει. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους ξεκινά το Δεκέμβριο και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 23 εκατοστά.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = ιουλιος-νοεμβριος , Δόλωμα = καλαμάρι γαρίδα ζυμάρι tiri skouliki κλπ , Αγκίστρι = 8-14 , Μπετονιά = 0.20-0.25 mm

Ροφός



Ο ροφός είναι ένα μεγάλο ψάρι με μέγιστο μήκος το 1,5 μέτρο. Μπορεί να φτάσει έως και τα 60 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Erioperhelus marginatus* και ανήκει στην οικογένεια των σερανιδών (*Serranidae*). Συγγενεύει με τη στήρα και τη σφυρίδα.

Ο ροφός απαντάται στον Ανατολικό και Νοτιοδυτικό Ατλαντικό καθώς και στον Δυτικό Ινδικό ωκεανό. Φυσικά είναι πολύ κοινό ψάρι και στη Μεσόγειο θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 8 – 300 μέτρα, συνήθως έως 50 μέτρα.

Το χρώμα του είναι σκούρο καφέ προς το μαύρο (ανάλογα την μορφολογία του βυθού που ζει) με κίτρινες κηλίδες σαν νέφη. Ο ροφός ζει συνήθως μόνος του σε βραχώδεις εγκολπώσεις (θαλάμους) γύρω από τις οποίες περιφέρεται. Επομένως είναι βενθικό είδος και τρέφεται κυρίως με καβούρια και κεφαλόποδα (σουπιές, χταπόδια, καλαμάρια). Κυνηγά τη λεία του, συνήθως, ενεδρεύοντας κοντά στη φωλιά του. Η αναπαραγωγή του λαμβάνει χώρα κατά το καλοκαίρι.

Πρόκειται για πρωτόγυνο ερμαφρόδιτο είδος όπου αφού ξεπεράσει τα 50 εκατοστά περίπου αλλάζει φύλο και γίνεται αρσενικό. Αυτή ακριβώς η βιολογία του είδους τείνει να το κάνει είδος προς εξαφάνιση καθώς η αφαίρεση μεγάλων ατόμων αφαιρεί όλα τα αρσενικά, ενώ η αφαίρεση μικρών ατόμων κάτω από τα 45 εκατοστά που ορίζει η νομοθεσία είναι παράνομη, αλλά δεν έχουν ωριμάσει σεξουαλικά και τα θηλυκά του είδους. Συνεπώς προτείνεται η αλιεία του ροφού να αποφεύγεται καθώς το είδος λειτουργεί σαν ρυθμιστής του βυθού, αφαιρώντας τα άρρωστα και αδύναμα άτομα της περιοχής, κρατώντας ισορροπία στον βυθό.

Ο ροφός έχει εξαιρετικής ποιότητας κρέας και μεγάλη εμπορική αξία και για αυτό το λόγο υπάρχει σημαντική μείωση στο απόθεμα του σε όλη τη Μεσόγειο. Αλιεύεται, κυρίως, με χοντρό παραγάδι, καθετή, συρτή βυθού, πλάνους και πιο σπάνια με στατικά δίχτυα. Δόλωμα χρησιμοποιείται συνήθως ψαροδόλι ή βραστό καθαρό κρέας χταποδιού (χωρίς το δέρμα) ή για καλύτερα ζωντανό δόλωμα.

Όταν ο ροφός “πιαστεί” στη πετονιά καταφεύγει στο θαλάμι του και εκεί φουσκώνοντας τα σπάραχνα και στρέφοντας την ουρά του προσπαθεί να “μαγκώσει”, καθιστώντας την απόσπασή του δύσκολη.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 45 εκατοστά.

Το χρώμα του είναι σκούρο καφέ προς το μαύρο (ανάλογα την μορφολογία του βυθού που ζει) με κίτρινες κηλίδες σαν νέφη, γι’ αυτό το λόγο ονομάζεται και “επινέφελος”, δηλαδή νεφροσκεπής⁽²⁾.

Είναι το κυρίαρχο ψάρι στη Μεσόγειο ενώ συναντάται και στον Ανατολικό Ατλαντικό, στον Δυτικό Ινδικό ωκεανό στην Μοζαμβίκη, Μαδαγασκάρη, στην νότια Βραζιλία και από την Ουρουγουάη μέχρι την Αργεντινή. Λατρεύει τα ζεστά νερά. Είναι πολύ νόστιμο ψάρι γνωστό από την αρχαιότητα. Ο Ροφός γίνεται υπέροχη σούπα.

Ο ροφός ζει συνήθως μόνος του σε βραχώδεις εγκολπώσεις (θαλάμους) γύρω από τις οποίες περιφέρεται. Μόνο οι μικροί ροφοί ζουν κατά κοπάδια. Ο ροφός αλιεύεται με πετονιά ή ψαροτούφεκο και με κιούρτο κοντά στη θαλάμη του. Δόλωμα χρησιμοποιείται συνήθως ψαροδόλι ή βραστό καθαρό κρέας χταποδιού (χωρίς το δέρμα) ή για καλύτερα ζωντανό δόλωμα.

Όταν ο ροφός “πιαστεί” στη πετονιά καταφεύγει στη θαλάμη του και εκεί φουσκώνοντας τα σπάραχνα και στρέφοντας την ουρά του προσπαθεί να “μαγκώσει”, καθιστώντας την απόσπασή του δύσκολη.

Πολλοί ψαράδες τότε περνούν στη πετονιά βαριά μεταλλικά αντικείμενα προκειμένου να τον χτυπήσουν έτσι στο ρύγχος και να πεταχτεί έξω. Άλλοι χρησιμοποιούν μικρό πλωτήρα ή παράβλημα που δένουν στην πετονιά “τεζαριστά” (κοντά και σφιχτά), μισό μέτρο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, οπότε στη πρώτη αναπνοή του ροφού (που αναγκαστικά θα ξεφουσκώσει) αυτό θα το εκθαλαμώσει.

Με το ψαροντούφεκο η αλιεία του είναι περισσότερο εύκολη διότι δεν μετακινείται από τη θαλάμη του. Αντίθετα με κιούρτο είναι περισσότερο δύσκολη.

Η αλιεία των μικρών ροφών και άλλων πετρόψαρων γίνεται με παραγάδι.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ανέβασμα του ροφού στη βάρκα που πρέπει να γίνει με γάντζο ή πιάνοντάς τον με τον δείκτη και τον αντίχειρα από τα μάτια και ποτέ από τα σπάραχνα, που κυριολεκτικά κόβουν σαν μαχαίρι και μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.

Επισημαίνεται πως η χρήση φακού ή άλλων παράνομων χημικών μέσων επισύρουν πολύ αυστηρές ποινές.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = Όλες οι εποχές , Δόλωμα = Νεκρά ή ζωντανά ψαράκια καλαμάρι garida skouliki κλπ , Αγκίστρι = 2-8 , Μπετονιά = 0.35-0.45 mm , ua to broume tin nixta

Ρέγγα



Η ρέγγα είναι ένα λιπαρό ψάρι του γένους *Clupea* το οποίο βρίσκεται στα ρηχά και ζεστά νερά του βόρειου Ειρηνικού και του βόρειου Ατλαντικού ωκεανού και της Βαλτικής. Δύο είδη *Clupea* αναγνωρίζονται, η ρέγγα του Ατλαντικού (*Clupea harengus*) και η ρέγγα του Ειρηνικού (*Clupea pallasii*).

Το μέγιστο μήκος τους είναι 45 εκατοστά με πιο σύνηθες τα 25 – 30 εκατοστά.

Η ρέγγα ζει κοπαδιαστά σε ψυχρά νερά με μέτριο βαθμό αλμυρότητας και πλησιάζει τις ακτές μεταξύ Απριλίου-Ιουνίου. Ζει, κυρίως, στις θάλασσες που περιβάλλουν την Ασία και την Βόρεια Ευρώπη, αλλά και κατά το μήκος των ακτών της Νότιας και της Βόρειας Αμερικής. Σπάνια απαντιέται στην Μεσόγειο θάλασσα, στην περιοχή του Γιβραλτάρ.

Οι ρέγγες είναι κυνηγόψαρα, κινούνται σε μεγάλα κοπάδια, και πλησιάζουν την άνοιξη στις ακτές της Ευρώπης και της Αμερικής, όπου αλιεύονται και συντηρούνται συνήθως παστά ή καπνιστά.

(edit)mallon trone alla psaria

Πεσκαντρίτσα



Η πεσκαντρίτσα ή σκλημπού ή φανάρι είναι ένα ευμέγεθες ψάρι με μέγιστο μήκος τα 2 μέτρα και πιο σύνηθες τα 100 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 57,7 κιλά. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Lophius piscatorius* και ανήκει στην οικογένεια των λοφειιδών (Lophiidae).

Η πεσκαντρίτσα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από το Νοτιοδυτικό Μπάρεντς έως το Στενό του Γιβραλτάρ, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας. Συναντάται σε βάθη 20 – 1000 μέτρα.

Το χρώμα της είναι σκούρο λαδί. Έχει χαρακτηριστικό σχήμα με μεγάλο, επίπεδο κεφάλι και πλακουτσωτό σώμα. Το κεφάλι της είναι πολύ μεγάλο και πεπιεσμένο, ενώ οι δύο σιαγόνες είναι οπλισμένες με σειρές από μακριά μυτερά δόντια. Αυτά είναι κεκλιμένα προς τα μέσα, και όταν κλείνουν επιτρέπουν σε ένα αντικείμενο να γλιστρήσει προς το στομάχι, αλλά να εμποδίζει την έξοδό του από το στόμα. Η πεσκαντρίτσα τρέφεται κυρίως με ψάρια. Περιμένει μισοθαμμένη στον πυθμένα χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μια νηματοειδή απόφυση.

(edit) Τρέφεται με ψάρια και σπανιότερα με θαλασσοπούλια. Περιμένει μισοθαμμένη στο πυθμένα χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μια νηματοειδή απόφυση. Η αναπαραγωγική περίοδος της πεσκαντρίτσας δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη στην θάλασσα μας όμως κατά πάσα πιθανότητα λαμβάνει χώρα κατά τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου. Η πεσκαντρίτσα αποτελεί σχεδόν αποκλειστικό αλίευμα της τράτας βυθού αν και κάποτε συλλαμβάνεται και με στατικά δίχτυα. Το κρέας της είναι πολύ καλής ποιότητας και έχει ψηλή τιμή στην αγορά. Στους καλοφαγάδες είναι σίγουρα γνωστή η νόστιμη ψαρόσουπα που φτιάχνεται από την ουρά της.

Παλαμίδα



Η παλαμίδα είναι ένα μεσαίου μεγέθους επιπελαγικό ψάρι με μέγιστο μήκος τα 91,4 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 50 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 11 κιλά. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Sarda sarda* και ανήκει στην οικογένεια των σκομβριδών (Scombridae).

Η παλαμίδα απαντάται στον Δυτικό Ατλαντικό και Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Νορβηγία έως το Λιμάνι Ελίζαμπεθ στη Νότια Αφρική. Είναι πολύ γνωστή στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 80 – 200 μέτρα.

Το χρώμα της είναι ασημί στην κοιλιά, ενώ η ράχη και οι πίσω πλευρές έχουν μεταλλικό μπλε χρώμα. Στη ράχη της φέρει πλάγιες γραμμές, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη γωνία απ' ό,τι τα άλλα είδη του γένους. Η παλαμίδα τρέφεται, κυρίως με ψάρια, καλαμάρια και γαρίδες, ενώ παρουσιάζει και κανιβαλιστική συμπεριφορά. Είναι μεταναστευτικό είδος, που κινείται στην επιφάνεια. Αναπαράγεται στα νερά μας από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο.

Πέρκα



Η πέρκα είναι ένα μικρό ψάρι με μέγιστο μήκος τα 36 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 25 εκατοστά. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Serranus scriba* και ανήκει στην οικογένεια των σερανιδών (*Serranidae*). Συγγενεύει με το χάνο.


Η πέρκα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από το Βισκαϊκό κόλπο έως τη Μαυριτανία, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας, των Κανάριων Νήσων και τις Αζόρες. Συναντάται σε βάθη 5 – 150 μέτρα συνήθως έως 30 μέτρα.

Το χρώμα της είναι πολύ ανοιχτό ροδί, με πέντε καφετιές διχαλωτές ταινίες στα πλευρά. Τα ενήλικα έχουν στην κοιλιά μια μενεξεδιά απόχρωση. Είναι βενθικό είδος και τρέφεται με μικρά ψάρια, οστρακόδερμα και μαλάκια. Η πέρκα είναι σύγχρονο ερμαφρόδιτο είδος, δηλαδή έχει ταυτόχρονα γεννητικά όργανα και των δύο φύλων αλλά χρησιμοποιεί ένα από τα δύο για αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο.

Ψαρεύονται με καθετή, από στεριάς κι από βάρκα. Συχνά βρίσκονται ακίνητες στον βυθό μέσα σε φυκιάδες ή βράχους. Το κρέας τους είναι αρκετά νόστιμο.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = Όλες οι εποχές , Δόλωμα = καλαμάρι garida skouliki κλπ , Αγκίστρι = 8-12 , Μπετονιά = 0.20-0.25 mm , ua tin broume konta se braxia ston biuo

Ξιφίας



Ο ξιφίας είναι ένα μεγάλο πελαγικό ψάρι και ένας ανώτατος θηρευτής με μέγιστο μήκος τα 4,5 μέτρα και πιο σύνηθες τα 3 μέτρα. Μπορεί να φτάσει σε βάρος τα 650 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Xiphias gladius* και ανήκει στην οικογένεια των ξιφιδών (Xiphiidae).

Ο ξιφίας απαντάται σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ατλαντικός, Ινδικός και Ειρηνικός ωκεανός, Μεσόγειος και Μαύρη θάλασσα, σε τροπικά, εύκρατα και μερικές φορές και κρύα νερά. Συναντάται σε βάθη 0 – 2878 μέτρα, συνήθως έως 550 μέτρα. Είναι ευκαιριακός θηρευτής που ψάχνει για τροφή από την επιφάνεια μέχρι το βυθό. Τρέφεται με ψάρια και καλαμάρια, τα οποία πρώτα σκοτώνει με τη βοήθεια του ρύγχους του. Η αναπαραγωγή του ξιφία λαμβάνει χώρα από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο, με αποκορύφωμα την περίοδο από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τον Αύγουστο.

Η αλιεία του ξιφία γίνεται αποκλειστικά και μόνο από επαγγελματίες αλιείς που έχουν ειδική άδεια για την αλιεία του είδους. Απαγορεύεται η αλιεία ατόμων ξιφία με μεσουραίο μήκος κάτω γνάθου μικρότερο των 100 εκατοστών ή ζώντος βάρους μικρότερου των 11,4 κιλών, ή βάρους ατόμων εκσπλαγχνισμένων και χωρίς βράγχια μικρότερου των 10,2 κιλών.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = Όλες οι εποχές , Δόλωμα = tsiroura καλαμάρι κλπ , prosoxi = poli epikindino

Μυλοκόπι



Το μυλοκόπι είναι ένα μεγάλου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 73 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 40 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 10 κιλά, αλλά σπάνια ξεπερνά τα 4 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Umbra cirrosa* και ανήκει στην οικογένεια των σκιαινιδών (*Sciaenidae*). Είναι συγγενής με τον σηκίο ή παντελή.

Το μυλοκόπι απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από το Βискаϊκό κόλπο και το Γιβραλτάρ έως το Νότιο Μαρόκο, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας καθώς και της Θάλασσας του Αζόφ. Συναντάται σε βάθη 0 – 100 μέτρα.

Το χρώμα του είναι σκούρο σταχτί στη ράχη και ασημόλευκο στην κοιλιά. Φέρει, επίσης, κυματιστές λοξές γραμμές που χρυσίζουν και έχουν άσπρα και μαύρα ενδιάμεσα στίγματα. Το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο είναι σχεδόν τριγωνικό και το δεύτερο ίσιο και φτάνει μέχρι την ουρά. Το μυλοκόπι είναι βενθικό είδος και τρέφεται, κυρίως, με βενθικά ασπόνδυλα, που βρίσκει σκαλίζοντας το μαλακό υπόστρωμα. Η περίοδος αναπαραγωγής του διαρκεί από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = ιουλιος-νοεμβριος , Δόλωμα = garida skouliki κλπ , Αγκίστρι = 6-10 , Μπετονιά = 0.20-0.25 mm

Μπαλάς



Ο μπαλάς είναι ένα μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 65 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 30 εκατοστά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Dentex macrophthalmus* και ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών (Sparidae).

Ο μπαλάς απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από την Πορτογαλία έως τη Ναμίμπια, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου θάλασσας, του Πράσινου Ακρωτηρίου και των Κανάριων Νήσων. Συναντάται σε βάθη 30 – 500 μέτρα.

Το χρώμα του είναι κοκκινωπό σε όλο το σώμα και τα πτερύγια ενώ η πλευρική γραμμή είναι σε έντονη κόκκινη απόχρωση. Το μάτι του είναι σχετικά μεγάλο. Είναι βενθοπελαγικό είδος και προτιμά τα βαθιά νερά. Τρέφεται με μικρά ψάρια και καρκινοειδή, ενώ τα νεαρά άτομα του είδους τρέφονται με πλαγκτονικούς οργανισμούς. Αναπαράγεται μία φορά κάθε χρόνο.

(edit)anaparagogiki periodos = Ιούλιο και τον Αύγουστο

Μπαρμπούνι



Το μπαρμπούνι είναι ένα μέτριου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 40 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 25 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και το 1 κιλό. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Mullus surmuletus* και ανήκει στην οικογένεια των μουλλιδών (Mullidae).

Είναι στενός συγγενής με την κουτσομούρα.

Το μπαρμπούνι απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Δυτική Νορβηγία έως το Ντακάρ, τη Σενεγάλη και τα Κανάρια Νησιά, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας. Συναντάται σε βάθη 5 – 409 μέτρα.

Το χρώμα του είναι ερυθρωπό, βαθύτερο στη ράχη και ασημέρυθρο στην κοιλιά, καλύπτεται δε από πολλά μικρά λέπια ωοειδούς σχήματος. Φέρει 3-4 κίτρινες γραμμές κατά μήκος του σώματος. Το μπαρμπούνι αναζητά την τροφή του στο υπόστρωμα με τη βοήθεια των μουστακιών του, τα οποία φέρουν γευστικούς αισθητήρες. Τρέφεται με βενθικούς μικροοργανισμούς, όπως γαρίδες, αμφίποδα, πολύχαιτους, μαλάκια και μικρά ψάρια. Το μπαρμπούνι αναπαράγεται από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 11 εκατοστά.

Μπακαλιάρος



Ο μπακαλιάρος είναι ένα σχετικά μεγάλου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 140 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 45 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 15 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Merluccius merluccius* και ανήκει στην οικογένεια των Μερλουκιδών (*Merlucciidae*).

Ο βακαλάος απαντάται στις περιοχές από τη Νορβηγία και την Ισλανδία έως τη Μαυριτανία και φυσικά σε όλη τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα (Νότιες ακτές). Συναντάται σε βάθη 30 – 1075 μέτρα, συνήθως 70 – 400 μέτρα.

Το χρώμα του είναι συνήθως γκριζόλευκο, αλλά ποικίλλει από καφέ ως πράσινο ή ακόμα και κόκκινο. Συχνά έχει καφετιά ή κοκκινωπά στίγματα, είτε στο σώμα είτε στο κεφάλι. Ζει στο βυθό κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη νύχτα ανεβαίνει σε επιφανειακά θαλάσσια ρεύματα. Τρέφεται με καλαμάρια, αντζούγιες, σαρδέλες, ρέγγες, γαρίδες και άλλα μικρά ψάρια. Αναπαράγεται όλο το χρόνο, αλλά πιο έντονα τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες.

Η ονομασία προέρχεται από το πορτογαλικό *bacalhau*, μιας και οι πρώτοι που το παρατήρησαν ήταν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι του 16ου αιώνα.

Αλιεύεται κυρίως στον Ατλαντικό, αλλά και στη Μεσόγειο, με δίχτυα και παραγάδια. Μαγειρεμένος θεωρείται εκλεκτό φαγητό, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία είναι το πιο συνηθισμένο ψάρι στο δημοφιλές έδεσμα “fish and chips”. Έχει ευχάριστο άρωμα, χαμηλά λιπαρά, πολλές πρωτεΐνες και πυκνή λευκή σάρκα, που απολεπίζεται εύκολα. Από το συκώτι των βακαλάων παρέχεται το μουρουνέλαιο, το έλαιο του βακαλάου, που αποτελεί σημαντική πηγή για τις βιταμίνες A, D, K και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (EPA and DHA).

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 20 εκατοστά.

Μουρμούρα



Η μουρμούρα είναι ένα μέτριου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 55 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 30 εκατοστά. Μπορεί να ξεπεράσει το 1 κιλό σε βάρος. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Lithognathus mormyrus* και ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών (*Sparidae*).

Η μουρμούρα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από το Βισκαϊκό κόλπο και όλη την ακτή της Δ. Αφρικής έως τον Δυτικό Ινδικό ωκεανό και τις ακτές της Μοζαμβίκης. Βεβαίως απαντά πολύ συχνά και στη Μεσόγειο θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 0 – 150, συνήθως 10 – 20 μέτρα.

Το χρώμα της είναι λαμπερό ασημί με 10-12 κάθετες καστανόμαυρες σειρές στη ράχη και στα πλευρά. Η ράχη είναι γκρι, τα πλευρά ασημί και η κοιλιά άσπρη. Η μουρμούρα ζει σε ρηχά νερά κοντά στις ακτές, σε βυθούς με άμμο ή αμμολάσπη και σε λιβάδια ποσειδωνίας. Είναι βενθικό είδος και τρέφεται με σκουλήκια, μαλάκια και μικρά καρκινοειδή που ξεθάβει σκάβοντας με το στόμα της τον πυθμένα. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους ξεκινά το Μάιο και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο.

Η μουρμούρα ψαρεύεται με πεταχτάρι, με καθετή και με παραγάδια ψιλά.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 20 εκατοστά.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = ioulios-noembrios , Δόλωμα = kalamari garida zimari skouliki κλπ , Αγκίστρι = 8-12 , Μπετονιά = 0.18-0.25 mm

Μελανούρι



Το μελανούρι είναι ένα μέτριου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 36,6 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 20 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει σε μέγεθος τα 525 γρ. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Oblada melanura* και ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών (Sparidae).

Το μελανούρι απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από το Στενό του Γιβραλτάρ έως την Αγκόλα. Βρίσκεται άφθονο στη Μεσόγειο θάλασσα. Συναντάται σε βάθη έως 30 μέτρα.

Το χρώμα του στη ράχη είναι ασημοκάστανο ή ασημογάλαζο, στα πλευρά είναι ασημί και στην κοιλιά έχει δέκα περίπου πολύ ψιλές μακρουλές γκριζόμαυρες γραμμές. Όταν ερεθίζεται το χρώμα του σκουραίνει προς το καφέ και το βαθύ μενεξεδί. Στη ρίζα της ουράς έχει μια πλατιά μαύρη κηλίδα, σχεδόν κλειστή σαν δαχτυλίδι ανάμεσα σε δυο άσπρες πιο στενές. Τα συναντάμε σε ρηχά και βαθιά νερά, σε μικρά κοπάδια στο βυθό, σε αμμούδες και φυκιάδες και κοντά σε βράχους της ακτής. Το μελανούρι είναι παμφάγο ψάρι και τρέφεται, κυρίως, με μικρά ασπόνδυλα και φυτά. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους ξεκινά τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο.

Το μελανούρι πιάνεται συνήθως με παραγάδια, δίχτυα και αρμίδι με φελά καθώς και με συρτή δολωμένη με απλό πούπουλο που σκεπάζει το αγκίστρι.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = ioulios-noembrios, Δόλωμα = kalamari garida zimari tiri skouliki κλπ, Αγκίστρι = 8-14, Μπετονιά = 0.18-0.25 mm

Μουγγρί



Το μουγγρί είναι ένα μεγάλο ψάρι οφιοειδούς σχηματισμού με μέγιστο μήκος τα 300 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 100 – 150 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 110 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Conger conger* και ανήκει στην οικογένεια των εγγελεϊδών (Congridae).

Το μουγγρί απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Νορβηγία και την Ισλανδία έως τη Σενεγάλη και φυσικά εντοπίζεται και στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 0 – 1171 μέτρα.

Το χρώμα του είναι συνήθως γκρίζο, αλλά μπορεί να είναι και σχεδόν μαύρο (παλαιότερα θεωρούσαν ότι υπάρχουν δύο ποικιλίες: η λευκή και η μελανή), ενώ η κοιλιά του είναι άσπρη. Επιπλέον, μία σειρά από μικρές άσπρες κηλίδες υπάρχει σε κάθε πλευρά. Η κεφαλή είναι σχεδόν κωνική και ελαφρώς πεπλατυσμένη. Το ρύγχος είναι στρογγυλεμένο και εξέχει, με πλευρικά ρουθούνια. Τα κωνικά δόντια είναι διατεταγμένα σε σειρές στις σιαγόνες. Το μουγγρί είναι βενθικό είδος και τρέφεται με ψάρια, καρκινοειδή και κεφαλόποδα. Η αναπαραγωγή του λαμβάνει χώρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μαρίδα




Η μαρίδα είναι ένα μικρό ψάρι με μέγιστο μήκος τα 20 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 14 εκατοστά. Το επιστημονικό του όνομα *Sparus smaris* και ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών (Sparidae).

Η μαρίδα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από την Πορτογαλία έως το Μαρόκο, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας καθώς και των Κανάριων Νήσων. Συναντάται σε βάθη 15 – 328 μέτρα.

Το χρώμα της είναι καστανό στην ράχη, σταχτί στα πλευρά και πιο ανοικτό στην κοιλιά. Το αρσενικό ψάρι του είδους, διαφέρει μορφολογικά από το θηλυκό, αφού γίνεται πιο μεγάλο και αποκτά ζωηρούς χρωματισμούς. Η ράχη των αρσενικών γίνεται καστανοκίτρινη και παρουσιάζονται 3 με 4 γαλάζιες ταινίες, η μία καταλήγει στο μέτωπο και σχηματίζει ένα γαλαζοπράσινο πέταλο. Κάθε άτομο έχει μία βούλα στο πλευρό του. Η μαρίδα είναι πολύ κοινωνικό ψάρι και σχηματίζει πολυπληθή κοπάδια από άτομα του ίδιου είδους, καθώς και με το συγγενικό του είδος τσέρουλα. Ζει σε περιοχές με πλούσια βλάστηση και σε αμμολασπώδεις βυθούς. Είναι ημιπελαγικό είδος και τρέφεται με πλαγκτονικούς οργανισμούς και μικρά ασπόνδυλα. Η αναπαραγωγή του είδους λαμβάνει χώρα κατά τα μέσα Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται περί τα τέλη Απριλίου.

Μαγιάτικο



Το μαγιάτικο είναι ένα μεγάλο ψάρι με μέγιστο μήκος τα 190 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 100 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και 80,6 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Seriola dumerili* και ανήκει στην οικογένεια των καραγκιδών (Carangidae).

Το μαγιάτικο απαντάται σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ατλαντικός, Ειρηνικός, Ινδικός ωκεανός και φυσικά Μεσόγειος και Μαύρη θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 1 – 360 μέτρα, συνήθως 18 – 72 μέτρα.

Το χρώμα των ενηλίκων ατόμων στην ραχιαία περιοχή έχει συνήθως χρώμα μπλε-γκρι ή λαδί ενώ στις πλευρές και στην περιοχή της κοιλιάς ο χρωματισμός ανοίγει και εμφανίζεται ένα ασημί- άσπρο χρώμα. Στη μέση ακριβώς του σώματος υπάρχει μια αχνή λωρίδα η οποία μπορεί να έχει χρώμα κίτρινο ή καφέ-ροζ. Οι μεμβράνες ανάμεσα στις ακτίνες των πτερυγίων είναι επίσης χρωματισμένες σε σκούρες αποχρώσεις. Τα ανήλικα άτομα παρουσιάζουν πέντε σκούρες ραβδώσεις στο σώμα και μια έκτη στο τέλος του ουραίου μίσχο και πιο έντονο κίτρινο χρωματισμό στα πτερύγια. Επίσης έχουν μια αχνή σκουρόχρωμη γραμμή που σχηματίζεται διαγώνια του κρανίου και περνά από το μάτι του ψαριού. Είναι βενθοπελαγικό είδος και τρέφεται με μικρά ψάρια όπως οι γαύροι, η σαρδέλα, οι γόπες, αλλά και με μαλάκια.

Στην περίοδο του Μαΐου που η θάλασσα της Μεσογείου αρχίζει να θερμαίνεται τα μαγιάτικα πλησιάζουν στις ακτές για να κυνηγήσουν μεγάλες μάζες μικρών ψαριών αλλά και να αναπαραχθούν. Η περίοδος αυτή ξεκινά από το Μάιο και κλείνει τον κύκλο της τον Σεπτέμβριο. Η πιο έντονη στιγμή της αναπαραγωγής είναι τον Ιούλιο, λόγω της μεγάλης διάρκειας της μέρας, η οποία είναι καθοριστική για την αναπαραγωγή των μαγιάτικων.

Το μαγιάτικο είναι ένα ψάρι με μεγάλη οικονομική σημασία και ενδιαφέρον σε πολλούς τομείς. Η αλιεία του επιφέρει πολλά κέρδη (και στον ελλαδικό χώρο όπου ψαρεύεται με δίχτυα). Ενδιαφέρον έχουν οι προσπάθειες αναπαραγωγής του σε ιχθυοκαλλιέργειες όπου με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς εξελίσσονται (επιτυχείς προσπάθειες έχουν γίνει στο χώρο της Κύπρου). Το Μαγιάτικο είναι ένα μεγάλο ψάρι που λατρεύουν οι ερασιτέχνες ψαράδες και υποβρυχίου ψαρέματος και ψαρέματος από βάρκα.

Λούτσος



Ο λούτσος είναι ένα ευμέγεθες ψάρι με μέγιστο μήκος τα 165 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 60 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 3,6 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Sphyræna sphyraena* και ανήκει στην οικογένεια των σφυραειδών (*Sphyrænidae*).

Στην Ελλάδα μπορούν να βρεθούν και τα είδη *S. viridensis*, *S. chrysotaenia* (ξενικό είδος) και *S. flavicauda* (ξενικό είδος).

Ο λούτσος απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από το Βискаϊκό κόλπο έως την Αγκόλα, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας, των Κανάριων Νήσων και τις Αζόρες. Θα τον βρούμε επίσης στον Δυτικό Ατλαντικό ωκεανό, στις Βερμούδες και τη Βραζιλία. Συναντάται σε βάθη 0 – 100 μέτρα, συνήθως έως 50 μέτρα.

Το χρώμα του είναι γκριζο στη ράχη με κάθετες μαύρες γραμμές και άσπρο-ασημί στην κοιλιά. Ο λούτσος είναι ικανότατος κυνηγός και τρέφεται, κυρίως, με ψάρια και πιο αραιά με κεφαλόποδα και μαλακόστρακα. Για να πιάσει τα θηράματα του όμως, κυνηγάει συνήθως σε κοπάδι. Η τεχνική του ονομάζεται εγκλωβισμός. Η τεχνική αυτή έχει δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση εντοπίζουν το μικρότερο κοπάδι που θα επιτεθούν. Στην συνέχεια οι μισοί λούτσοι κλείνουν το δρόμο στα μικρότερα ψάρια και οι υπόλοιποι πραγματοποιούν γρήγορες και στοχευμένες επιθέσεις για να συλλέξουν την τροφή τους. Η αναπαραγωγή του είδους λαμβάνει χώρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = oles oi epoxes , Δόλωμα = zontana psarakia plastika psarakia koutalaki , Αγκίστρι = 4-8 , Μπετονιά = 0.25-0.35 mm , αρπaktiko = ua to broume arga to apogeuma kai tin nixta

Λυθρίνι



Το λυθρίνι είναι ένα μικρό σχετικά ψάρι με μέγιστο μήκος τα 60 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 25 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 3,2 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Pagellus erythrinus* και ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών (*Sparidae*).

Το λυθρίνι απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Νορβηγία έως τη Γουινέα-Μπισσάου, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου θάλασσας, του Πράσινου Ακρωτηρίου, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων. Συναντάται σε βάθη έως 300 μέτρα αλλά συνήθως 20 – 100 μέτρα.

Το χρώμα του είναι ελαφρώς ροζ και περισσότερο στο τελείωμα των βραγχίων, αλλά έχει και μια υποψία χρώματος ασημί με μικρές μπλε κηλίδες στη ράχη του. Το σώμα του λυθρινιού είναι επίμηκες και συμπιεσμένα πλευρικά. Το κεφάλι του είναι σχετικά μικρό και κυρτό, κάτι το οποίο είναι περισσότερο εμφανές στα ενήλικα άτομα και το στόμα του βρίσκεται κάπως χαμηλά. Η διάμετρος του ματιού είναι η μισή σε σχέση με το ρύγχος του το οποίο είναι το λιγότερο διπλάσιο αυτής, αλλά και κωνικού σχήματος. Τα δόντια του είναι μυτερά. Είναι βενθοπελαγικό είδος και τρέφεται με ασπόνδυλα, κυρίως καρκινοειδή και σκουλήκια, αλλά και με μικρά ψάρια. Το λυθρίνι αναπαράγεται σε δυο περιόδους, το Φθινόπωρο και την Άνοιξη.

Στην Ελλάδα το λυθρίνι είναι είδος ιδιαιτέρως εμπορικό και συναντάται σχεδόν σε όλη την επικράτειά της. Για την παράκτια αλιεία θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα είδη και λόγω της μεγάλης κατανάλωσής του έχει με αργά βήματα μπει και στο χώρο των υδατοκαλλιεργειών. Ακόμα και σήμερα όμως θεωρείται «νέο είδος» και δεν καλλιεργείται στην έκταση που καλλιεργούνται η τσιπούρα και το λαβράκι.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 15 εκατοστά.

Λίτσα



Το είδος *Lichia amia* είναι ένα εμπορικό δυνατό και γρήγορο ψάρι που ανήκει στους Ακτινοπτερύγιους στην οικογένεια Carangidae. Το κοινό ελληνικό της όνομα είναι Λίτσα ή Λέτσα.

Το χρώμα της είναι γκρίζο, στην ράχη έχει πράσινες αποχρώσεις και κοιλιακά λευκό/ασημί χρώμα. Έχει επίμηκες σώμα, πλευρικά συμπιεσμένο που καταλήγει σε ισόλοβο ημισεληνοειδές ουραίο πτερύγιο. Η μεγάλη διχαλωτή ουρά της την κάνει ιδιαίτερα δυνατή και γρήγορη ενώ η έντονη καμπυλωτή πλευρική γραμμή της επιτρέπει να σκανάρει και να εντοπίζει τα θηράματά της από τις δονήσεις που προκαλούν με την κίνηση τους. Φέρει ένα ζεύγος θωρακικών και κοιλιακών πτερυγίων και ένα εδρικό και ραχιαίο πτερύγιο. Έχει σχετικά μικρά μάτια, μεγάλο στόμα και ένα μυτερό ρύγχος. Το μήκος της μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2 μέτρα, αλλά στις ελληνικές ακτές φτάνουν το 1 μέτρο. Το βάρος της μπορεί να φτάσει τα 20 κιλά. Και σε σπάνιες περιπτώσεις τα 50 κιλά.

Η καλύτερη εποχή ψαρέματος για τις λίτσες είναι η άνοιξη, αρχή καλοκαιριού και ο μήνας Αύγουστος. Αυτές τις περιόδους έρχεται πιο κοντά στις ακτές, ενώ τους χειμερινούς μήνες ανοίγεται σε πιο βαθιά νερά για να βρει πιο σταθερές θερμοκρασίες.


Η λίτσα ψαρεύεται με καλάμι από την ακτή, με δόλωμα ζωντανό κέφαλο, σαλαγγιά και ένα μικρό φελλό για σημαδούρα. Επίσης, μπορεί να ψαρευτεί πολύ καλά και με την συρτή, με φυσικό ή τεχνητό δόλωμα. Βέβαια οι μεγάλες λίτσες επειδή είναι καχύποπτα ψάρια δύσκολα θα ορμήσουν στο τεχνητό.

Συνήθως το δόλωμα πρέπει να είναι μερικά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όμως όταν η θάλασσα είναι εντελώς ήρεμη το δόλωμα μπορεί να είναι και ακριβώς στην επιφάνεια. Η ταχύτητά θα πρέπει να είναι 3-4 μίλια, αλλά για μεγαλύτερα ψάρια θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη, μέχρι και στα 6 μίλια.

Τέλος, όταν η λίτσα αγκιστρωθεί, η πρώτη αντίδρασή της είναι να βυθιστεί και να ψάξει στον βυθό για κάποιο βράχο και να τρυπώσει εκεί με την πετονιά. Έτσι με το που πιαστεί πρέπει να περάσει λίγη ώρα μέχρι να την φέρουμε στην βάρκα.

(edit) Περίοδος ψαρέματος = oles oi epoxes , eidika augousto-noembrio , Δόλωμα = zontana psarakia plastika psarakia koutalaki ktl , Αγκίστρι = 4-8 , Μπετονιά = 0.25-0.30 mm , αρπaktiko = ua to broume oles tis ores tis imeras spania tin nixta

Λαβράκι



Το λαβράκι είναι ένα μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 103 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 50 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 12 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Dicentrarchus labrax* και ανήκει στην οικογένεια των μορονιδών (*Moronidae*).

Σε μερικές περιοχές της Ελλάδας μπορεί να βρεθεί και το *Dicentrarchus punctatus* το οποίο φέρει πιο έντονες μαύρες κηλίδες στην ράχη σε αντίθεση με το *D. labrax*.

Το λαβράκι απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Νορβηγία έως το Μαρόκο, τα Κανάρια Νησιά και τη Σενεγάλη. Είναι πολύ γνωστό στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 10 -100 μέτρα.

Το χρώμα του είναι γκρίζο-ασημί, ενώ τα μικρά ιχθύδια φέρουν μαύρα στίγματα σε πλάτη και πλευρά. Το ασημί είναι λίγο πιο σκούρο στη ράχη και πιο ανοιχτό στη κοιλιά (φαινόμενο της αντισκίασης). Είναι ψάρια ευρύαλα και ευρύθερμα, αντέχουν δηλαδή σε μεγάλες μεταβολές αλατότητας και θερμοκρασίας του νερού. Είναι κυρίως ψάρι της ανοικτής θάλασσας, αλλά πλησιάζει σε υφάλμυρα και γλυκά νερά, όπως σε λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών. Τρέφεται με ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή. Η περίοδος αναπαραγωγής του είδους είναι οι μήνες Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος.

Το λαβράκι θεωρείται εκλεκτό ψάρι στην ελληνική κουζίνα, ενώ χρησιμοποιείται για διατροφή και από άλλους λαούς. Μπορεί να μαγειρευτεί με πολλούς τρόπους, πχ. στη σχάρα, στον ατμό, στο φούρνο κ.ά. Στα ελληνικά η λέξη λαβράκι χρησιμοποιείται από τους δημοσιογράφους για να περιγράψουν νέα αποκλειστικά ρεπορτάζ με μεγάλη αξία, μια αναφορά που δείχνει την αξία του συγκεκριμένου ψαριού.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 25 εκατοστά.

Κυνηγός



Κυνηγός (mahī-mahī) ή το κοινό δελφίνι (*Coryphaena hippurus*) είναι ένα ψάρι που απαντάται σε υπεράκτια, εύκρατα, τροπικά και υποτροπικά ύδατα παγκοσμίως. Επίσης ευρέως ονομάζεται dorado και δελφίνι, είναι ένα από τα δύο μέλη της οικογένειας Coryphaenidae, το άλλο είναι το rompano δελφίνι. Αυτά τα ψάρια βρίσκονται συνήθως στα ύδατα γύρω από τον Κόλπο του Μεξικού, την Κόστα Ρίκα και τη Χαβάη και τους φθινοπωρινούς μήνες και στη χώρα μας.

Οι κυνηγοί έχουν συμπίεσμένα σώματα και ένα ενιαίο μακρύ ραχιαίο πτερύγιο που εκτείνεται από το κεφάλι σχεδόν μέχρι την ουρά. Τα ώριμα αρσενικά έχουν μέτωπα που προεξέχουν πολύ πάνω από το σώμα. Τα θηλυκά έχουν στρογγυλεμένο κεφάλι. Τα πτερύγια της ράχης και τα πρωκτικά πτερύγια είναι απότομα. Διακρίνονται από τα εκθαμβωτικά χρώματα – χρυσό στα πλάγια και λαμπερό μπλε και πράσινο στα πλάγια και τα πίσω. Τα θωρακικά πτερύγια των mahi-mahi είναι ιριδίζοντα μπλε. Έξω από το νερό, τα ψάρια συχνά αλλάζουν χρώμα (δημιουργώντας το ισπανικό τους όνομα, dorado, “χρυσό”), περνώντας από πολλές αποχρώσεις πριν τελικά εξασθενήσει σε ένα σιγαλό κίτρινο-γκρι μετά το θάνατο.

Ο Linnaeus το 1758 ονόμασε το γένος *coryphe*, που προέρχεται από την ελληνική λέξη κορυφή. Τα συνώνυμα για τα είδη περιλαμβάνουν *Coryphaena argyurus*, *Coryphaena chrysurus* και *Coryphaena dolfyn*.

Μπορεί να ζήσει μέχρι και πέντε χρόνια, αν και σπανίως υπερβαίνει τα τέσσερα. Τα θηλυκά είναι συνήθως μικρότερα από τα αρσενικά. Τα αλιεύματα είναι συνήθως 7 έως 13 κιλά και μήκος ένα μέτρο. Σπανίως υπερβαίνουν τα 15 kg. Οι Κυνηγοί είναι μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων ψαριών. Αναπαράγονται σε ζεστά ωκεάνια ρεύματα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και τα νεαρά ψάρια βρίσκονται συνήθως σε σχηματισμούς ζιζανίων *Sargassum*. Οι Κυνηγοί είναι σαρκοβόροι, τρέφονται με ψάρια, καβούρια, καλαμάρια, και άλλα. Είναι επίσης γνωστό ότι τρώνε ζωοπλαγκτόν.

(edit)μεγαλύτερο αριθμό να ανιχνεύεται την άνοιξη και το φθινόπωρο.[4] Αναπαράγονται σε ζεστά ωκεάνια ρεύματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και τα μικρά τους βρίσκονται συνήθως σε σχεδίες από φύκια *Sargassum*.

(edit2)Περίοδος ψαρέματος = oles oi epoxes , Δόλωμα = zontana psarakia plastika psarakia koutalaki , Αγκίστρι = 2-4 , Μπετονιά = 0.25-0.35 mm , αρπaktiko = ua to broume oles tis ores tis imeras ekei pou den to perimenoume

Κουτσομούρα



Η κουτσομούρα είναι ένα μικρό ψάρι με μέγιστο μήκος τα 33,2 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 20 εκατοστά. Έχει αναφερθεί μέγιστο βάρος τα 680 γρ. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Mullus barbatus* και ανήκει στην οικογένεια των μουλλιδών (Mullidae). Συγγενεύει με το μπαρμπούνι.

Η κουτσομούρα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τα Βρετανικά Νησιά έως το Ντακάρ, στη Σενεγάλη, τα Κανάρια Νησιά καθώς και στη Μεσόγειο και Μαύρη θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 10 – 328 μέτρα, συνήθως 100 – 300 μέτρα.

Το χρώμα της είναι κοκκινωπό ή και ανοικτό κόκκινο με μια γραμμή καφεκόκκινης απόχρωσης κατά μήκος του σώματος. Πολλοί το μπερδεύουν με το μπαρμπούνι, όμως, το κύριο μορφολογικό χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τα δύο είδη είναι το πολύ πιο κυρτό ρύγχος της κουτσομούρας, σε σχέση με αυτό του μπαρμπουνιού. Η κουτσομούρα είναι βενθικό είδος και τρέφεται με βενθικά ασπόνδυλα, όπως οστρακόδερμα, σκουλήκια και μαλάκια. Η αναπαραγωγική περίοδος για το είδος είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 11 εκατοστά.

Κολιός




Ο κολιός είναι ένα μικρό πελαγικό ψάρι με μέγιστο μήκος τα 64 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 30 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 2,9 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Scomber colias* και ανήκει στην οικογένεια των Σκομβριδών (*Scombridae*). Συγγενεύει με το σκουμπρί.

Ο κολιός απαντάται στον Ανατολικό ατλαντικό ωκεανό και τη Μεσόγειο θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 0 – 300 μέτρα, συνήθως 50 – 200 μέτρα.

Στο χρώμα και την εμφάνιση μοιάζει με το σκουμπρί, δηλαδή είναι γαλαζοπράσινο στη ράχη με μαύρες ρίγες και άσπρη κοιλιά, με τη διαφορά ότι φέρει σκούρες γραμμές ή στίγματα στην περιοχή της κοιλιάς. Είναι μεταναστευτικό είδος, το οποίο σχηματίζει πολυπληθή κοπάδια από ισομεγέθη ψάρια. Τρέφεται με μικρότερα είδη πελαγικών(μικρον?) ψαριών, καθώς και πελαγικά ασπόνδυλα. Αναπαράγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως τον Αύγουστο.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 18 εκατοστά.

Κέφαλος



Ο κέφαλος είναι ένα ευμέγεθες ψάρι με μέγιστο μήκος τα 100 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 50 εκατοστά. Έχει πολλές κοινές ονομασίες ανάλογα την περιοχή της Ελλάδας, με τις πιο γνωστές να είναι η «στειράδια» για τα αρσενικά άτομα του είδους και για τα θηλυκά «μπάφες» από τις οποίες προέρχεται και το αυγοτάραχο

Το επιστημονικό του όνομα είναι *Mugil cephalus* και ανήκει στην οικογένεια των μουγιλιδών (Mugilidae).

Ο κέφαλος είναι ένα κοσμοπολίτικο ψάρι που απαντάται σε όλα τα παράκτια ύδατα των τροπικών, υποτροπικών και εύκρατων ζωνών όλων των θαλασσών. Συναντάται σε βάθη 0 – 120, συνήθως 0 – 10 μέτρα.

Το χρώμα του είναι λαδοπράσινο στη ράχη, στις πλευρές ασημί που σταδιακά γίνεται λευκό στην κοιλιά. Υπάρχουν ορισμένες παράλληλες γραμμές που κάποιες φορές είναι ευδιάκριτες. Ο κέφαλος είναι πιο ενεργός κατά τη διάρκεια της μέρας, αν και αυτό δεν είναι κανόνας. Τρέφεται, κυρίως, με άλγη και μικροοργανισμούς από το υπόστρωμα, αλλά και με οργανικά σωματίδια στη στήλη του νερού. Η αναπαραγωγή του κέφαλου λαμβάνει χώρα κατά τους μήνες Ιούλιο μέχρι Οκτώβριο.

Στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν άφθονοι και κυρίως στις λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού και του Μεσολογίου. Η αλιεία αυτών των ψαριών γίνεται με δίκτυα και καλαμωτές καθώς και από στεριά με καθετή, με κιούρτους και με πεζόβολο. Το κρέας τους, ειδικά τον χειμώνα, είναι παχύ και αρκετά νόστιμο.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 16 εκατοστά.

(edit) Περίοδος ψαρέματος = ολεs οι εροxes , Δόλωμα = zimari psomi tiri ktl , Αγκίστρι = 14-18 , Μπετονιά = 0.16-0.20 mm , τον briskoume pantou kai eidika se limania kai amodis paralies

Καπόνι



Το καπόνι είναι ένα επίμηκες ψάρι με πλατύ και μεγάλο κεφάλι. Το μέγιστο μήκος που μπορεί να φτάσει είναι τα 40 εκατοστά και το πιο σύνηθες τα 15 εκατοστά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Chelidonichthys lastoviza* και ανήκει στην οικογένεια των τριγλιδών (Triglidae).

Το καπόνι απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τη Μαδέρα και τα νότια της Αφρικής και φυσικά στη Μεσόγειο θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 10 – 150 μέτρα, συνήθως έως 40 μέτρα.

Το χρώμα του είναι κοκκινοπορτοκαλί. Λεπτομερέστερα, στη ράχη του είναι κόκκινο και στην κοιλιά προς το πορτοκαλί. Τα πλευρικά πτερύγιά του έχουν χρώμα βαθύ μπλε ενώ τα υπόλοιπα πτερύγιά του είναι σχεδόν ροδοκόκκινα. Είναι βενθικό ψάρι και τρέφεται αποκλειστικά με μικρά ασπόνδυλα. Η αναπαραγωγή του είδους λαμβάνει χώρα μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου.

Καλκάνι



Το καλκάνι είναι ένα ευμέγεθες ψάρι, κοιλιακά πεπλατυσμένο, με μέγιστο μήκος τα 100 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 50 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 25 κιλά. .

Το επιστημονικό του όνομα είναι *Scophthalmus maximus* και ανήκει στην οικογένεια των σκοφθαλμιδών (*Scophthalmidae*).

Το καλκάνι απαντάται στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, και στη Μεσόγειο θάλασσα και στη Μαύρη θάλασσα μπορεί να βρεθεί το υποείδος *Psetta maxima maeotica*. Υπάρχει σε αφθονία στο μεγαλύτερο μέρος της Βαλτικής θάλασσας. Συναντάται σε βάθη 20 – 70 μέτρα.

Το χρώμα του ποικίλλει, αλλά γενικά είναι είτε γκριζωπό είτε καφέ της άμμου, που το βοηθάει να καμουφλάρεται με εξαιρετικό τρόπο μέσα στη λάσπη. Η κοιλιά του είναι άσπρη. Το καλκάνι έχει πεπλατυσμένο, σχεδόν κυκλικό ή ρομβοειδές σώμα με στρογγυλεμένο ουραίο πτερύγιο και πλήθος από οστέινες προεξοχές σε όλο του το σώμα, ιδίως από την πλευρά που έχει τα μάτια. Είναι βενθικό είδος. Τρέφεται κατεξοχήν με ψάρια αλλά και με καρκινοειδή και δίθυρα μαλάκια.

Το καλκάνι αλιεύεται κυρίως στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, εξαιτίας της ευξείνειας προέλευσής του. Αλιεύεται κυρίως με τράτα βυθού, λιγότερο με παράκτια αλιευτικά εργαλεία και πολύ σπάνια πιάνεται με βιντζότρατα ή γρι-γρι.

(edit)αναπαράγεται από τον Μάιο έως τον Ιούνιο.

Ζαργάνα



Η ζαργάνα ή βελονίδα είναι ένα πελαγικό ψάρι της οικογένειας των βελονίδων που ζει σε θαλάσσια και υφάλμυρα ύδατα του Ατλαντικού Ωκεανού, της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Το ψάρι κολυμπάει κοντά στην επιφάνεια του νερού. Είναι μακρύ και λεπτό ψάρι με μήκος γύρω στο ένα μέτρο. Μεταναστεύει από την Βόρεια Θάλασσα σε πιο ρηχά νερά τον Απρίλιο και τον Μάιο. Αναπαράγονται τον Μάιο και τον Ιούνιο σε περιοχές με φύκια. Το Φθινόπωρο επιστρέφουν στην ανοιχτή θάλασσα από όπου ξεκίνησαν.

Οι ζαργάνες τρέφονται με μικρότερα ψάρια. Είναι ωτόκα και γεννάνε τα αυγά τους σε αντικείμενα που επιπλέουν στο νερό. Οι ζαργάνες έχουν ασυνήθιστα πράσινα κόκαλα τα οποία αποθαρρύνουν πολλούς ανθρώπους από το να τις τρώνε, αλλά το πράσινο χρώμα είναι ακίνδυνο. Αλιεύονται κυρίως με δίχτυα κατά μήκος της ακτής σε ρηχά νερά. Τρώγονται τηγανιτές, ψητές ή καπνιστές.

Τα πτελικά πτερύγια του βρίσκονται σε οπίσθια θέση όπως και τα ουραία και τα ραχιαία. Είναι τοποθετημένα έτσι για οπίσθια κάμψη του σώματος.

(edit) Περίοδος ψαρέματος = augoustos-noembrios , Δόλωμα = nekra i zontana psaria kalamari garida zimari ktl , Αγκίστρι = 10-14 , Μπετονιά = 0.25-0.30 mm , tin briskoume mexri 0.5m bauos

Δράκαινα



Η δράκαινα είναι ένα μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 53 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 25 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 1,9 κιλά. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Trachinus draco* και ανήκει στην οικογένεια των τραχινιδών (*Trachinidae*).

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα είδη δράκαινας στην Ελλάδα, όπως, το Τίσως πιο κοινό από αυτά, να είναι το *T. radiatus*, το *T. araneus* και πιο σπάνια το *Echiichthys vipera*.


Η δράκαινα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Νορβηγία έως το Μαρόκο, τη Μαδέρα και τα Κανάρια Νησιά, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας. Συναντάται σε βάθη 1 – 150 μέτρα, συνήθως 1 – 30 μέτρα.

Το χρώμα της είναι συνήθως κίτρινο σκούρο, με γκρίζο από την ράχη και κάτω και λίγο λευκό στην κοιλιά. Επίσης, διακρίνονται ορισμένοι σκουρόχρωμοι σχηματισμοί στο σώμα της. Ο χρωματισμός της μπορεί να τη βοηθήσει να κρυφτεί στην άμμο και να γίνει ένα με αυτή. Τα πρώτα αγκάθια του ραχιαίου πτερυγίου εκκρίνουν δηλητήριο και λειτουργούν σαν άμυνα έναντι των θηρευτών της. Για τον άνθρωπο το δηλητήριο δεν είναι θανατηφόρο, αλλά προκαλεί οίδημα ερεθισμό και πόνο. Επιπλέον έχει και δύο αγκάθια πάνω από τα βράγχια που δεν είναι τόσο εμφανή όσο το ραχιαίο και μπορούν αν προκαλέσουν τραυματισμό και αυτά.

Οι δράκαινες, ζουν κατά βάση σε βαθιά, αλλά και σε ρηχά νερά, και συνήθως είναι κρυμμένες κάτω από την άμμο. Το κεφάλι της είναι μικρό και το στόμα της έχει μικρά δόντια και παίρνει κλίση προς τα πάνω. Τρέφεται με μικρά ασπόνδυλα και ψάρια. Η αναπαραγωγή του είδους λαμβάνει χώρα κατά τους ανοιξιάτικους μήνες.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = oles tis epoxes , Δόλωμα = garida skouliki ktl , Αγκίστρι = 4-10 , Μπετονιά = 0.20-0.25 mm , ua tin broume konta se braxia kai fita se amodis paralies , prosoxi dilitiriodes pterigio prokalei aforitous ponous

Γουρουνόψαρο




Το γουρουνόψαρο ή βαλιστής είναι ένα μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 60 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 44 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 6,2 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Balistes capriscus* και ανήκει στην οικογένεια των βαλιστιδών (*Balistidae*).

Πολλοί συγχέουν το γουρουνόψαρο (*B. capriscus*) με το μονόχειρο (*Stephanolepis diaspros*). Πρόκειται για 2 διαφορετικά ψάρια που ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες. Πρέπει να τονιστεί ότι το γουρουνόψαρο (ή καλύτερα βαλιστής) δεν θεωρείται ξενικό είδος στη Μεσόγειο αλλά ένα ψάρι που επεκτάθηκε γεωγραφικά από τον Ατλαντικό ωκεανό στη Μεσόγειο θάλασσα μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ. Αντίθετα, ο μονόχειρος είναι ένα ξενικό είδος (Λεσεψιανός μετανάστης) για τη Μεσόγειο το οποίο επεκτάθηκε διαμέσου της Διώρυγας του Σουέζ στις θάλασσές μας.

Το γουρουνόψαρο απαντάται στον Ανατολικό και Δυτικό Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 0 – 100 μέτρα, συνήθως 0 – 55 μέτρα.

Το χρώμα του είναι γκρίζο σε όλη του την έκταση. Χαρακτηριστικό του είναι οι 3 πολύ σκληρές ακτίνες στο πρώτο ραχιαίο πτερύγιο. Το γουρουνόψαρο είναι βενθικό είδος και σαρκοφάγο. Τρέφεται με βενθικά ασπόνδυλα, όπως μαλάκια και καρκινοειδή. Η αναπαραγωγή του είδους λαμβάνει χώρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατά την αναπαραγωγή, το θηλυκό αποθέτει τα αυγά του μέσα σε μια μικρή κοιλότητα στο λασπώδες υπόστρωμα, όπου ακολούθως το αρσενικό τα φυλάει μέχρι την εκκόλαψή τους.

Γοφάρι



Το γοφάρι είναι ένα μεγάλου μεγέθους σχετικά ψάρι με μέγιστο μήκος τα 130 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 60 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και 14,4 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Pomatomus saltatrix* και ανήκει στην οικογένεια των Πωματομιδών (*Pomatomidae*).

Το γοφάρι απαντάται σε όλα τα τροπικά και υποτροπικά ύδατα, εκτός από τον Ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό. Συναντάται σε βάθη 0 – 200 μέτρα.

Το χρώμα του είναι μολυβί και γαλαζοπράσινο στη ράχη, ασημόλευκο στην κοιλιά. Το ραχιαίο πτερύγιο φέρει 8-9 σκληρές ακανθες. Το στόμα του φθάνει μέχρι πίσω από τα μάτια του. Το κεφάλι του φθάνει το 1/3 του σώματός του. Είναι βενθοπελαγικό ψάρι και τρέφεται με μικρά ψάρια, κεφαλοειδή και καρκινοειδή.

Έχει πολύ ισχυρά δόντια που κόβουν ακόμα και σύρμα. Κυριολεκτικά αποδεκατίζει τα κοπάδια μικρών ψαριών. Το κρέας του θεωρείται από ένα συγκεκριμένο ποσοστό ατόμων ότι είναι “νόστιμο” για κατανάλωση.

Το γοφάρι ψαρεύεται με πετονιές με δόλωμα ζωντανή ζαργάνα από την ακτή, με συρτή και με ειδικά καλάμια.

(edit) Περίοδος ψαρέματος = oles tis epoxes , Δόλωμα = zontana psaria plastika psarakia koutalakia , Αγκίστρι = 4-8 , Μπετονιά = 0.25-0.35 mm , αρπaktiko = koftera dontia mporei eukola na kopsei ta daxtila sas

Γόπα



Η γόπα είναι ένα μικρού μεγέθους σχετικά ψάρι με μέγιστο μήκος τα 40 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 20 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 455 γρ. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Boops boops* και ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών (Sparidae).

Η γόπα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Νορβηγία έως την Αγκόλα, συμπεριλαμβανομένων των Κανάριων Νήσων και των Νήσων Σάο Τομέ-Πρίνσιπε, όπως και τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 0 – 350, συνήθως 0 – 100 μέτρα.

Το χρώμα της είναι γκριζογάλαζο στη ράχη, λίγο πιο ανοικτό ασημί στα πλευρά και στην κοιλιά γυαλιστερό. Πίσω από τα μάτια αρχίζουν 4 κίτρινες γραμμές που καταλήγουν στην ουρά. Φέρει επίσης πλευρική γραμμή σκούρα καφέ. Το κεφάλι της γόπας έχει μήκος περίπου το 1/4 του συνολικού μήκους του ψαριού. Έχει μάτια σχετικά μεγάλα στο μισό ύψος του κεφαλιού. Το ρύγχος της στρογγυλεύει και στο στόμα της, που φέρει κλίση προς τα πάνω, έχει στην πάνω σιαγόνα κοπτήρες ενώ στην κάτω κυνόδοντες. Τρέφεται με φύκη, ζωοπλαγκτόν και ζωοβένθος. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους ξεκινά από το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο.

Οι γόπες ψαρεύονται με δίχτυα της τράτας και με γρι-γρί καθώς και με τσαπαρί και καθετή.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 10 εκατοστά.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = oles tis epoxes , kirios to kalokairi , Δόλωμα = kalamari garida zimari ktl , Αγκίστρι = 2-6 , Μπετονιά = 0.15-0.25 mm

Γλώσσα



Η γλώσσα είναι ένα κοιλιακά πεπλατυσμένο ψάρι με μέγιστο μήκος τα 70 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 35 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως και τα 3 κιλά. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Solea solea* και ανήκει στην οικογένεια των γλωσσιδών (Soleidae).

Η γλώσσα απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Βόρεια θάλασσα έως τη Σενεγάλη, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου, της Μαύρης θάλασσας και της Θάλασσας του Μαρμαρά. Συναντάται σε βάθη 0 – 150 μέτρα, συνήθως 10 – 60 μέτρα.

Το χρώμα της είναι καφετί στο πάνω μέρος με ορισμένες σκουρόχρωμες κηλίδες, ενώ η κοιλιά είναι άσπρη. Το ψάρι αυτό γεννιέται με κατακόρυφο προσανατολισμό, όπως τα συνηθισμένα ψάρια. Σιγά – σιγά αρχίζει να αλλάζει προσανατολισμό και να ακουμπάει στον βυθό. Η πλευρά που ακουμπάει κάτω γίνεται πλακέ και άσπρη. Το μάτι που είναι από κάτω, σιγά – σιγά μετακινείται και έρχεται δίπλα σε αυτό που είχε μείνει από πάνω. Είναι βενθικό είδος. Τρέφεται με σκουλήκια, μαλάκια και μικρά καρκινοειδή. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους λαμβάνει χώρα από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο.

Είναι ιδιαίτερα νόστιμο ψάρι και αρκετά εύκολο να φαγωθεί γιατί δε μένουν άλλα κόκαλα αν απομακρύνει κανείς το κεντρικό κόκκαλο. (Υπάρχει και σχετική σατιρική παροιμία: Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει, εκτός αν είναι ψάρι).

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 20 εκατοστά.

(edit)Περίοδος ψαρέματος = augoustos-noembrios , Δόλωμα = garida zimari skouliki ktl , Αγκίστρι = 8-14 , Μπετονιά = 0.20-0.25 mm

Γαύρος



Ο γαύρος (ή χαψί όπως το ονόμαζαν οι αρχαίοι) είναι ένα μικρό πελαγικό ψάρι με μέγιστο μήκος τα 20 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 13,5 εκατοστά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Engraulis encrasicolus* και ανήκει στην οικογένεια των εγγραυλιδών (*Engraulidae*).

Ο γαύρος απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από τη Νορβηγία έως το Ανατολικό Λονδίνο. Σε όλη την Ανατολική Αφρική και σε όλες τις θάλασσες της Μεσογείου, της Μαύρης και της Αζοφικής. Συναντάται σε βάθη 0 – 400 μέτρα.

Το χρώμα του είναι πρασινογάλαζο στη ράχη και τα πλευρά, ενώ η κοιλιά του είναι λευκή προς το ασημί και γυαλιστερή. Το σώμα του είναι στενόμακρο, το ρύγχος του μακρύ και το πάνω σαγόνι του εξέχει μακρύτερο. Το στόμα του φθάνει μέχρι πίσω από τα μάτια, φέροντας μικρά και μυτερά δόντια. Ζει σε ζεστές περιοχές, κατά κοπάδια και περισσότερο στον αφρό ειδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Το χειμώνα αντίθετα παραμένει στο βυθό σε βάθος 100-200 μέτρα, εξ ου και η αλιεία τους την περίοδο αυτή είναι περιορισμένη. Τρέφεται με πλαγκτονικούς οργανισμούς. Όταν αυξηθεί η θερμοκρασία του νερού, πλησιάζει τις ακτές για να αφήσει τα αυγά του, που είναι πελαγικά.

Στις ελληνικές θάλασσες είναι άφθονος και αλιεύεται από τα τέλη Αυγούστου και μετά, όταν δουλεύουν οι τράτες και τα γρι-γρί, οπότε η τιμή τους κατά κιλό είναι πολύ χαμηλή λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που αλιεύονται. Το κρέας τους είναι πολύ νόστιμο, ειδικά αν πριν το μαγείρεμα αφαιρεθεί το κεφάλι, επειδή πικρίζει αρκετά. Χρησιμοποιείται επίσης και για δόλωμα μεγαλύτερων ψαριών.

Στο εμπόριο φέρονται είτε ως νωποί, είτε ως παστωμένοι καλούμενοι αντζούγιες, ή και επεξεργασμένοι ακέφαλοι σε φέτες, σε κατάψυξη, ή σε κονσέρβες.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 9 εκατοστά.

Γάστρος




Ο γάστρος είναι ένα μέτριου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 40 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 30 εκατοστά. Το επιστημονικό του όνομα άλλαξε πρόσφατα σε *Chelon saliens* και ανήκει στην οικογένεια των μουγιλιδών (*Mugilidae*).

Ο γάστρος απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, από το Μαρόκο μέχρι τις ακτές της Νότιας Γαλλίας, στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα καθώς και στη θάλασσα του Αζόφ. Εισήχθη στο Ιράν και απαντάται σήμερα και στην Κασπία θάλασσα. Συναντάται σε όχι και πολύ βαθιά νερά.

Το χρώμα του είναι σκούρο γκρι-μπλε στη ράχη, ενώ τα πτερύγια και η κοιλιά είναι ανοιχτόχρωμα ή ασημί. Είναι βενθοπελαγικό είδος. Τα νεαρά άτομα τρέφονται με ζωοπλαγκτόν και άλλους βενθικούς οργανισμούς, ενώ τα ενήλικα άτομα τρέφονται με οργανικά ιζήματα, φύκια και φυτική ύλη. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους λαμβάνει χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 16 εκατοστά.

Γαλέος




Ο Γαλέος (επιστημονική ονομασία *Galeorhinus galeus*, «Γαλεόρρινος ο γαλέος») είναι καρχαρίας που ανήκει στην οικογένεια Τριακίδες (*triakidae*). Παρόλα αυτά, την ονομασία γαλέος φέρουν και άλλα είδη καρχαριών. Η ονομασία γαλέος χρησιμοποιείται γενικά στην Ελλάδα για να περιγράψει το κρέας που προέρχεται γενικά από αλιευμένους καρχαρίες και όχι μόνο από το συγκεκριμένο είδος.

Το μήκος του φθάνει τα 1-2 μέτρα. Η ράχη του έχει χρώμα ανοικτό γκριζωπό ενώ τα πλευρά του λίγο ροδίζουν και η κοιλιά του είναι άσπρη. Το ρύγχος του είναι πεπλατυσμένο και μυτερό και το στόμα του βρίσκεται στη κάτω πλευρά, όπως σε όλα τα σκυλόψαρα με δόντια μυτερά, τριγωνικά και σε σειρές. Το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο είναι 2 ή και 3 φορές μεγαλύτερο απ' το δεύτερο πτερύγιο της ουράς του .

Ζει στο βυθό κοντά στις στεριές και τροφή του είναι μικρά ψάρια και μαλάκια. Γεννά μικρά ζωντανά, είναι δηλαδή ζωοτόκος. Το κρέας του είναι ασπροκόκκινο και σφιχτό.

Στο Αιγαίο υπάρχουν πολλοί που ψαρεύονται με χοντρά παραγάδια και δίκτυα. Το κρέας του γδαρμένο είναι άσπρο και αρκετά νόστιμο. Η αλιεία του γαλέου στις ελληνικές θάλασσες, από στατιστική άποψη, παρακολουθείται. Συγκεκριμένα το 2001 αλιεύθηκαν 372 τόνοι, το 2002 411,8 τόνοι και το 2003 303 τόνοι.

Βλάχος



Ο βλάχος είναι ένα ευμέγεθες ψάρι με μέγιστο μήκος τα 210 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 80 εκατοστά. Μπορεί να φτάσει έως 100 κιλά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Polyprion americanus* και ανήκει στην οικογένεια των πολυπριωνιδών (*Polyprionidae*).

Ο βλάχος απαντάται στον Ανατολικό και Δυτικό Ατλαντικό, στο Νοτιοδυτικό Ειρηνικό ωκεανό και φυσικά στη Μεσόγειο Θάλασσα. Συναντάται σε βάθη 40 – 600 μέτρα, συνήθως 100 – 200 μέτρα.

Το χρώμα του είναι καφέ ομοιόμορφο ή γκριζωπό με σκόρπιες βούλες κιτρινωπές που στα μικρότερης ηλικίας άτομα είναι πυκνότερες. Γενικά το σώμα του χαρακτηρίζεται χονδρό, με το κεφάλι να αποτελεί το 1/3 του μήκους του. Τα μάτια του είναι κοντά στη κορυφή του κεφαλιού και το στόμα του με το κάτω σαγόνι να προεξέχει. Τα χείλη του είναι παχιά και φέρει δόντια κοφτερά σε διπλή σειρά. Ο βλάχος είναι βενθικό ψάρι. Τα μικρότερα άτομα κινούνται κοπαδιαστά και φθάνουν μέχρι και την επιφάνεια. Ζει σε αμμώδεις και μεικτούς βυθούς. Τρέφεται με μεγάλα καρκινοειδή, κεφαλόποδα και βενθικά ψάρια. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους λαμβάνει χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι βλάχοι αλιεύονται κυρίως με τράτα, με χοντρό παραγάδι, ειδικά το καλοκαίρι, καθώς και με καθετές.

Η νομοθεσία ορίζει σαν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλίευσης του είδους τα 45 εκατοστά.

Βακαλάος



Ο βακαλάος (μπακαλιάρος) είναι ψάρι του γένους Γάδος (*Gadus*) της οικογένειας των γαδιδών, με τα χαρακτηριστικά “ακτινοπτερύγια”. Μαγειρεμένος θεωρείται εκλεκτό φαγητό, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία είναι το πιο συνηθισμένο ψάρι στο δημοφιλές έδεσμα “fish and chips”. Έχει ευχάριστο άρωμα, χαμηλά λιπαρά, πολλές πρωτεΐνες και πυκνή λευκή σάρκα, που απολεπίζεται εύκολα. Από το συκώτι των βακαλάων παρέχεται το μουρουνέλαιο, το έλαιο του βακαλάου, που αποτελεί σημαντική πηγή για τις βιταμίνες Α, D, Κ και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (EPA and DHA).


Ζει ως 15 χρόνια, το μήκος του σώματός του φτάνει ως το 1μ. 40 εκ. και το βάρος του μέχρι 15 κιλά. Συνήθως είναι λευκός ή γκρι, αλλά το χρώμα του ποικίλλει από καφέ ως πράσινο ή ακόμα και κόκκινο. Συχνά έχει καφετιά ή κοκκινωπά στίγματα, είτε στο σώμα είτε στο κεφάλι.

Συναντάται κυρίως στις βόρειες χώρες και στα ψυχρά κλίματα, ιδιαίτερα στον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Βόρεια Θάλασσα, αλλά βρίσκεται και στον Ειρηνικό, Δυτική και Νότια Αφρική και στην Αργεντινή. Πάντως, η ονομασία προέρχεται από το πορτογαλικό *bacalhau*, μιας και οι πρώτοι που το παρατήρησαν ήταν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι του 16ου αιώνα.

Αλιεύεται κυρίως στον Ατλαντικό, αλλά και στη Μεσόγειο, με δίχτυα και παραγάδι. Ο βακαλάος της Μεσογείου ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των γαδιόμορφων (*Merluccius merluccius vulgaris*- Μερλούκιος ο μερλούκιος ο κοινός). Τρέφεται με καλαμάρια, αντζούγιες, σαρδέλες, ρέγγες, γαρίδες και άλλα μικρά θαλάσσια. Συναντάται συνήθως στα 70-370 μέτρα, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να ζήσει σε βάθος από 303 έως και 1.000 μέτρα. Ζει στο βυθό κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη νύχτα ανεβαίνει σε επιφανειακά θαλάσσια ρεύματα.

(edit)του μπακαλιάρου κορυφώνεται τον <Απρίλιο> στο Αιγαίο

Αστρογαλέος




Ο αστρογαλέος είναι ένας από τους 36 καρχαρίες που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στις Ελληνικές θάλασσες. Είναι ένας μεσαίου μεγέθους καρχαρίας με μέγιστο μήκος τα 140 εκατοστά.

Το επιστημονικό του όνομα είναι *Mustelus asterias* και ανήκει στην οικογένεια των τριακιδών (Triakidae).

Ο αστρογαλέος απαντάται στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό έως τη Μαυριτανία, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου. Συναντάται σε βάθη 0 – 350 μέτρα. Η κατάσταση κατάστασης διατήρησης του Μεσογειακού πληθυσμού του είδους έγκειται στο Τρωτό σύμφωνα με την λίστα του IUCN, ενώ σύμφωνα με το Ελληνικό κόκκινο βιβλίο δεν έχει αξιολογηθεί η κατάσταση διατήρησης του για την Ελλάδα.

Το χρώμα του είναι γκριζωπό ή καφέ στη ράχη και καλύπτεται με λευκά στίγματα στα οποία οφείλει και το όνομά του. Η κοιλιά του είναι λευκή. Είναι βενθικό είδος. Τρέφεται με καρκινοειδή όπως καβούρια και αστακούς.

Ασπροσαύριδο



Το ασπροσαύριδο είναι ένα μεσαίου μεγέθους ψάρι με μέγιστο μήκος τα 60 εκατοστά και πιο σύνηθες τα 30 εκατοστά. Το επιστημονικό του όνομα είναι *Trachurus mediterraneus* και ανήκει στην οικογένεια των καραγκιδών (*Caragindae*)

Το ασπροσαύριδο απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό, από τον Βискаϊκό κόλπο μέχρι την Μαυριτανία, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου και σε βάθη 0 – 500 μέτρα, συνήθως 5 -250 μέτρα.

Το χρώμα του είναι γκριζοπράσινο στη ράχη και ασημί προς την κοιλιά ενώ η ουρά του είναι χρυσοκίτρινη. Στο τέλος των βραγχίων διακρίνεται μια έντονη μαύρη κηλίδα. Κατά μήκος του σώματος είναι ευδιάκριτη η πλευρική του γραμμή. Είναι πελαγικό ψάρι και σχηματίζει μεγάλα μεταναστευτικά κοπάδια. Τρέφεται με μικρότερα ψάρια, κυρίως σαρδέλες και γαύρους. Η αναπαραγωγική του περίοδος είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Στην Μαύρη Θάλασσα και την Θάλασσα του Μαρμαρά ζει το υποείδος *Trachurus mediterraneus ponticus*.

Αθερίνα



Η Αθερίνα είναι ένα μικρό ψάρι με μήκος 9 – 20 εκατοστά. Το επιστημονικό της όνομα είναι *Atherina boyeri* και ανήκει στην οικογένεια των αθερινιδών (*Atherinidae*).

Το χρώμα της είναι γκριζοπράσινο, λίγο ασημί με μια μαύρη ταινία στα πλευρά που εκτείνεται από το κεφάλι μέχρι την ουρά. Το σώμα της στρογγυλεύει από το κεφάλι και μετά. Έχει μάτια σχετικά μεγάλα και ρύγχος στρογγυλό. Τα λέπια της είναι μικρά και στρογγυλά με μαύρα στίγματα. Τα θωρακικά πτερύγια είναι κοντά και πίσω από τα βράγχια, ενώ τα δύο ραχιαία πτερύγια βρίσκονται σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Είναι ψάρι του αφρού (αφρόψαρα), ζει και μετακινείται κοπαδιαστά ενώ η διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως πλαγκτονικούς οργανισμούς. Κατά τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο πλησιάζει τις ακτές όπου και αποθέτει τ' αυγά του που μένουν κολλημένα σε πέτρες και σε φύκια.

Αθερίνες υπάρχουν άφθονες στα ελληνικά νερά, το κρέας τους είναι πολύ νόστιμο. Είναι συγγενικό είδος με την λεγόμενη *Atherina hesperus* που φτάνει σε μήκος μέχρι και τα 15 εκατοστά ενώ το ρύγχος της είναι λίγο πιο μυτερό.

Οι μεγάλες αθερίνες ψαρεύονται με δίκτυα Τράτας και οι μικρές κυρίως με τον Αθερινολόγο ή Μπέντουλα για να χρησιμοποιηθούν και ως δολώματα.

Η αλιεία τους επιτρέπεται μόνο από επαγγελματίες αλιείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

(edit) Περίοδος ψαρέματος = oles tis epoxes , kirios septembrio-noembrio , pianete mono me dixtia

ΔΟΛΩΜΑΤΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ



Ο Σωλήνας ζει σε αμμώδεις βυθούς. Στην αγορά το βρίσκουμε ζωντανό ή και κατεψυγμένο. Επιτρεπόμενο μέγεθος τα 8 εκατοστά.

Όπως όλα τα οστρακοειδή, μέσα σε θαλασσινό νερό, σε θερμοκρασία από 12 μέχρι 15 βαθμούς μερικές μέρες, με χρήση οξυγονωτή και καθημερινή αλλαγή του νερού.

ΤΡΙΧΙΑ



Το Δόλωμα Τριχία είναι λεπτό σκουλήκι της θάλασσας, με κόκκινο χρώμα, πολύ αίμα και πολύ μυρωδιά. Από τα καλύτερα ντόπια δολώματα.

Το καλύτερο δόλωμα για μουρμούρες τους καλοκαιρινούς μήνες. Το προτιμούν τα περισσότερα ψάρια. Πρόβλημα μεγάλο η ευαισθησία του, μόλις μπει στο νερό, αρχίζει το τσιμπολόγημα από μικρά ψάρια.

Μόνον μέσα σε αρκετό θαλασσινό νερό, με δύο τρία δάχτυλα άμμου στον πυθμένα.

ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ



Οστρακόδερμο που ζει στα βραχάκια των ακτών. Θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε ζωντανό στο αγκίστρι μας με σκοπό να προσελκύσουμε κάποια μεγάλη τσιπούρα με τις φυσικές του κινήσεις.

Θα το καρφώσουμε μπροστά ανάμεσα από τα μάτια, θα το περάσουμε σχεδόν ολόκληρο και θα ξανά καρφώσουμε από κάτω προς τα επάνω, αυτή τη φορά στο πίσω μέρος ώστε το αρπάδι να φανεί στη πάνω πλευρά και το μεγάλο αγκίστρι μας να αγκαλιάζει όλο το σώμα του καβουριού.

Πλεονεκτήματα	Εύκολη ανεύρεση
Μειονεκτήματα	Έχει περιορισμένους «στόχους», Δολώνεται σχετικά δύσκολα, Είναι πολύ «της υπομονής»
Ψάρια	Πολύ μεγάλες τσιπούρες (κυρίως), Μεγάλα λαβράκια

BIGATTINI

Πρόκειται ίσως για το μικρότερο δόλωμα, το μήκος του οποίου είναι γύρω στο ένα εκατοστό και εισάγεται από την Ιταλία. Τα bigattini είναι προνύμφες μύγας, οι οποίες παράγονται από τις ιταλικές βιοτεχνίες.

Το bigattini είναι ένα σκουλήκι πολύ πλούσιο σε πρωτεΐνες και παραμένει ζωντανό στο αγκίστρι μας για αρκετή ώρα.

Αν θέλουμε να το διατηρήσουμε για μεγάλο διάστημα ζωντανό, θα πρέπει να το βάλουμε μέσα σε ψυγείο, ή σε μικρό φορητό, είτε από φελιζόλ, είτε από πλαστικό, με δυο μπουκαλάκια παγωμένο νερό που φροντίζουν για την σωστή θερμοκρασία ώστε να διατηρηθεί ζωντανό.



Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως μαλάγρα, όταν βέβαια ψαρέψουμε στην συνέχεια με αυτό.

Το bigattini δολώνεται σε μικρό αγκίστρι με λεπτό στέλεχος νούμερο 10-16. Στη δόλωση η διαφορά με τα άλλα σκουλήκια είναι ότι δεν χρειάζεται να το περνάμε το αγκίστρι κατά μήκος, αλλά από το πίσω κολοβό μέρος του και όχι μόνο του. Περνάμε ένα δύο τρία η και περισσότερα σκουλήκια, ώστε το αγκίστρι να γίνεται αρκετά ελκυστικό.

Μπορούμε επίσης να κάνουμε συνδυασμό του bigattino και με άλλα δολώματα.

Μπορούμε ακόμη να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη μυρωδιά του δολώματος με διάφορα σπρέι κι έτσι να ψαρεύει ακόμα καλύτερα.

Το βάθος που συνήθως θα το χρησιμοποιήσουμε είναι μέχρι τα δεκαπέντε μέτρα με ψιλά εργαλεία και μικρό μολύβι, ώστε να κατεβαίνει στο βυθό όσο πιο φυσιολογικά γίνεται.

Αν το χρησιμοποιήσουμε για μαλάγρα μπορούμε στο μέρος που θα ψαρέψουμε να πετάμε κατά διαστήματα σκουληκάκια η να το χρησιμοποιήσουμε με διάφορα άλευρα και άλλα συστατικά όπου μέσα θα βάλουμε και κάποια ποσότητα bigattini.

Όλα σχεδόν τα ψάρια μπορούν να πιαστούν με αυτό το δόλωμα, φτάνει να ξέρουν πώς να τα ψαρέψουν.

Πλεονεκτήματα	Αρέσει σε όλα τα ψάρια, Ιδανικό για εγγλέζικο και μπολονέζ
Μειονεκτήματα	Συντήρηση, έντονη οσμή αμμωνίας, Η χρήση λεπτών εργαλείων
Ψάρια	Κέφαλοι, Μουρμούρες, Σαργοί, Κακαρέλοι, Μελανούρια, Λαβράκια

ΚΑΡΑΒΙΔΑΚΙ



Είναι πιο μαλακό και πιο ευαίσθητο από την γαρίδα.

Ο τρόπος που δολώνεται δεν διαφέρει απ' αυτόν της γαρίδας. Το αγκίστρι διαπερνά το σώμα του από την ουρά έως κάτω από το κεφάλι, διατηρώντας το με αυτόν τον τρόπο ζωντανό.

Απευθύνεται συνήθως σε ψάρια του βυθού, όπως τη τσιπούρα, το σπάρο, τη μουρμούρα, τα λυθρίνια, τους σαργούς, τους χάνους, τις πέρκες κ.α.

Το χρησιμοποιούμε σε όλους τους τρόπους ψαρέματος, στο παραγάδι, την καθετή, το πεταχτάρι.

Πλεονεκτήματα	Αρεστό σε όλα τα ψάρια, Δολώνεται εύκολα
Μειονεκτήματα	Αντέχει λίγο, Το χαλούν τα μικρόψαρα
Ψάρια	Μουρμούρες, Τσιπούρες, Κακαρέλοι, Λυθρίνια

ΦΑΡΑΩ



Το μήκος του μπορεί να πλησιάσει και τα δύο μέτρα.

Το κομμάτι που είναι περασμένο στο αγκίστρι, συνεχίζει να κάνει σπασμωδικές, ζωντανές κινήσεις. Το αίμα που φεύγει από το σώμα του, μαλαγρώνει τη γύρω από το δόλωμα περιοχή. Η ικανότητά του να φωσφορίζει και το σκληρό κρέας του σε σχέση με το “μαύρο”, το κατατάσσουν στα πιο αποτελεσματικά δολώματα.

Χρησιμοποιείται κυρίως στο πεταχτάρι για τσιπούρες, σαργούς, σκαθάρια, σικιούς, αλλά και σε μεγαλύτερα αρπαχτικά ψάρια όπως στήρες, συναγρίδες, σφυρίδες, ροφούς, λαβράκια. Αλλά και τα μουγγριά, οι σμέρνες και τα χταπόδια δε το αποφεύγουν.

Πλεονεκτήματα	Ιδανικό για βράχια και σκοτάδι, Επιλέγει τα εκλεκτά, ψάρια της περιοχής, Ανθεκτικό, Συντήρηση σχετικά εύκολη
Μειονεκτήματα	Κόστος αγοράς
Ψάρια	Σαργοί, Σηκιοί, Κακαρέλοι, Λυθρίνια, Μελανούρια, Μαυρόψαρα, Τσιπούρες

ΑΓΡΙΟ



Το άσπρο – κίτρινο και ελαφρύ καφέ, αποτελούν το χρωματισμό του. Όταν το βγάλουμε από τη θάλασσα ή το αγοράσουμε από το κατάστημα, το διατηρούμε μέσα σε θαλασσινό νερό ή σε υγρό μαλακό χαρτί έως ότου φτάσουμε στον προορισμό μας.

Αν ο χρόνος από τη παραλαβή μέχρι την χρήση του είναι μεγάλος, οι συχνές αλλαγές του θαλασσινού νερού ή η τοποθέτηση ειδικής αεραντλίας στο δοχείο που το διαφυλάσσουμε, είναι ό,τι καλύτερο για να διατηρείται το δόλωμα ολοζώντανο.

Πριν δολώσουμε, το κόβουμε σε ροδέλες, με τρόπο τέτοιο που να ανταποκρίνεται στο εκάστοτε αγκίστρι. Πάντα σε μικρό δοχείο, κλυμπούν οι κομμένες ροδέλες, μέσα στο υγρό που φυλάσσει στο εσωτερικό του το παραπάνω σκουλήκι.

Πλεονεκτήματα	Τα ψάρια τα λατρεύουν
Μειονεκτήματα	Συντηρούνται για μικρό χρονικό διάστημα, Δύσκολα εξασφαλίζουμε μερικά, Είναι αρκετά ακριβά, Τα χαλούν εύκολα τα μικρά ψάρια
Ψάρια	Τσιπούρες, Κακαρέλοι, Λυθρίνια, Μουρμούρες, Λαβράκια

MAYPO



Σκουλήκι των αμμουδερών βυθών. Ζει και αυτοπροστατεύεται από το κέλυφος που διαθέτει σε όλο το μήκος του σώματός του. Το μαύρο χρώμα που έχει, του έδωσε και την ονομασία του.

Σε δροσερό περιβάλλον γίνεται κατάλληλο για μурμουρές, αλλά και για σαργούς, σπάρους και άλλα πετρόψαρα, όπως πέρκες, γύλους, χάνους, χειλούδες κ.α.

Το χρησιμοποιούμε στο πεταχτάρι και λιγότερο στη καθετή

Πλεονεκτήματα	Προσελκύει όλα τα ψάρια, Το βρίσκουμε εύκολα παντού, Έχει σχετικά μικρό κόστος, Διαθέτει πολύ φώσφορο
Μειονεκτήματα	Τα μικρά «του δίνουν και καταλαβαίνει», Ποτέ δεν ξέρουμε αν τα θηκάρια είναι γεμάτα ή άδεια, Δε βγάζουν πολλά δολώματα
Ψάρια	Μουρμούρες, Κακαρέλοι, Φαγκρόπουλα, Λυθρίνια

ΜΟΝΟΔΟΛΙ



Το μονοδόλι έχει μήκος 7-12 cm και χρώμα λευκό/ροζ.

Το μονοδόλι ανήκει στην ίδια κατηγορία με την μάνα μόνο που δεν φτάνει σε αυτό το μέγεθος ενώ είναι και πιο ευαίσθητο.

Διαφέρει ο τρόπος που το περνάμε στο αγκίστρι. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα δολώματα που τα περνάμε κεντητά, το αγκίστρι διαπερνάει το μονοδόλι και δολώνεται ολόκληρο, εξού και το όνομά του (Μονοδόλι).

Το προκλητικό άσπρο/ροζ χρώμα του, η ικανότητά του να φωσφορίζει και οι ελκυστικές κινήσεις που κάνει δολωμένο, το αναγάγουν σε ένα από τα καλύτερα δολώματα για τα νερά της Μεσογείου

Διατηρείται σε θερμοκρασία 15-200 για 3-4 ημέρες.

Κατάλληλο για όλες τις εποχές και για ψάρεμα από σκάφος, ακτή, surfcasting.

Μάνα



Η ποιοτική διαφορά της Μάνας, αναγκάζει τους ψαράδες να την προτιμούν για το πεταχτάρι και λιγότερο στην καθετή και το παραγάδι. Προσελκύει τσιπούρες, σαργούς, σκαθάρια, σπάρους και άλλα μικρά πετρόψαρα.

Επίσης αυξάνεται η ελκυστικότητά της, γιατί φωσφορίζει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τη διατηρούμε μέσα σε θαλασσινό νερό ή σε υγρό μαλακό χαρτί έως ότου φτάσουμε στον προορισμό μας.

Πλεονεκτήματα	Αρεστά στα εκλεκτά ψάρια, Αντέχουν στην «παρενόχληση» των μικρόψαρων, Δολώνονται εύκολα
Μειονεκτήματα	Κόστος αγοράς (ειδικά τα μονοδόλια), Δύσκολη συντήρηση τους καλοκαιρινούς μήνες, Θέλουν προσοχή στη δόλωση, γιατί αν τρυπήσουν άτσαλα στο βγάλσιμο της ακίδας από μέσα τους, χύνονται όλα τα υγρά τους και χάνουν μεγάλο μέρος της προκλητικότητάς τους
Ψάρια	Τσιπούρες, Σαργοί, Κακαρέλοι

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ



Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ είναι ένα σκουλήκι με πολύ αίμα, το χρώμα του είναι κόκκινο και σε μήκος φθάνει μέχρι 20 cm.

Διατηρείται για 4-5 ημέρες σε θερμοκρασία 4-60

Κατάλληλο για όλες τις εποχές και για ψάρεμα από σκάφος και ακτή.

Πλεονεκτήματα	Αρέσει πολύ στα εκλεκτά ψάρια, Δολώνεται εύκολα, Διατηρεί την κινητικότητά του στο νερό για πολλή ώρα
Μειονεκτήματα	Σχετικά μεγάλο κόστος αγοράς (τα μεγάλα είναι πιο οικονομικά, αφού δίνουν πιο πολλές «μερίδες»), Δύσκολη συντήρηση τους καλοκαιρινούς μήνες (απαραίτητη η παγοκύστη)
Ψάρια	Μουρμούρες, Σαργοί, Κακαρέλοι, Λυθρίνια, Τσιπούρες

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ



Είναι ευκολόχρηστο δόλωμα για ερασιτέχνες ψαράδες της ακτής και προκαλεί όλα τα πετρόψαρα.

Επίσης καλά αποτελέσματα έχει και στη καθετή...

Διατηρείται ζωντανό για δεκαπέντε περίπου μέρες σε δροσερό περιβάλλον και ακόμα καλύτερα στη συντήρηση ψυγείου.

Πλεονεκτήματα	Αρεστό στα περισσότερα ψάρια, Εύκολη προμήθεια, σε οποιαδήποτε ποσότητα, Εύκολη συντήρηση, για μεγάλο χρονικό διάστημα, Αρκετά οικονομικό, Δολώνεται εύκολα, Έχει μεγάλη αντοχή και αξιοσημείωτη κινητικότητα
Μειονεκτήματα	Είναι σχετικά μαλακό δόλωμα, ταλαιπωρείται και χαλάει εύκολα από τα μικρόψαρα
Ψάρια	Μουρμούρες, Μελανούρια, Κακαρέλοι, Σαργοί, Φαγκρόπουλα

TIPS

sardela = universal doloma

garida = universal doloma(malon) pianete se mikres limnes petros kato apo petres to elkeioun ola ta dolomata p.x.(nekro kefali psariou)

karkinoeidi = καβούρια, τους αστακούς, τις караβίδες, τις γαρίδες και τα κριλ.

Plakton = ousia pou epipleei stin ualassa (aspro,kafe ktl.)

afropsara = konta stin epifania tou nerou

petropsara = konta se braxous

bauibia I abyssaia = ston byuo

Κακαρέλος: Τρόποι Ψαρέματος από την Ακτή

Αυλιάς, καμπανάς, κακαρέλος, ονομασίες που απευθύνονται στο ίδιο και αυτό ψάρι. Πολλοί είναι που τον αποκαλούν και σαργό αλλά διαφέρει σημαντικά. Οι δυο μαύρες γραμμές, η μία κοντά στο κεφάλι και η άλλη στην ουρά είναι τα πιο χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Κυκλοφορεί σε βραχώδεις και ανάμεικτους βυθούς ή εκεί όπου υπάρχει το μικρό πράσινο μαρουλάκι.

Κοπαδιάρικο γενικά ψάρι. Αυτό σημαίνει ότι στα σημεία που θα το συναντήσουμε δε θα υπάρχει ένα μόνο ψάρι αλλά και δεύτερο ή και τρίτο μαζί. Στις όχι πολυψαρεμένες περιοχές κυκλοφορεί σε ομάδες που ξεπερνούν τα εκατό άτομα. Αν βρούμε ένα τέτοιο σημείο τότε το ψάρεμα αποκτά άλλες διαστάσεις.

Το μέγεθός του δεν φθάνει του σαργού. Το μισό κιλό είναι ένα πολύ ικανοποιητικό μέγεθος για κακαρέλο ενώ τα μεγαλύτερα από αυτά ψάρια είναι σπάνια για τα αγκίστρια μας.

Παμφάγο όσο αφορά τις ορέξεις του που μπορεί να τσιμπήσει τόσο σε σκουλήκια όσο και σε ζυμάρια ή και ψαροδόλια. Κυκλοφορεί και την ημέρα και το βράδυ και μπορούμε να το ψαρέψουμε με επιτυχία όλες τις ώρες. Το ψάρεμα του ενδιαφέρον και οι τρόποι σύλληψης του αρκετοί.

Απικό

Ψάρεμα όπου θα πάρουμε πολλά κομμάτια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό που θα χρειαστεί είναι να επιλέξουμε με προσοχή το σημείο ψαρέματος και να υπάρχουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες.

Σημείο ψαρέματος

Κάβοι με απότομα κρεμαστά νερά, κατρακοίλια, ξενέρια είναι τα σημεία που έχουν ενδιαφέρον. Αν καταφέρουμε και βρούμε μια μικρή εσοχή σε τέτοια σημεία τότε μάλλον είμαστε στο ιδανικό σημείο. Αν πάλι δεν μας ταιριάζει το ψάρεμα του βράχου και είμαστε λιμανίσιοι τότε θα προτιμήσουμε την εξωτερική πλευρά κάποιου μεγάλου μόλου ή λιμενοβραχίονα όπου τα μπλόκια κυριαρχούν.

Καιρικές συνθήκες

Σε αντίθεση με το σαργό και το μελανούρι που για να πλησιάσουν στα δολώματά μας πρέπει να επικρατεί έντονη θαλασσοταραχή και αφρουδιά ο κακαρέλος θα έρθει και θα τσιμπήσει και με πιο ήρεμες καταστάσεις. Ακόμα και σε περίπτωση λαδιάς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πάρουμε ψάρια. Το ιδανικό βέβαια θα ήταν κάποιο θαλασσάκι που σηκώνει θολουρίτσα. Το αν είναι η φορά του αέρα από τη θάλασσα προς την ακτή ή το αντίθετο δεν είναι καθοριστικό της επιτυχίας. Σπουδαίες ψαριές έχουν πραγματοποιηθεί και με τον αέρα από την πλάτη μας.

Εξοπλισμός

Το καλάμι μας αρκετά ελαφρύ αφού θα κρατηθεί στο χέρι για μεγάλο χρονικό διάστημα με μήκος μεγαλύτερο κατά ένα τουλάχιστον μέτρο από το βάθος που θα έχει το σημείο ψαρέματος. Δεν είναι αναγκαίο να είναι σκληρό ειδικά όταν μας απασχολεί μόνο ο κακαρέλος και όχι ο κέφαλος ή άλλα ψάρια του βράχου. Η δράση κορυφή στα συν του καλάμιού.

Ένα σακίδιο πλάτης για τις αρματωσιές μας και τα διάφορα ψιλοεξαρτήματα αυτών, ο κουβάς με τη μαλάγρα μας και κάποιο ψυγείο για τα ψάρια είναι ο υπόλοιπος εξοπλισμός μας.

Αρματωσιά

Το διπλάρακι με αγκιστράκια είναι αυτό που συνηθίζεται περισσότερο εδώ. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι αυτό που θα καθορίσει το πάχος των πετονιών που θα χρησιμοποιήσουμε για μάνα και παράμαλλα, το βάρος του μολυβιού και το αν θα ψαρέψουμε με φελλό ή στο χέρι.

Με φουσκοθαλασσιά και θολούρα προτεινόμενα πάχη πετονιών είναι το 0,30 για μάνα και το 0,25 για παράμαλλο ενώ με κάλμα το 0,25 για μάνα και το 0,20 για παράμαλλο. Βέβαια αν δούμε ότι τα ψάρια της περιοχής είναι μεγάλου μεγέθους τότε αναγκαστικά θα πρέπει να ανεβάσουμε το πάχος του παράμαλλου.

Το ψάρεμα στο χέρι θα προτιμηθεί στην αφρουδιά ενώ στη κάλμα ο φελλός θα είναι πιο ξεκούραστος και πιο διασκεδαστικός. Το μολύβι μας όσο γίνεται πιο ελαφρύ που αυξάνεται όταν επικρατούν ρέματα και αναταραχή.

Τα αγκίστρια μας θα εξαρτηθούν από το δόλωμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Στα σκουλήκια είναι γενικά μακρυκότσανα και ίσια ενώ στο ζυμάρι τα παπαγαλέ είναι τα πλέον κατάλληλα. Το μέγεθος των αγκιστριών εκτός από το μέγεθος των ψαριών έχει να κάνει επίσης και με το δόλωμα. Στο μπικατίνι θα μπει αγκίστρι δεκάρι ενώ στο ζυμάρι πεντάρι.

Πολλοί ψαράδες χρησιμοποιούν δυο διαφορετικά μεγέθη αγκιστριών στην ίδια αρματωσιά, για παράδειγμα διπλάρι με ένα αγκίστρι νούμερο 4 κι ένα αγκίστρι νούμερο 7. Έτσι απευθύνονται και στα μεγάλα ψάρια που θέλουν μπόλικο δόλωμα αλλά και στα μικρότερα που θέλουν μικρό δόλωμα.

Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε στην κατασκευή της αρματωσιάς μας είναι το συνολικό μήκος της που θα είναι μικρότερο από το μήκος του καλάμιού ώστε να μπορούμε να βγάλουμε το ψάρι εκτός νερού χωρίς να μας κοπανήσει στο βράχο. Όσο πιο ευλύγιστο είναι το καλάμι μας εννοείται τόσο κοντύτερη θα είναι και η αρματωσιά μας.

Δόλωμα

Σκουλήκια πάσης φύσεως με προτίμηση στα λεπτά, γαριδούλα, ψαροδόλι, ψωμοτύρι, μπικατίνι τα δολώματα που συνήθως χρησιμοποιούμε. Αν θέλουμε και κάτι το ιδιαίτερο τότε το σαλιγκαράκι του βράχου και η πεταλίδα είναι αυτά που μπορεί να κάνουν τη διαφορά αλλά και να μας βγάλουν από μια θέση δύσκολη σε περίπτωση τελειώματος του βασικού μας δολώματος.

Μαλάγρα

Η μαλάγρα είναι αυτή που θα φέρει τα ψάρια από μακριά και θα τα συγκεντρώσει στο σημείο ψαρέματος. Επειδή οι κακαρέλοι είναι ψάρια κοπαδιαστά αν καταφέρουμε και τραβήξουμε ένα ψάρι κοντά μας πολύ γρήγορα θα έρθουν και τα υπόλοιπα εκεί.

Άμμος, βρεγμένο και τριμμένο ψωμί ανακατεμένα με κάποιο μυρωδικό ή αυτοσχέδια μαλάγρα μας. Αν το βάθος είναι αρκετά μεγάλο τότε η άμμος θα κυριαρχήσει στη μαλάγρα ώστε να κατεβαίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα στο βυθό. Αν τα νερά ρηχά τότε το ψωμί είναι το κυρίαρχο.

Τι να προσέξουμε:

- Μέρη που μας έδωσαν μια φορά ψάρια είναι σίγουρο ότι θα μας δώσουν και άλλη.

- Σε συνθήκες άπνοιας μην απογοητευόμαστε και ας δοκιμάσουμε ψάρεμα με λεπτά εργαλεία και δόλωμα μπικατίνι ή λεπτά σκουλήκια όπως ακροβάτη και κόκκινο της άμμου.
- Το καλοκαίρι προτιμούμε τα βαθιά και κρεμαστά νερά ενώ το χειμώνα τις ρηχαιδιές και τα ξενέρια.
- Όσο τα ψάρια τσιμπούν δεν μαλαγρώνουμε. Όταν δούμε ατσιμπία ή μας έφυγε κάποιο ψάρι τότε ξαναεπιχειρούμε νέο μαλάγρωμα.
- Όταν ο καιρός είναι θαλασσινός, δηλαδή από τη θάλασσα προς τη στεριά τότε μαλαγρώνουμε πιο ανοικτά. Όταν όμως είναι στεριανός τότε το μαλάγρωμα γίνεται πάνω στο βράχο και με ελάχιστο ψωμί.

Για τους φίλους που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι το διαφορετικό έχουμε να τους προτείνουμε τα μικρά πλανάκια και τις καμπουρίτσες δολωμένα με ζυμάρι, σαλιγκαράκι ή άλλο δόλωμα δεμένα σε μια αρματωσιά στο απίκο. Ιδιαίτερα αποδοτικό με συνθήκες θολούρας και ψάρεμα σε μικρές εσοχές και κολπάκια όπου ο καιρός έρχεται προς την ακτή.

Μπολονέζ-Εγγλέζικο

Τρόπος ψαρέματος διασκεδαστικός και αρκετά αποδοτικός. Γίνεται θαυμάσια τόσο σε βραχώδεις βυθούς όσο και στο εξωτερικό λιμανιών. Το μπολονέζ θα προτιμηθεί όταν το ψάρεμα γίνεται κοντά και υπάρχει φουσκοθαλασσιά και το εγγλέζικο για ψάρεμα μακριά και χωρίς ιδιαίτερα κυματισμό.

Οι στρογγυλοί μικροί κόκκινοι φελλοί δε θα πρέπει να λείπουν από τον εξοπλισμό μας. Μολυβωμένοι αν το βάθος είναι μικρό και χωρίς έρμα αν το βάθος μεγάλο και χρειάζεται ερμάτισμα η αρματωσιά μας. Οι μακρόστενοι φελλοί θα χρειαστούν μόνο σε περίπτωση ηρεμίας. Για τα νυκτερινά μας ψαρέματα θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη υποδοχή για το χημικό φωτάκι.

Το ερμάτισμα της αρματωσιάς γίνεται είτε συγκεντρωμένο στο κατώτερο σημείο πριν το παράμαλλο είτε με μια τορπίλη περίπου το 80% του συνολικού ερματίσματος και το υπόλοιπο 20% με μικρά σκιστά μολυβάκια σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

Πετονιά μηχανισμού 0,20-0,25 αν υπάρχει η δυνατότητα απόχης και 0,25-0,28 αν δεν υπάρχει με παράμαλλο 0,18-0,22 και 0,22-0,26 αντίστοιχα. Το παράμαλλο έχει μήκος γύρω στα 40 εκατοστά και συνδέεται με την πετονιά του μηχανισμού με τη βοήθεια θηλιών. Αγκίστρι από 5 νούμερο αν χρησιμοποιήσουμε μεγάλα δολώματα μέχρι 12 για το μπικατίνι. Ψαρεύουμε κοντά στο πάτο.

Τι να προσέξουμε:

- Δεν τραβάμε στα ψλοτσιμπηματάκια αλλά περιμένουμε το καλό.
- Όταν ψαρεύουμε στο βράχο και έχει φουσκοθαλασσιά τότε το ψάρεμα είναι πάντα ημερήσιο.
- Τα νυκτερινά μας ψαρέματα είναι στο εξωτερικό των λιμανιών και σε μικρά κολπάκια όπου επικρατεί είτε ηρεμία είτε ο αέρας είναι στεριανός.
- Στο ψάρεμα με μπικατίνι το μαλάγρωμα με μπικατίνι είναι απαραίτητο.

Casting

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος ψαρέματος του κακαρέλου. Ο εξοπλισμός μας απλός χωρίς κάτι το ιδιαίτερο εκτός κι αν το ψάρεμά μας απευθύνεται σε μακρινά σημεία όπου εκεί η βολή θα παίξει σημαντικό ρόλο. Σε μέρη βραχώδη η πετονιά του μηχανισμού τέτοια που να αντέχει στις κακουχίες. Εκεί θα προτιμήσουμε και το βαρίδι χορευτή για να αποφύγουμε τα σκαλώματα.

Αρματωσιά

Η αρματωσιά μας μονάγκιστρη ως επί το πλείστο, με διπλαράκι σε πιο ήπιους βυθούς. Το sissy για να τοποθετηθεί το μολύβι μας στο μονάγκιστρο είναι μια καλή επιλογή, ενώ η συρόμενη μολυβήθρα ή ελιά θα μπει σε πιο ήπιους βυθούς με ελάχιστα σκαλώματα.

Στο διπλάρι το τελείωμα των παράμαλλων είναι πιο ψηλά από το μολύβι αφού οι κακαρέλοι είναι ψάρια που ανεβαίνουν αρκετά από το βυθό.

Ένα float για ανύψωση δολώματος μπορεί να κάνει τη διαφορά ειδικά σε βυθούς με πλούσια βλάστηση ή θολούρα. Μάλιστα εδώ έχει παρατηρηθεί ότι τα μικρά φωσφοριζέ ανυψωτικά δολώματος πέρα από ανύψωση λειτουργούν και ως προσελκυστικό και δεν είναι λίγες οι φορές που τα ψάρια το καταπίνουν μαζί με το δόλωμα.

Τόποι

Κι εδώ θα επιλέξουμε βραχώδη βυθούς που είναι εύκολο να τους διακρίνουμε από μακριά. Αν είμαστε γνώστες της περιοχής και ξέρουμε σημεία με πλάκες τότε είναι μια καλή επιλογή ενώ ψάρια πολλά θα πάρουμε και στα κρεμάσματα φθάνει όμως ο βυθός να έχει κατρακοίλια ή μεγάλα μονόπετρα και να μην είναι λείος. Κάβοι που ξεχωρίζουν είναι μια επίσης καλή επιλογή ενώ τα ξενέρια πάντα βαστούν ψάρια αλλά έχουμε πολλά σκαλώματα και κοψίματα.

Στα νυκτερινά ψαρέματα καλό είναι ο τόπος που θα καθίσουμε να είναι εξωτερικά ομαλός για να μπορούμε και να απλώσουμε τον εξοπλισμό μας άνετα και να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Ακτογραμμή και μικρά κολπάκια με κατάλληλο βυθό στο νερό η καλύτερη νυκτερινή επιλογή.

Δολώματα

Τα σκουλήκια υπερисχύουν. Ακροβάτης, κόκκινο της άμμου, αμερικάνος, φαραώ, μικρά μονοδόλια, μάνα τα πιο συνηθισμένα. Καραβιδάκι ζωντανό και μικρή γαριδούλα επίσης καλές επιλογές, όπως επίσης το σαλιγκαράκι και η πεταλίδα του βράχου.

Η καλή παρουσίαση του δολώματος στο αγκίστρι μας είναι πολύ σημαντικό. Επειδή το στόμα του κακαρέλου δεν είναι τόσο ευμεγέθη θα πρέπει το δόλωμα να είναι περασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε εύκολα να μπορεί να το καταπιεί. Για αυτό πολλοί ψαράδες χρησιμοποιούν μικρότερα αγκίστρια και δολωσιά μεγάλη αλλά μακρόστενη.

Τι να προσέξουμε:

- Το φεγγάρι στα νυκτερινά ψαρέματα καλό είναι να υπάρχει. Οι μέρες κοντά στην πανσέληνο πάντα δίνουν πολλά και καλά ψάρια.
- Στο σκοτάδι θα προτιμήσουμε φαραώ που έχει την ιδιαιτερότητα ότι διαλέγει τα μεγάλα.
- Όταν έχει θολούρα και κυματισμό τότε αμμουδιές κοντά σε βράχια δίνουν ψάρια. Φαίνεται ότι έχουν πάει εκεί να βρουν τροφή και καλό είναι να τα ψαρέψουμε πάνω στο σπάσιμο του καιρού και όχι όταν ο καιρός είναι δυνατός.
- Με μεγάλες καλοσύνες ας δοκιμάσουμε στο εξωτερικό λιμανιών με λεπτά εργαλεία και δόλωμα λεπτά σκουλήκια όπως κόκκινο της άμμου και ακροβάτη.

Ψάρεμα με μπομπάρδα μαλαγρωτή

Πολλές επιτυχίες έχουμε στο ψάρεμα του κακαρέλου όταν αυτό γίνεται με τη βοήθεια μπομπάρδας μαλαγρωτή. Φαίνεται ότι το απευθείας μαλάγρωμα της περιοχής κοντά στο δόλωμα δρα καταλυτικά κι εκεί είναι το μυστικό της επιτυχίας.

Η μπομπάρδα μαλαγρωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην τεχνική του casting όσο και του μπολονέζ. Μάλιστα στο μπολονέζ, αν η περιοχή είναι ρηχαδιά με άγριο βυθό, θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέονσα μπομπάρδα κι έτσι πέρα από ένα αποδοτικό ψάρεμα θα γλυτώσουμε κι από τα μπερδέματα και κοψίματα του βυθού.

Το μπικατίνι είναι ένα θαυμάσιο δόλωμα γιατί χρησιμοποιείται και σε μαλάγρα το ίδιο. Λεπτά σκουληκάκια, ζωντανά δολώματα και φιλέτο σαρδέλας ή γάβρου κομμένο σε μακρόστενα κομμάτια οι άλλες μας επιλογές.

Παραγάδι ακτής(ανεμοπαράγαδο)

Τις νύκτες που επικρατεί δυνατός αέρας και οι υπόλοιποι τρόποι ψαρέματος έχουν δυσκολίες το ανεμοπαράγαδο μπορεί να μας προσφέρει ένα ικανοποιητικό ψάρεμα. Αυτό που θα μεριμνήσουμε είναι ο τόπος καλαρίσματος να είναι με στεριανό αέρα ώστε να μας μεταφέρει το караβάκι μας μακριά και να μπορέσουμε να ψαρέψουμε μεγαλύτερη περιοχή.

Ο βυθός μας ρηχαδιες. Πετρώδης αλλά με όχι απότομες διακυμάνσεις το ιδανικό. Αν κάπου αρχίζει και βαθαίνει αρκετά τότε τα μικρά μολυβάκια ίσως δώσουν τη λύση.

Σαλιγκαράκι, πεταλίδα, φαραώ και ολοθούριο τα δολώματα που προτιμούμε σε αυτό το είδος ψαρέματος.