

Dariana Coll

32.2.66.245

Sesión: 1

Estadística: Taller

Parte C: El resto de los datos agrupados

Se presentan los montos de gastos de representación en \$ de 25 sucursales bancarias:

150	420	380	890	510
-----	-----	-----	-----	-----

200	750	920	440	610
-----	-----	-----	-----	-----

330	810	550	480	290
-----	-----	-----	-----	-----

670	780	310	950	180
-----	-----	-----	-----	-----

520	460	390	720	840
-----	-----	-----	-----	-----

1. Determine el rango (Valor máximo - Valor mínimo).

$$V_{\text{mxmo}} - V_{\text{mnmo}} = 950 - 150 = 800 //$$

$$\text{Rango} = 800$$

1. Siguiendo a Johnson y Hubby, agrupe estos datos en 5 clases de igual de ancho

$$\text{Ancho de clase} = \frac{\text{Rango}}{5} = \frac{800}{5} = 160$$

$$\text{Clase 1} = 150 - 310$$

$$\text{Clase 2} = 310 - 470$$

$$\text{Clase 3} = 470 - 630$$

$$\text{Clase 4} = 630 - 790$$

$$\text{Clase 5} = 790 - 950$$

2. Construya la tabla de frecuencias con sus respectivos intervalos

X	f	F	r	R
150 - 310	4	4	0,16	0,16
310 - 470	7	11	0,28	0,44
470 - 630	5	16	0,20	0,64
630 - 790	4	20	0,16	0,80
790 - 950	5	25	0,20	1
	25		1	

Parte D: Análisis crítico y reflexión

Basándose en Johnson y Kubly

1. ¿Que se pierde al agrupar datos de la parte C en intervalos en lugar de listarlos uno por uno?

R= Se pierde la identidad individual de cada valor, ejemplo, en el primer intervalo se sabe que 4 sucesos gastaron entre 150\$ y 510\$ pero perdemos el dato de que una gastó 290\$ exactos.

2. ¿En que situación sería un error usar datos agrupados?

R= En una conciliación bancaria o en la auditoría de cuentas por cobrar/pagar, ya que para un contador un "promedio de gastos" no es igual a la verificación de cada factura original.