

C y D Individual

C. El reto de los datos agrupados.

Se Presenta los montos de "gastos de Presentación" (en \$) de 25 Sucursales bancarias:

150, 420, 380, 890, 510,
200, 750, 920, 440, 610.
330, 810, 550, 480, 290,
670, 780, 310, 950, 180,
520, 460, 390, 720, 840.

1. Determine el Rango (Valor Máximo - Valor Mínimo).

- Valor Máximo: 950
- Valor Mínimo: 150
- Rango = $950 - 150 = 800$

2. Siguiendo Johnson y Ruby, agrupe estos datos en 5 clases de igual ancho.

$$\text{Ancho} = 800 / 5 = 160$$

3.- Construya la Tabla de Frecuencias Con sus respectivos Intervalos.

Frecuencia Absoluta (f_i)

Nº de clase	Intervalos de GASTOS \$	ConTeo	Frecuencia Absoluta (f_i)
1	[150, 310)	(150, 180, 200, 290)	4
2	[310, 470)	(310, 330, 380, 390, 420, 440, 460)	7
3	[470, 630)	(480, 510, 520, 550, 610)	5
4	[630, 790)	(670, 720, 750, 780)	4
5	[790, 950)	(810, 840, 890, 920, 950)	5
Total			25

D. Análisis Crítico y Reflexión.

1. ¿Qué se pierde al agrupar los datos de la Parte C. en intervalos en lugar de listarlos uno por uno?

- **Pérdida de Precisión:** Se pierde la individualidad de cada Sucursal, ya que podemos saber que en la primera clase se gastó 150\$ a 310\$, pero logramos ver cuál de todas gastó exactamente los 310\$.

- **Valores exactos:** Solo se conoce la frecuencia en ese rango, no en el valor preciso de cada observación.

2. ¿En qué situación Contable sería un error grave usar datos agrupados?

Es inaceptable para el control interno y el registro contable, ya que como Contadores lo importante es el monto con exactitud con su respectiva factura como soporte del gasto. Si lo agrupamos no podremos ver de quien o de que fue el gasto.

Así como También al momento de pagar el Impuesto, podríamos pagar de más o menos,

lo cual nos llevaria a una multa, y para evitar es recomendable hacerlo individual.