

Dado	conteo	f	F	r
0	□□	9	9	0,9
1	□	5	14	0,5
2	□	4	18	0,4
3	1	1	19	0,1
4			19	
10				

Parte C: El reto de los datos Agrupados:

1. Determinación del rango

• Valor Máximo: 950

• Valor Mínimo: 150

IVANKA DEYÁN

31.292.439

$$\text{Rango} = 950 - 150 = 800$$

$$800 / 5 = 160$$

Dado	Intervalo	f	Datos
1	150-310	5	150, 200, 290, 180, 310
2	310-470	6	450, 380, 440, 330, 460, 390
3	470-630	5	510, 610, 550, 480, 520
4	630-790	4	750, 670, 780, 720
5	790-950	5	890, 920, 810, 950, 840
Total		25	

Parte D: Análisis Crítico y Reflexión

¿Qué se pierde al agrupar la identidad individual de cada dato?

Se pierde la identidad individual y la exactitud de cada cifra. Al meter los datos en "cajas" (intervalos), dejamos de ver el valor real de cada sucursal y solo trabajamos con promedios del grupo, lo que oculta detalles específicos y valores atípicos.

¿Cuándo sería un error grave?

En procesos de Auditoría y Conciliación.

• Razón: En contabilidad legal o fiscal, cada centavo debe cuadrar con exactitud. Agrupar datos impide detectar errores específicos, duplicados o posibles fraudes, ya que la agrupación "suaviza" las anomalías que un auditor necesita encontrar.