

Jesús Solano V-32.276.549 Contaduría P.
Estadística: Sección 02

Parte C: El Reto de los datos agrupados.

1. Rango (R):

• Valor Máximo: 950

• Valor Mínimo: 150

• $R = 950 - 150 = 800$

2. Ancho de Clase (W):

• Número de Clases (K): 5

• $W = R/k \rightarrow 800/5 = 160$

3. Tabla de Frecuencias (Intervalos):

Clase	Intervalo (Gasto \$)	Frecuencia (f)
1	[150 - 310)	4
2	[310 - 470)	7
3	[470 - 630)	5
4	[630 - 790)	4
5	[790 - 950)	5
Total		25

Parte D: Análisis Crítico y Reflexión

1. Pérdida de información: Al agrupar datos, se pierde la identidad individual de cada valor, por ejemplo, en la clase 1 sabemos que hay 4 sucursales

que gastaron entre \$150 y \$310, pero perdemos el dato exacto de cuánto gastó cada una (si fue 180, o 290). Solo conservamos una visión general de la distribución.

2. Error grave en Contaduría: Sería un error grave usar datos agrupados en una Conciliación Bancaria o en una Auditoría Forense. En estas situaciones, la exactitud es obligatoria; agrupar montos impediría identificar discrepancias centavo a centavo o detectar transacciones fraudulentas específicas que quedarían "escondidas" dentro del promedio de un intervalo.