

TALLER

Parte C: El Reto de los Datos Agrupados

1.- Valor Máximo 950 - Valor Mínimo 150

$$950 - 150 = 800$$

2.- $800 \div 5 = 160$

3.- Clase 1: [150-310) - 150, 200, 290, 180 = 4

Clase 2: [310-470) - 420, 380, 330, 310, 460, 440, 390 = 7

Clase 3: [470-630) - 510, 610, 550, 480, 520 = 5

Clase 4: [630-790) - 750, 780, 670, 720 = 4

Clase 5: [790-950) - 890, 920, 810, 950, 840 = 5

25

Parte D: Análisis Crítico y Reflexión

1.- ¿Que se pierde al agrupar los datos de la parte C en intervalos en lugar de tenerlos uno por uno?

R: Se pierde el detalle exacto. Al meter los gastos en grupos, ya que no sabemos cuánto gasto cada sucursal por separado. Solo vemos el grupo completo así que perdemos la puntería y nos toca trabajar con promedios.

2.- ¿En que situación contable sería un error grave usar datos agrupados?

R: Cuando hay que buscar un error de dinero, un robo o hacer una auditoría. Si falta una cantidad específica, la tabla no te dice quién la tiene, solo te dice en que rango está. En contabilidad, para cuadrar cuentas o pagar sueldos, necesitas el número exacto, no un grupo.