

Raycarlos Barreto.
C.I: 32122941
-Contaduría Pública.
Sección: 2.

Parte C.

1. Rango

• Valor máximo : 950

• Valor mínimo : 150

$$\text{Rango} = 950 - 150 = 800.$$

2. Agrupación

$$A = \frac{\text{Rango}}{K} = \frac{800}{5} = 160$$

Tabla de frecuencias.

Clase	Intervalo (i)	Frecuencia absoluta (f)
1	150-310	5
2	310-470	5
3	470-630	3
4	630-790	4
5	790-950	<u>6</u>
Total		23

Parte D.

1. ¿Qué se pierde al agrupar los datos?

- El detalle exacto. Ya que, por ejemplo, si se agrupan muchos recibos en una misma carpeta y se le nombra "Gastos de 100 a 250\$". Al final del día se sabrá cuántos recibos hay dentro, pero no exactamente cuántos son de cada monto; por ende, al agrupar, los números individuales "desaparecen", para convertirse en una Estadística General.

2. ¿En qué situación contable sería un error grave usar datos agrupados?

- al realizar una Auditoría o Conciliación Bancaria, ya que, en estos casos es necesario que las cuentas cuadren con exactitud. Y si se agrupan, se podría pasar por alto algún error; ya sea pagos duplicados e incluso desviación o malversación de fondos, pasando desapercibido en el promedio. Por ello, es importante que en la contabilidad, cada monto tenga un sustento claro.