

Puerto Ordaz, 26-04-2026

4^{to} Semestre sección 1 Contaduría Pública

Estudiante: Estefany Romero C.I 31.881.994

Taller

Parte C: El reto de los Datos Agrupados

Se presentan los montos de "Gastos de Representación" (en \$) de 25 sucursales bancarias:

150	420	380	890	510	200
750	920	440	610	330	810
550	480	290	670	780	310
950	180	520	460	390	720
840					

1- Determine el Rango (Valor Máximo - Valor Mínimo)

$$R = (950 - 150) = 800$$

2- Siguiendo a Jonhson y Kuby, agrupe estos datos en 5 clases de igual ancho.

3) Ordenar datos de menor a mayor

150	180	200	290	310	330
380	390	420	440	460	480
510	520	550	610	670	720
750	780	810	840	890	920
950					

$$R = 800$$

Determinar el número de Clase (Intervalos)

$$N = \text{Número de Sucesos} \quad I = \sqrt{N} = \sqrt{25} = 5$$

Calcular Amplitud de clase

$$A = \frac{R}{I} = \frac{800}{5} = 160$$

3- Construya la tabla de frecuencia con sus respectivos intervalos

# clase	Intervalos	Frecuencia	Relativa	Frecuencia Acumulada	relativa Acumulada
1	[150 - 310)	4	0,16	4	0,16
2	[310 - 470)	7	0,28	11	0,44
3	[470 - 630)	5	0,2	16	0,64
4	[630 - 790)	4	0,16	20	0,8
5	[790 - 950)	5	0,2	25	1
		25	1		

Parte D: Análisis Crítico y Reflexión

Basándose en lo aprendido hoy sobre Johnson y Kuby respondan como equipo:

1- ¿Que se pierde al agrupar datos de la Parte C en intervalos en lugar de listarlo uno por uno?

- Se presenta una pérdida de identificación, porque dentro de intervalo se desconoce que número está, solo se sabe que pertenece en ese rango. Además, se pierde la información individual, ya que están ocultos en la frecuencia del intervalo, También, se pierde la exactitud porque se trabaja con estimaciones

2- ¿En qué situación contable sería un error grave usar datos agrupados?

- En el cálculo de nómina: Porque los Salarios, las retenciones deben calcularse por empleado individual. Ya que cada trabajador tiene condiciones laborales, fiscales y términos contractuales únicos que influye en la cantidad final de dinero que recibe.