

Abraham Fernández

CI 32 416 788

Sección 02

Taller grupal: Fundamentos y organización de datos

Parte C

Se presentan los montos de "Gastos de Representación" (en \$) de 25 sucursales bancarias:

150,	420,	380,	890,	510,
200,	750,	920,	440,	610,
330,	810,	550,	480,	290,
670,	780,	310,	950,	180,
520,	460,	390,	720,	840,

- 1.- Determine el Rango (Valor máximo - Valor mínimo).
- 2.- Siguiendo a Johnson & Kuby, agrupe estos datos en 5 clases de igual ancho.
- 3.- Construya la tabla de frecuencias con sus respectivos intervalos.

$R = R_{\text{range}}$

$K = \text{Intervalos}$

$A = \text{Amplitud}$

$$R = x_{\text{max}} - x_{\text{min}}$$

$$K = 1 + 3,322 \log(n)$$

$$A = R/K$$

$$R = 950 - 150$$

$$K = 1 + 3,322 \log 25$$

$$A = 800/5$$

$$R = 800$$

$$K = 5,6 \rightarrow 5$$

$$A = 160$$

Clases	x	f	F	r	R
[150 - 310)	230	4	4	0,16	0,16
[310 - 470)	390	6	10	0,24	0,40
[470 - 630)	550	6	16	0,24	0,64
[630 - 790)	710	4	20	0,16	0,80
[790 - 950]	870	5	25	0,20	1
		25		1	

$$x = \frac{Li + Ls}{2}$$

2

Parte D

Basándose en lo aprendido hoy sobre Johnson & Kubz, responder:

1.- ¿Que se pierde al agrupar los datos en la Parte C en intervalos en lugar de listarlos uno por uno?

El agrupar los datos permite resumir grandes conjuntos de información, lo que facilita y agiliza el tener que trabajarlos y analizarlos; sin embargo, conlleva una pérdida significativa de precisión al estarlos analizando en grupo en vez de individualmente.

2.- ¿En que situación contable sería un error grave usar datos agrupados?

En términos generales, el usar datos agrupados en contabilidad sería grave en cualquier situación, puesto que en lugar del uso de datos detallados y específicos que exige la carrera, estaríamos omitiendo y/o acutando información que podría ser definitoria.