

Mayerlin Velásquez 31.636.814
Estadística Sección 2.

Taller

Parte C: El Reto de los Datos Agrupados.

Se representan los montos de "Gastos de Representación" (En \$) de 25 Sucursales bancarias:

150 - 420 - 380 - 890 - 510 - 200 - 750 - 920 - 440
610 - 330 - 810 - 550 - 480 - 290 - 670 - 780 - 310
950 - 180 - 520 - 460 - 390 - 720 - 840 -

1) Determine el Rango (Valor Máximo - Valor mínimo)

Valor Máximo = 950

Valor Mínimo = 150

Rango = $950 - 150 = 800$

2) Siguiendo a Johnson & Kuby, agrupe estos datos en 5 clases de igual ancho.

Ancho de clase = $\frac{\text{Rango}}{5} = \frac{800}{5} = 160$

• Clase 1 = 150 - 309

• Clase 2 = 310 - 469

• Clase 3 = 470 - 629

• Clase 4 = 630 - 789

• Clase 5 = 790 - 950

3) Construya la tabla de Frecuencias con su respectivo intervalos.

X	f	F	Y	R
150 - 309	4	4	0,16	0,16
310 - 469	7	11	0,28	0,44
470 - 629	5	16	0,20	0,64
630 - 789	4	20	0,16	0,80
790 - 950	5	25	0,20	1
	25		1	

Parte de Análisis Crítico y Reflexión, Basándose en lo aprendido hoy sobre Johnson, Kuby, respondan Como Equipo:

1) ¿Qué se pierde al agrupar los datos de la parte C en intervalos en lugar de listarlos uno por uno?

al agrupar se pierde:

- La precisión de Cada Valor Original (no se sabe si un gasto es 310 o 469 si ambos están en el mismo intervalo).
- La Capacidad de identificar valores exactos: (máximos, mínimos, repeticiones puntuales).
- Detalles finos de la distribución (Pequeños, Vacíos o Concentraciones dentro de un mismo intervalo).

Se gana, Simplicidad y visión general, pero se Sacrifica exactitud.

2) ¿En qué Situación Contable sería un error grave usar Datos agrupados?

En situaciones donde se necesita exactitud individual, por ejemplo:

- Cálculo de impuesto (ISLR), Cada gasto o ingreso debe ser exacto, no aproximado por intervalos.

Cuando un valor individual tiene implicaciones legales, fiscales o Contractuales, no se deben agrupar Datos.