

30) Låt $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

a) Beräkna $\vec{u} \times \vec{v}$. kontrollera att $\vec{u} \times \vec{v}$ är ortogonalt mot \vec{u} och \vec{v}

Kryssprodukten

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 y_3 - x_3 y_2 \\ x_3 y_1 - x_1 y_3 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 - 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 3 - 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

kontroll

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-3) + 0 \cdot (-3) + 1 \cdot 7 = -6 + 7 = 1$$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix} = (-1) \cdot (-3) + 3 \cdot (-3) + 1 \cdot 7 = 3 - 9 + 7 = 1$$

korrekt!


Svar:

a) $\begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$

b) $A = |\vec{u} \times \vec{v}| = 3\sqrt{6}$

c) $A = \frac{|\vec{u} \times \vec{v}|}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{6}$

b) Beräkna parallelogrammet som har \vec{u} och \vec{v} som sidor




Parallelogrammet:

$$|\vec{w}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 7^2} = \sqrt{1 + 4 + 49}$$

$$= \sqrt{54} = \sqrt{9 \cdot 6} = 3\sqrt{6}$$

c) Beräkna arean av triangeln som har \vec{u} och \vec{v} som sidor



$$= \frac{3\sqrt{6}}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{6}$$

Arean av parallelogrammet:

$$A = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

Arean av triangeln

$$A = \frac{|\vec{u} \times \vec{v}|}{2}$$