


Khoa Giám sát cảnh báo, chuẩn bị và đáp ứng khẩn cấp dịch bệnh



CHIKUNGUNYA

PHÁP, Ý

Ngày 03 tháng 10 năm 2025



1. Trung Quốc ghi nhận một đợt bùng phát lớn với tổng cộng 10.000 ca mắc được ghi nhận tới cuối tháng 8.
2. Các ca bệnh tại New York có thể đã được lây nhiễm nội bộ.
3. Đợt bùng phát này tại Pháp đã được ghi nhận là đợt bùng phát lớn nhất.

Latest ▾ Local News ▾ • Live ▾ Shows ▾ ... CBS NEWS

New York | News ▾ Weather ▾ Voters Decide Sports ▾ Video New York Shows ▾ Your Home Tea

LOCAL NEWS

Chikungunya virus case in New York may have been transmitted locally. Here's what we know.

By Jeff Capellini
Updated on: September 25, 2025 / 6:51 PM EDT / CBS New York

f X

FRANCE • HEALTH

Largest chikungunya outbreak recorded in mainland France sparks hunt for tiger mosquitoes

By Delphine Roucaute

Published on August 25, 2025, at 3:18 am (Paris), updated on August 25, 2025, at 3:20 pm

MỤC LỤC

1. **Sơ lược về Chikungunya**
2. **Tổng quan tình hình dịch tại Pháp, Ý**
3. **Các giả thuyết**


1. SƠ LƯỢC VỀ CHIKUNGUNYA

- Là một bệnh sốt cấp tính do **virus chikungunya** gây ra, lây truyền **qua vết đốt** của muỗi bị nhiễm (muỗi *Aedes* spp.)
- Tên chikungunya bắt nguồn từ một từ trong ngôn ngữ Kimakonde ở miền nam Tanzania, có nghĩa là "thứ uốn cong" và mô tả tư thế méo mó của những người bị nhiễm bệnh bị đau khớp dữ dội.
- Phân bố rộng rãi ở các **vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của** châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Trên toàn cầu, virus chủ yếu lây truyền qua muỗi ***Ae. aegypti* và muỗi *Ae. albopictus***.

1. SƠ LƯỢC VỀ CHIKUNGUNYA

- Triệu chứng gồm sốt cao, đau khớp nặng, viêm khớp, cứng khớp, phát ban.
- Mức **độ nặng khác nhau** theo **độ tuổi**: trẻ sơ sinh, nữ nhi và người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn.

Countries and territories with current or previous transmission of chikungunya virus (as of December 2024)



Tính đến 12/2024, **119 quốc gia và vùng lãnh thổ** đã ghi nhận bằng chứng về sự lây truyền tại chỗ qua muỗi của vi rút CHIKV

EU outermost regions reporting
cases and not visible in the main
map extent

- Reunion
- Mayotte

Notification rate per 100 000 persons



Note: Data refer to Chikungunya virus disease cases reported in the last 12 months (September 2024-August 2025) [Data collection: August 2025].
Case numbers are collected from both official public health authorities and non-official sources, such as news media, and depending on the source, autochthonous and non-autochthonous cases may be included.
Administrative boundaries: © EuroGeographics
The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the European Union. ECDC. Map produced on 22 August 2025

Từ **01/2025 - 08/2025**, khoảng **317.000** ca mắc CHIKVD và **135** ca tử vong liên quan đến CHIKVD đã được báo cáo tại **16** quốc gia/vùng lãnh thổ


2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH DỊCH TẠI PHÁP, Ý

Pháp:

- Theo báo cáo của ECDC, tới ngày 24/9/2025 đã ghi nhận **573** ca mắc tại đất liền Pháp.
- Trong đó có 64 ổ dịch đã được ghi nhận, còn 45 ổ dịch vẫn đang hoạt động. Với ổ dịch lớn nhất tại Antibes.
- Được biết đây là đợt bùng phát Chikungunya ***lớn nhất*** tại đất liền Pháp.

Ý:

- Số ca mắc tại Ý tới ngày 24/9 là **268 ca**. Trong đó các ca mắc này tập trung ở vùng Emilia-Romagna và Veneto.





3. CÁC GIẢ THUYẾT

Theo WHO, các yếu tố liên quan đến việc gia tăng sự lây truyền CHIKV bao gồm

- **Biến đổi khí hậu và các hiện tượng cực đoan định kỳ** làm mở rộng phạm vi phân bố muỗi Aedes, làm tăng khả năng lây truyền.
- **Đô thị hóa tự phát và quản lý nước kém:** Các yếu tố này góp phần vào sự sinh sản của véc-tơ và duy trì chu kỳ lây truyền.
- **Bất ổn chính trị và xung đột:** Các quốc gia có nguy cơ như Yemen, Sudan và Somalia phải đối mặt với những thách thức y tế công cộng trầm trọng hơn, bao gồm sự gián đoạn cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe, cản trở việc phát hiện ca bệnh và ứng phó với dịch.
- **Sự gia tăng đi lại:** Việc di chuyển đến và đi từ các vùng lưu hành bệnh làm du nhập các ca bệnh vào những khu vực có véc-tơ truyền bệnh, điều này có thể không được ghi nhận trong các báo cáo giám sát quốc gia, đặc biệt là ở các nước có nguồn lực thấp.




**Tại sao Châu Âu có rất nhiều nước mà
bệnh Chikungunya chỉ được ghi nhận
tại Pháp với Ý?**


- Điều kiện sinh học, môi trường
- Hoạt động đi lại
- Hệ thống giám sát

3.1. ĐIỀU KIỆN SINH HỌC, MÔI TRƯỜNG

Vector



Khí hậu




3.1. ĐIỀU KIỆN SINH HỌC, MÔI TRƯỜNG

Vector

Sự phân bố của muỗi

- **Pháp:** nằm ở Tây Âu, toàn bộ phần phía Nam (từ Địa Trung Hải lên miền Trung), muỗi *Aedes albopictus* **đã định cư rộng rãi.**
- **Ý (Italy):** nằm ở Nam Âu, hầu như toàn lãnh thổ đều màu đỏ, tức là muỗi **đã định cư trên diện rộng.**




3.1. ĐIỀU KIỆN SINH HỌC, MÔI TRƯỜNG

Vector

Sự phân bố của muỗi

Hầu hết các quốc gia đều tô xanh lá (Absent) → đã có khảo sát nhưng **không phát hiện** *Aedes aegypti*.



3.1. ĐIỀU KIỆN SINH HỌC, MÔI TRƯỜNG

Đặc điểm	<i>Aedes albopictus</i>	<i>Aedes aegypti</i>
Phân bố ở châu Âu	Rộng rãi, đã định cư (màu đỏ) ở Nam Âu: Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp...	Hầu như không có ở châu Âu (đa số màu xanh lá – Absent)
Khu vực ghi nhận	Dọc bờ Địa Trung Hải, lan vào Trung Âu	Chủ yếu ở Bắc Phi, Trung Đông (Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Biển Đỏ)
Khả năng thích nghi khí hậu	Khả năng thích nghi khí hậu	Ưa khí hậu nhiệt đới/ cận nhiệt đới, khó sống ở vùng ôn đới
Ý nghĩa dịch tễ	Vector chính gây bùng phát Chikungunya tại Pháp, Ý	Nguy cơ thấp ở châu Âu hiện nay; chỉ đáng lo khi khí hậu ấm lên hoặc qua nhập cảnh

3.1. ĐIỀU KIỆN SINH HỌC, MÔI TRƯỜNG

Vector

Sự lây truyền

Vào đợt dịch Chikungunya năm 2007 tại Ý, nghiên cứu trên muỗi *Aedes albopictus* và virus Chikungunya cũng cho thấy bằng chứng khả năng lây truyền dọc là **một cơ chế đóng vai trò cho việc duy trì virus tại Châu Âu**. Một nghiên cứu thực hiện tại Kenya vào năm 2020 đã phát hiện sự hiện diện của virus Chikungunya ở cả muỗi đực và muỗi chưa trưởng thành là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy **sự lây truyền qua trứng (truyền dọc)** vì những con muỗi này chưa từng hút máu.

3.1. ĐIỀU KIỆN SINH HỌC, MÔI TRƯỜNG

Khí hậu

Đặc điểm của Chikungunya

- Chikungunya phân bố rộng rãi ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Phi, châu Á và châu Mỹ.
- Nhiệt độ môi trường là một trong những yếu tố môi trường quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự lây truyền vi-rút chikungunya qua muỗi. (1)
- Nhiệt độ tối ưu truyền CHIKV: 27°C, nhưng muỗi vẫn truyền ở 20°C (2)

→ khí hậu châu Âu phù hợp.

1. [Chikungunya virus disease risk assessment for mainland EU/EEA](#)

2. [Chikungunya | European Climate and Health Observatory](#)

3.1. ĐIỀU KIỆN SINH HỌC, MÔI TRƯỜNG

Khí hậu

- *Aedes albopictus*
 - Chịu được nhiều điều kiện khí hậu, sống ở độ cao đến 1200 m, trứng chịu được nhiệt độ cao/thấp và hạn hán.
 - Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối ưu để lây truyền vi-rút chikungunya do *Ae. albopictus* ở các vùng ôn đới của bán cầu bắc là 24 – 26 °C; tuy nhiên, sự lây truyền có thể xảy ra trong phạm vi nhiệt độ 12 – 30 °.
- *Aedes aegypti* có biên độ chịu nhiệt hẹp hơn (không sống dưới 4°C), ít quan trọng hơn ở châu Âu.
- Mùa đông ôn hòa (-5°C) giúp quần thể muỗi ổn định; mưa và lũ đầu hè tạo thêm nơi sinh sản.

3.1. ĐIỀU KIỆN SINH HỌC, MÔI TRƯỜNG

Khí hậu

- **Khu vực Địa Trung Hải**
 - Mùa nóng kéo dài → muỗi Aedes hoạt động lâu hơn, mạnh hơn.
 - Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết/chikungunya quy mô lớn.
 - Có thể xuất hiện hiện tượng virus qua đông, duy trì lưu hành dịch.
- **Khu vực Trung và Bắc Âu**
 - Biến đổi khí hậu tạo điều kiện cho muỗi Aedes mở rộng phạm vi đến các vùng mát trước đây chưa bị ảnh hưởng.

3.1. ĐIỀU KIỆN SINH HỌC, MÔI TRƯỜNG

Khí hậu

Các nhà nghiên cứu đã giám sát chặt chẽ quần thể muỗi *Aedes albopictus* trưởng thành và trứng muỗi hàng tuần trong suốt mùa sinh sản của chúng (từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2014) tại Montpellier (tỉnh phía nam nước Pháp).

Trước trận mưa lớn: Nhiệt độ tích lũy là yếu tố quan trọng nhất dự báo sự thay đổi số lượng muỗi *Ae. albopictus*

Sau trận mưa lớn: số lượng muỗi đã tăng vọt một cách đột ngột, vượt qua cả đỉnh điểm được ghi nhận vào tháng 8 và kéo dài đến tận tháng 10.

=> Mưa lớn làm tăng nguy cơ dịch bệnh

3.2. HOẠT ĐỘNG ĐI LẠI

Một nghiên cứu phân tích về virus Chikungunya ở Châu Âu từ năm 2007 đến năm 2023 đã cho thấy tuy đã có sự xuất hiện của các ca mắc bản địa, tuy nhiên phần lớn số ca mắc vẫn liên quan tới việc đi du lịch. Những khu vực thường có liên quan tới các ca bệnh này bao gồm: Ấn Độ, Cộng hòa Dominica, Guadeloupe, Thái Lan.


Vào tháng 10 năm 2014, một ca mắc Chikungunya sau khi từ Cameroon trở về Pháp đã trở thành nguồn lây cho một ổ dịch bao gồm 12 ca tại Pháp.

3.2. HOẠT ĐỘNG ĐI LẠI

- Tới ngày 10 tháng 7 năm 2025, tại Pháp đã ghi nhận 1911 ca bệnh du nhập, trong đó **89% có liên quan tới việc đi du lịch** đến đảo Réunion.
- Nghiên cứu của tác giả Lucie Fournier et al. đã đánh giá rằng sự bùng phát gần đây tại Pháp có liên quan tới đảo Réunion.

3.2. HOẠT ĐỘNG ĐI LẠI

- **Đảo Réunion** là một hòn đảo nằm ở Ấn Độ Dương cách Madagascar 700 km, đây là lãnh thổ hải ngoại của Pháp.
- Theo báo cáo của WHO, tính tới 04/05/2025, tại hòn đảo này đã ghi nhận tổng cộng 47.500 ca mắc và hơn 170.000 ca nghi ngờ.
- Số ca mắc đã tăng từ 30 ca vào cuối năm 2024 lên tới 4.000 ca vào tuần 11, năm 2025.



3.3. HỆ THỐNG GIÁM SÁT

3.3. HỆ THỐNG GIÁM SÁT

CHIKUNGUNYA

1

Tất cả các bệnh lây truyền qua muỗi như Sốt xuất huyết, Chikungunya, Sốt rét hay Sốt West Nile **đều có thể được báo cáo qua hệ thống Giám sát Châu Âu** (the European Surveillance System - TESSy).

2

Đến năm 2022, có tổng cộng 26 quốc gia Châu Âu, đã báo cáo về các ca bệnh Chikungunya đến ECDC.

3

Cả ba quốc gia **Pháp, Ý và Tây Ban Nha** đều có một **hệ thống giám sát tích hợp cho các bệnh do muỗi Aedes truyền** và có những điểm tương đồng về loại hình giám sát, phạm vi địa lý và định nghĩa ca bệnh.

3.3. HỆ THỐNG GIÁM SÁT

- Phạm vi giám sát véc-tơ (vật trung gian truyền bệnh) là toàn quốc ở Pháp và Bồ Đào Nha nhưng chỉ ở cấp khu vực tại Ý.
- Tại đa số các quốc gia, dữ liệu được thu thập thụ động từ các phòng xét nghiệm, bác sĩ và bệnh viện.

3.3. HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Pháp

- Các bệnh truyền nhiễm như SXH, **Chikungunya** và Zika là các bệnh **bắt buộc** phải báo cáo.
- Trong trường hợp nghi ngờ có các ca bệnh lây nhiễm nội địa, tiến hành đi từng nhà để thực hiện khảo sát nhằm phát hiện các triệu chứng nghi ngờ và thực hiện xét nghiệm.
- Từ **tháng 5 đến tháng 11**, là những tháng véc-tơ (vật trung gian truyền bệnh) hoạt động, hoạt động giám sát arbovirus được **tăng cường** để ngăn chặn hoặc hạn chế sự lây truyền trong nước (ca bệnh bản địa).

3.3. HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Pháp

- Các hoạt động này bao gồm việc tăng cường truyền thông tới nhân viên y tế, giám sát kết quả xét nghiệm hàng ngày, kiểm soát vec tơ và thực hiện sàng lọc nguồn máu hiến tặng từ khu vực có dịch.
- Ngoài ra, bệnh Chikungunya có thể được phát hiện thông qua hệ thống giám sát triệu chứng của Cơ quan Y tế công cộng Quốc gia Pháp.
- Thông tin từ các hệ thống giám sát triệu chứng này có thể hỗ trợ cảnh báo sớm đợt bùng phát Chikungunya, xác định các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và ước tính số ca bệnh trong dân số.

KẾT LUẬN

- 1 Điều kiện sinh học, môi trường
- 2 Hoạt động đi lại
- 3 Hệ thống giám sát

Thank You



