

Pfaffian

Pfaffian

$2n \times 2n$ の反対称行列 $A(A^T = -A)$ に定義される以下の量を Pfaffian という.

$$\text{Pf}(A) = \sum_M \text{sgn}(M) \prod_{(i,j) \in M} a_{ij} \quad (1)$$

ここで M は $\{1, \dots, 2n\}$ の n 個のペアへの分割

$$\{(i_1, j_1), \dots, (i_n, j_n)\} \quad (i_1 < \dots < i_n, i_1 < j_1, \dots, i_n < j_n) \quad (2)$$

Pfaffian の他の表し方

Pfaffian は以下の形に変形できる.

$$\text{Pf}(A) = \frac{1}{2^n n!} \sum_{\sigma \in S_{2n}} \text{sgn}(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(2k-1)\sigma(2k)} \quad (3)$$

wedge 積を用いて表す方法もある. まず以下のような $W(A)$ を定義する.

$$W(A) := a_{ij} e^i \wedge e^j \quad (4)$$

これは縮約を取っていることに注意. このとき

$$\begin{aligned} [W(A)]^n &= \sum_{\sigma \in S_{2n}} \prod_{k=1}^n a_{\sigma(2k-1)\sigma(2k)} e^{\sigma(2k-1)} \wedge e^{\sigma(2k)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_{2n}} \text{sgn}(\sigma) \left[\prod_{k=1}^n a_{\sigma(2k-1)\sigma(2k)} \right] e^1 \wedge \dots \wedge e^{2n} \\ &= 2^n n! \text{Pf}(A) e^1 \wedge \dots \wedge e^{2n} \end{aligned} \quad (5)$$

ここで, 反対称行列の行列式と Pfaffian の関係について述べる. n 次の反対称行列 A について, その固有方程式 $f(\lambda)$ は

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \det(\lambda I - A) = \det(\lambda I + A^T) \\ &= \det(\lambda I + A) \\ &= (-1)^n f(-\lambda) \end{aligned} \quad (6)$$

よって n が $\begin{pmatrix} \text{偶数} \\ \text{奇数} \end{pmatrix}$ のとき, $f(\lambda)$ は $\begin{pmatrix} \text{偶関数} \\ \text{奇関数} \end{pmatrix}$ となる.

n が奇数のときは $\det A = 0$ となり, n が偶数のときは固有値は $\lambda, -\lambda$ のペアで現れる.

特に, n が偶数の時について, 以下の関係が成り立つ.

行列式と Pfaffian の関係

$2n \times 2n$ の反対称行列 A について

$$\det A = [\text{Pf}(A)]^2 \quad (7)$$

証明 (7) は a_{ij} に関する有限次の多項式恒等式なので, A が実反対称行列の場合について示せば十分である.

補題 A より, ある可逆行列 S が存在し,

$$S^T A S = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_1 & & & \\ -\lambda_1 & 0 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & \lambda_n \\ & & & -\lambda_n & 0 \end{pmatrix} (= \Lambda) \quad (8)$$

Λ について簡単な計算により

$$\det \Lambda = (\lambda_1 \cdots \lambda_n)^2 \quad (9)$$

$$\text{Pf}(\Lambda) = \lambda_1 \cdots \lambda_n \quad (10)$$

さらに

$$\det S^T A S = \det S^T \det A \det S = (\det S)^2 \det A \quad (11)$$

及び補題 B より

$$\text{Pf}(S^T AS) = (\det S) \text{Pf}(A) \quad (12)$$

これらから

$$(\det S)^2 \det A = \det \Lambda = [\text{Pf}(\Lambda)]^2 = (\det S)^2 [\text{Pf}(A)]^2 \quad (13)$$

$\det S \neq 0$ より

$$\det A = [\text{Pf}(A)]^2 \quad (14)$$

□

補題 A

$2n \times 2n$ の実反対称行列 A についてある可逆行列 S が存在し,

$$S^T AS = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_1 & & & \\ -\lambda_1 & 0 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & \lambda_n \\ & & & -\lambda_n & 0 \end{pmatrix} (= \Lambda) \quad (15)$$

証明

$$B := A^T A = -A^2 \quad (16)$$

とおくと, B は半正定値実対称行列

□

補題 B

$2n \times 2n$ の反対称行列 A 及び可逆行列 S について

$$\text{Pf}(S^T AS) = (\det S) \text{Pf}(A) \quad (17)$$

証明

$$\Lambda := S^T AS \quad (18)$$

について,

$$\Lambda_{ij} = (S^T)_{ik} a_{kl} S_{lj} = a_{kl} S_{ki} S_{lj} \quad (19)$$

よって

$$\begin{aligned} W(\Lambda) &= \Lambda_{ij} e^i \wedge e^j = a_{kl} S_{ki} S_{lj} e^i \wedge e^j \\ &= a_{kl} f^k \wedge f^l \end{aligned} \tag{20}$$

これは e^i から $f^i := S_{ij} e^j$ への基底変換と考えることができ,

$$[W(\Lambda)]^n = 2^n n! \text{Pf}(A) f^1 \wedge \cdots \wedge f^{2n} \tag{21}$$

これと

$$f^1 \wedge \cdots \wedge f^{2n} = (\det S) e^1 \wedge \cdots \wedge e^{2n} \tag{22}$$

から,

$$\begin{aligned} [W(\Lambda)]^n &= 2^n n! \text{Pf}(\Lambda) e^1 \wedge \cdots \wedge e^{2n} \\ &= 2^n n! \text{Pf}(A) (\det S) e^1 \wedge \cdots \wedge e^{2n} \end{aligned} \tag{23}$$

よって

$$\text{Pf}(\Lambda) = (\det S) \text{Pf}(A) \tag{24}$$

□