

I. គណនាលីមីត :

ក. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\pi}{4} - x}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

គេតាង $t = x - \frac{\pi}{4}$ នោះ $-t = \frac{\pi}{4} - x$

បើ $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$ នោះ $t \rightarrow 0$

គេបាន $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\pi}{4} - x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \sin t}{-t} = -2$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\pi}{4} - x} = -2}$ ។

ខ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 5x}{\sqrt{5} - \sqrt{x+5}}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 5x \cdot (\sqrt{5} + \sqrt{x+5})}{(\sqrt{5} - \sqrt{x+5})(\sqrt{5} + \sqrt{x+5})}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 5x \cdot (\sqrt{5} + \sqrt{x+5})}{5 - (x+5)}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 5x \cdot (\sqrt{5} + \sqrt{x+5})}{-x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin 5x}{5x} \cdot 10(\sqrt{5} + \sqrt{x+5}) \right]$

$= 1 \cdot 10(\sqrt{5} + \sqrt{5}) = 20\sqrt{5}$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 5x}{\sqrt{5} - \sqrt{x+5}} = 20\sqrt{5}}$ ។

គ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 3x}{-2x^2}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{-2x^2}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9 \sin^2 3x}{-2 \cdot (3x)^2} = -\frac{9}{2}$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 3x}{-2x^2} = -\frac{9}{2}}$ ។

ឃ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{|x|}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

គេមានពីរករណីគឺ $x \rightarrow 0^-$ និង $x \rightarrow 0^+$

• ករណី $x \rightarrow 0^-$ នោះ $|x| = -x$

គេបាន $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - x}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-1}{-1} = 1$

• ករណី $x \rightarrow 0^+$ នោះ $|x| = x$

គេបាន $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{1} = -1$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{|x|} = \begin{cases} 1 & \text{បើ } x \rightarrow 0^- \\ -1 & \text{បើ } x \rightarrow 0^+ \end{cases}}$

II. ក. គណនា $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$:

គេមាន $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$, $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$

គេបាន $z_1 + z_2 = (-1 + i\sqrt{3}) + (-1 - i\sqrt{3}) = \boxed{-2}$

$z_1 - z_2 = (-1 + i\sqrt{3}) - (-1 - i\sqrt{3}) = \boxed{2i\sqrt{3}}$

$z_1 z_2 = (-1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3}) = 1 - 3i^2 = \boxed{4}$

ខ. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$z_1 = -1 + i\sqrt{3} = 2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \boxed{2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)}$

$z_2 = -1 - i\sqrt{3} = 2 \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \boxed{2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right)}$

គ. បង្ហាញថា z_1 និង z_2 ជាឫសរបស់សមីការ $z^3 - 8 = 0$

ដោយ $z^3 - 8 = 0$

$(z-2)(z^2 + 2z + 4) = 0$

ចំពោះ $z^2 + 2z + 4 = 0$ មាន $\Delta' = 1 - 4 = -3$

នាំឱ្យ $z = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{1} = \begin{cases} -1 + i\sqrt{3} = z_1 \\ -1 - i\sqrt{3} = z_2 \end{cases}$

ដូចនេះ $\boxed{z_1 \text{ និង } z_2 \text{ ជាឫសរបស់សមីការ } z^3 - 8 = 0}$ ។

III. គេមានប៊ូល 12 សរសេរលេខពី 1 ដល់ 12 គេចាប់យកប៊ូល 3:

នាំឱ្យ ចំនួនករណីអាច $n(S) = C(12, 3)$ ដែល

$C(12, 3) = \frac{12!}{(12-3)!3!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9!}{9! \cdot 3 \cdot 2} = 220$

ក. រកប្រូបាប « ប៊ូលទាំង 3 មានលេខសុទ្ធតែចែកជាចំនួន 3 »

ប៊ូលមានលេខចែកជាចំនួន 3 រួមមាន 3, 6, 9, 12

នាំឱ្យ ចំនួនករណីស្រប $n(A) = C(4, 3) = 4$

គេបាន
$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{220} = \frac{1}{55}$$

ដូចនេះ
$$P(A) = \frac{1}{55} \quad \text{។}$$

ខ. រកប្រូបាប « មានប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកជាចំនួន 3 »

គេចាប់បានប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកជាចំនួន 3 នោះនៅសល់ប៊ូលពីរទៀតមានលេខចែកមិនជាចំនួន 3

នាំឱ្យ ចំនួនករណីស្រប $n(B) = C(4, 1) \times C(8, 2)$

$$n(B) = 4 \times \frac{8!}{6!2!} = 4 \times \frac{8 \cdot 7 \cdot 6!}{6!2} = 4 \times 28$$

គេបាន
$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{4 \times 28}{220} = \frac{28}{55}$$

ដូចនេះ
$$P(B) = \frac{28}{55} \quad \text{។}$$

គ. រកប្រូបាប « មានលេខតាមលំដាប់កើនជាស្វ៊ីតនព្វន្ឋមាន $d=3$ »

លេខលើប៊ូលមានលំដាប់កើនជាស្វ៊ីតនព្វន្ឋដែល $d=3$ រួមមាន៖

$(1, 4, 7), (2, 5, 8), (3, 6, 9), (4, 7, 10),$
 $(5, 8, 11), (6, 9, 12)$ មានចំនួន 6 ករណី

នាំឱ្យ ចំនួនករណីស្រប $n(C) = 6$

គេបាន
$$P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{6}{220} = \frac{3}{110}$$

ដូចនេះ
$$P(C) = \frac{3}{110} \quad \text{។}$$

IV. ១. រកលីមីត :

គេមាន
$$f(x) = x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} \quad \text{កំណត់លើ }]0, +\infty[$$

និងមាន C ជាក្រាបរបស់វា

ក. រក
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} \right)$$

$$= +\infty - 5 + 0 + 0 = \boxed{+\infty}$$

ខ. រក
$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[x - 5 + \frac{1}{x} (8 \ln x + 9) \right]$$

$$= 0 - 5 + \infty [8(-\infty) + 9] = \boxed{-\infty}$$

គ. ស្រាយបំភ្លឺចាបន្ទាត់ Δ ដែលមានសមីការ $y = x - 5$

ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង C នៅជិត $+\infty$

គេមាន
$$f(x) = x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x}$$

ដោយ
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} \right) = 0 + 0 = 0$$

នាំឱ្យ បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = x - 5$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C ។

ឃ. កំណត់អាបស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង Δ និងខ្សែកោង C

គេមាន បន្ទាត់ $\Delta: y = x - 5$ និង

ខ្សែកោង $C: f(x) = x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x}$

គេបានសមីការអាបស៊ីស

$$x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} = x - 5$$

$$\frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} = 0, \quad x > 0$$

$$8 \ln x + 9 = 0 \Rightarrow x = e^{-\frac{9}{8}}$$

ដូចនេះ អាបស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វកំណត់បានគឺ
$$\boxed{x = e^{-\frac{9}{8}}} \quad \text{។}$$

២. ក. បង្ហាញថា $\forall x \in]0, +\infty[$ គេបាន $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

គេមាន
$$f(x) = x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} = x - 5 + \frac{9 + 8 \ln x}{x}$$

នាំឱ្យ
$$f'(x) = 1 + \frac{(9 + 8 \ln x)'x - (x)'(9 + 8 \ln x)}{x^2}$$

$$= 1 + \frac{8 - (9 + 8 \ln x)}{x^2} = \frac{x^2 - 1 - 8 \ln x}{x^2}$$

ដូចនេះ
$$\boxed{f'(x) = \frac{g(x)}{x^2} \text{ ដែល } g(x) = x^2 - 1 - 8 \ln x} \quad \text{។}$$

ខ. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ដោយដឹងថាសមីការ

$g(x) = 0$ មានចម្លើយ $x' = 1$ និង $x'' = \alpha$ ($1 < \alpha$)

គេមាន
$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}, \quad \forall x \in]0, +\infty[, \quad x^2 > 0$$

នាំឱ្យ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $g(x)$

គេមាន
$$g(x) = x^2 - 1 - 8 \ln x$$

មានឫស $x' = 1$ និង $x'' = \alpha$ ($1 < \alpha$)

ហើយ
$$g'(x) = 2x - \frac{8}{x} = \frac{2x^2 - 8}{x} = \frac{2(x+2)(x-2)}{x}$$

ចំពោះ $\forall x \in]0, +\infty[$ នោះ $\frac{2(x+2)}{x} > 0$
 នាំឱ្យ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $x-2$ (មានឫស $x=2$)
 $g(2) = 2^2 - 1 - 8\ln 2 \approx -2.5$
 លីមីត $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - 1 - 8\ln x) = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 1 - 8\ln x) = +\infty$

តារាងអថេរភាពនៃ $g(x)$

x	0	1	2	α	$+\infty$
$g'(x)$	-	-	0	+	+
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\swarrow$	$\nearrow$	$+\infty$
			-2.5		

តាមតារាងអថេរភាពនៃ $g(x)$ គេទាញបានសញ្ញានៃ $g(x)$
 $g(x) > 0$ កាលណា $x \in (0, 1) \cup (\alpha, +\infty)$
 $g(x) < 0$ កាលណា $x \in (1, \alpha)$

តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$, $f(1) = 1 - 5 + \frac{8\ln 1}{1} + \frac{9}{1} = 5$

x	0	1	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$+\infty$
		5	$f(\alpha)$	

ដូចនេះ បើ $x < 1$ ឬ $x > \alpha$ នោះ f ជាអនុគមន៍កើន
 បើ $1 < x < \alpha$ នោះ f ជាអនុគមន៍ចុះ
 បើ $x = 1, x = \alpha$ នោះ f ជាអនុគមន៍ថេរ ។

V. ១. ក. រក $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

គេមាន $f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$ កំណត់លើ $\mathbb{R}$ និងមាន
 C ជាក្រាបរបស់វា

គេបាន $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (4 - x - 2e^{-x})$
 $= 4 - \infty - 0 = -\infty$

ខ. បង្ហាញថា $D: y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង C

គេមាន $f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$ (ជាទម្រង់កាណូនិក)

ដោយ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2e^{-x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{e^x} = 0$

នាំឱ្យ បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $D: y = -x + 4$ ជា
 អាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C តាងអនុគមន៍ ខាង $+\infty$ ។

គ. តើខ្សែកោង C នៅលើឬក្រោមបន្ទាត់ D ចូរបញ្ជាក់

គេសិក្សាផលសងរវាងសមីការក្រាប C និងសមីការបន្ទាត់ D

គេបាន $f(x) - y = (4 - x - 2e^{-x}) - (4 - x) = -2e^{-x}$

ដោយ $e^{-x} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ នោះ $f(x) - y = -2e^{-x} < 0$

ដូចនេះ ក្រាប C នៅពីខាងក្រោមបន្ទាត់ $D, \forall x \in \mathbb{R}$ ។

ឃ. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f(x) = \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}$

គេមាន $f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$
 $= 4 - x - \frac{2}{e^x} = \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}$

ដូចនេះ $f(x) = \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}$ ។

ង. រក $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, (ប្រើលទ្ធផល $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$)

ដោយ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x} \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} (4e^x - xe^x - 2)$
 $= (+\infty)(4 \cdot 0 - 0 - 2) = -\infty$

ដូចនេះ រកបាន $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ។

ច. ក. គណនា $f'(x)$

គេមាន $f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$ នោះ $f'(x) = -1 + 2e^{-x}$

ដូចនេះ គណនាបាន $f'(x) = -1 + 2e^{-x}$ ។

> សិក្សាអថេរភាពនៃ f

គេឱ្យ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -1 + 2e^{-x} = 0$

គេបាន $e^{-x} = \frac{1}{2}$ នោះ $-x = \ln \frac{1}{2}$ ឬ $x = \ln 2$

• បើ $f'(x) > 0$ នោះ $-1 + 2e^{-x} > 0$ នាំឱ្យ $x < \ln 2$

• បើ $f'(x) < 0$ នោះ $-1 + 2e^{-x} < 0$ នាំឱ្យ $x > \ln 2$

តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f

x	$-\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	$3 - \ln 2$	$-\infty$

$f(\ln 2) = 4 - \ln 2 - 2e^{-\ln 2} = 3 - \ln 2 \approx 2.3$

តាមតារាងអថេរភាពគេអាចទាញបានពីអថេរភាពនៃក្រាប C

បើ $x < \ln 2$ នោះ f ជាអនុគមន៍កើន

បើ $x > \ln 2$ នោះ f ជាអនុគមន៍ចុះ

បើ $x = \ln 2$ នោះ f ជាអនុគមន៍ថេរ ។

> កំណត់តម្លៃពិតនៃអតិបរមាបស់ f

តាមតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ ត្រង់ $x = \ln 2$, $f'(x) = 0$

ហើយប្រសព្វពីរ (+) ទៅ (-) បញ្ជាក់ថា f មានអតិបរមា

មួយស្មើនឹង $f(\ln 2) = 3 - \ln 2 \approx 2.3$ ។

ដូចនេះ តម្លៃអតិបរមាជៀបរកបានគឺ

$$\boxed{f(\ln 2) = 3 - \ln 2 \approx 2.3} \quad \text{។}$$

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង C ត្រង់ A

សមីការបន្ទាត់ប៉ះរាង $T : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

ដោយ T ប៉ះក្រាប C ត្រង់ចំណុច A មានអាប់ស៊ីស $x_0 = 0$

គេបាន $f'(x_0) = f'(0) = -1 + 2e^{-0} = 1$

$$f(x_0) = f(0) = 4 - 0 - 2e^{-0} = 2$$

នាំឱ្យ $T : y = 1(x - 0) + 2$ នោះ $T : y = x + 2$

ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ប៉ះ $\boxed{T : y = x + 2}$ ។

គ. បង្ហាញថាសមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់

ដែលគេតាងដោយ β នៅក្នុងចន្លោះ $[-1, 0]$

តាមតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f នៅចន្លោះ $[-1, 0]$

គេបាន f ជាអនុគមន៍កើនជាប់ខាង (គ្មានបរមា)

ម្យ៉ាងទៀត $f(-1) = 4 - (-1) - 2e^{-(-1)} = 5 - 2e$

$$f(0) = 4 - 0 - 2e^{-0} = 2$$

នាំឱ្យ $f(-1) \times f(0) = (5 - 2e) \cdot 2 = 10 - 4e < 0$

ដោយ ក្នុងចន្លោះ $[-1, 0]$ មាន f ជាអនុគមន៍កើន និង

$$\text{មាន } f(-1) \times f(0) < 0$$

នាំឱ្យ ក្នុងចន្លោះ $[-1, 0]$ គឺ f មានឫសតែមួយគត់

តាងដោយ β

ដូចនេះ សមីការ $f(x) = 0$ មានឫសតែមួយគត់នៅ

$$\boxed{\text{ក្នុងចន្លោះ } [-1, 0]}$$

។