

- I. (២០ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម៖ ក.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x - 1}$  ខ.  $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x - 1}{1 + \sin x}$  គ.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x$
- ឃ.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{-x} + e^x) \sin^2 x}{2x^2}$  ង.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \ln(x+2) - \ln x - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4} \right)$  ។
- II. (២០ពិន្ទុ) ១. គេមានចំនួនកុំផ្លិច  $z_1 = \sqrt{2}$  ,  $z_2 = -i\sqrt{2}$  ,  $z_3 = +i\sqrt{2}$  ។
- ក. គណនា  $z_1 + z_2$  ,  $z_1 + z_3$  ,  $(z_1 + z_2)(z_1 + z_3)$  ។
- ខ. កំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់  $z_1 + z_2$  ,  $z_1 + z_3$  ,  $\left( \frac{z_1 + z_3}{z_1 + z_2} \right)^2$  ។
២. គណនា  $i^n$  ចំពោះតម្លៃនៃចំនួនគត់វិជ្ជមាន  $n \geq 1$  ។ ទាញរកតម្លៃ  $i^{2015} - i^{2014}$  ។
- III. (១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សស្រី ៤ នាក់ សិស្សប្រុស ២ នាក់ និងសិស្សអឺរ៉ុប ៣ នាក់ ។ គេរៀបចំសិស្សជាក្រុមស្វ័យសិក្សា ក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស ៣ នាក់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោម ៖
- ក. « យ៉ាងតិចមានសិស្ស ២ នាក់ ជាសិស្សស្រី » ។
- ខ. « យ៉ាងតិចមានសិស្ស ២ នាក់ ជាសិស្សអឺរ៉ុប » ។
- គ. « មានសិស្សម្នាក់ក្នុងមួយក្រុម » ។
- IV. (៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍  $f$  កំណត់លើ  $I = ]0, +\infty[$  ដោយ  $f(x) = \frac{x + \ln x}{x^2}$  ។
- A.  $h$  ជាអនុគមន៍កំណត់លើ  $I$  ដោយ  $h(x) = -x + 1 - 2\ln x$  ។ គណនា  $h(1)$  និងសិក្សាអថេរភាពនៃ  $h(x)$  ដោយគេមិនតម្រូវឱ្យគណនាលីមីតនៃ  $h(x)$  ត្រង់ ០ និងត្រង់  $+\infty$  ឡើយ ។
- B. ១. គណនាលីមីតនៃ  $f(x)$  ត្រង់ ០ និងត្រង់  $+\infty$  ។
២. គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  នៃអនុគមន៍  $f(x)$  ។
៣. បង្ហាញថានៅលើ  $I$  ,  $f(x)$  មានសញ្ញាដូច  $h(x)$  ។
៤. ទាញយកអថេរភាពនៃ  $f(x)$  លើ  $I$  និងសង់ក្រាប  $C$  នៃ  $f(x)$  នៅក្នុងប្លង់កម្រិតអក្សរកូណាម៉ាល់  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  ។
- V. (១៥ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល :  $(E) : y'' + 4y = x^2 + 2x - 1$
១. រកអនុគមន៍  $f_1(x) = ax^2 + bx + c$  ជាចម្លើយរបស់សមីការ  $(E)$  ។
២. បង្ហាញថាបើ  $f(x)$  ជាចម្លើយនៃសមីការ  $(E)$  នោះ  $g(x) = f(x) - f_1(x)$  ជាចម្លើយនៃសមីការ  $y'' + 4y = 0$  ។
- VI. (២០ពិន្ទុ) ក. ក្នុងកម្រុយអក្សរកូណាម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  គេមានចំណុច  $A(2, 2, 1)$  ,  $B(4, -2, 0)$  ,  $C(3, 1, 1)$  ,  $D(1, 5, 2)$  ។ បង្ហាញថាតុកោណ  $ABCD$  ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមនេះ ។
- ខ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ ដែលកាត់តាមចំណុច  $A(2, 2, 1)$  និង  $B(4, -2, 0)$  ។
- គ. រកសមីការប្លង់ ដែលកាត់តាមចំណុច  $A(2, 2, 1)$  ,  $B(4, -2, 0)$  ,  $D(1, 5, 2)$  ។



I. គណនាលីមីត :

$$\begin{aligned} \text{ក. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x - 1} & \text{ (មានរាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \text{ )} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+1) = 1^2 + 1 = \boxed{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ខ. } \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x - 1}{1 + \sin x} & \text{ (មានរាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \text{ )} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x - 1)(\sin x + 1)}{1 + \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} (\sin x - 1) = -1 - 1 = \boxed{-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{គ. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x & \text{ (មានរាងមិនកំណត់ } +\infty - \infty \text{ )} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{\sqrt{x^2 + x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - x^2}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1\right)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0} + 1} = \boxed{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ឃ. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{-x} + e^x) \sin^2 x}{2x^2} & \text{ (មានរាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \text{ )} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^{-x} + e^x}{2} \times \frac{\sin^2 x}{x^2} \right) \\ &= \frac{e^{-0} + e^0}{2} \times 1^2 = \boxed{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ង. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \ln(x+2) - \ln x - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4} \right) \\ &= \ln(1+0) - 0 + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{4}} \end{aligned}$$

II. ១. គេមាន  $z_1 = \sqrt{2}$  ,  $z_2 = -i\sqrt{2}$  ,  $z_3 = +i\sqrt{2}$  :

ក. គណនា

$$z_1 + z_2 = \sqrt{2} + (-i\sqrt{2}) = \boxed{\sqrt{2} - i\sqrt{2}}$$

$$z_1 + z_3 = \sqrt{2} + (+i\sqrt{2}) = \boxed{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} (z_1 + z_2)(z_1 + z_3) &= (\sqrt{2} - i\sqrt{2})(\sqrt{2} + i\sqrt{2}) \\ &= \sqrt{2}^2 - (i\sqrt{2})^2 = 2 + 2 = \boxed{4} \end{aligned}$$

ខ. កំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់

$$\begin{aligned} \bullet \ z_1 + z_2 &= \sqrt{2} - i\sqrt{2} = 2 \left( \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= 2 \left[ \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right] \end{aligned}$$

ដូចនេះ ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់កំណត់បានគឺ ៖

$$\boxed{|z_1 + z_2| = 2, \arg(z_1 + z_2) = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}} \quad \text{។}$$

$$\begin{aligned} \bullet \ z_1 + z_3 &= \sqrt{2} + i\sqrt{2} = 2 \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= 2 \left( \cos\frac{\pi}{4} + i \sin\frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

ដូចនេះ ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់កំណត់បានគឺ ៖

$$\boxed{|z_1 + z_3| = 2, \arg(z_1 + z_3) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}} \quad \text{។}$$

$$\begin{aligned} \bullet \ \left( \frac{z_1 + z_3}{z_1 + z_2} \right)^2 &= \left[ \frac{2 \left( \cos\frac{\pi}{4} + i \sin\frac{\pi}{4} \right)}{2 \left[ \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right]} \right]^2 \\ &= \left[ \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) \right]^2 \\ &= \left( \cos\frac{\pi}{2} + i \sin\frac{\pi}{2} \right)^2 \\ &= \cos\pi + i \sin\pi \end{aligned}$$

ដូចនេះ ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់កំណត់បានគឺ ៖

$$\boxed{\left| \left( \frac{z_1 + z_3}{z_1 + z_2} \right)^2 \right| = 1, \arg\left[ \left( \frac{z_1 + z_3}{z_1 + z_2} \right)^2 \right] = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$$

២. គណនា  $i^n$  ចំពោះតម្លៃនៃចំនួនគត់វិជ្ជាទីប  $n \geq 1$

ដោយ  $i^1 = i \quad i^2 = -1 \quad i^3 = -i \quad i^4 = 1$

$i^5 = i \quad i^6 = -1 \quad i^7 = -i \quad i^8 = 1$

$i^9 = i \quad i^{10} = -1 \quad i^{11} = -i \quad i^{12} = 1 \dots$

តាមលំនាំគំរូខាងលើ គេទាញបានស្វ័យគុណនៃ  $i$  ដូចខាងក្រោម

$$i^n = i^{4k+A} \text{ ដែល } k \text{ ជាចំនួនគត់, } A=1,2,3,4$$

- បើ  $A=0$  នោះ  $i^n = 1$
- បើ  $A=1$  នោះ  $i^n = i$
- បើ  $A=2$  នោះ  $i^n = -1$
- បើ  $A=3$  នោះ  $i^n = -i$

> ទាញរកតម្លៃ  $i^{2015} - i^{2014}$

$$i^{2015} - i^{2014} = i^{2012+3} - i^{2012+2}$$

$$= i^{4 \cdot 503+3} - i^{4 \cdot 503+2}$$

$$= i^3 - i^2 = -i - (-1) = 1 - i$$

ដូចនេះ តម្លៃរកបាន  $i^{2015} - i^{2014} = 1 - i$  ។

III. ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សស្រី 4 , អាប្រិច 2 , អ៊ីប 3 នាក់  
គេរៀបសិស្សជាក្រុមស្វ័យសិក្សា ក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស 3 នាក់  
នាំឱ្យ ចំនួនករណីអាច  $n(S) = C(9, 3)$  ដែល

$$C(9, 3) = \frac{9!}{6!3!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{6! \cdot 3 \cdot 2} = 84$$

ក. រកប្រូបាប « យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ ជាសិស្សស្រី »

តាង  $A$  « យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ ជាសិស្សស្រី »

នាំឱ្យ  $n(A) = C(4, 2)C(5, 1) + C(4, 3)$   

$$= \frac{4!}{2!2!} \times 5 + 4 = 30 + 4 = 34$$

គេបាន  $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{34}{84} = \frac{17}{42}$

ដូចនេះ  $P(A) = \frac{17}{42}$  ។

ខ. រកប្រូបាប « យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ ជាសិស្សអ៊ីប »

តាង  $B$  « យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ ជាសិស្សអ៊ីប »

គេបាន  $n(B) = C(3, 2)C(6, 1) + C(3, 3)$   

$$n(B) = 3 \times 6 + 1 = 19$$

គេបាន  $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{19}{84}$

ដូចនេះ  $P(B) = \frac{19}{84}$  ។

គ. រកប្រូបាប « មានសិស្សម្នាក់ក្នុងមួយទ្វីប »

តាង  $C$  « មានសិស្សម្នាក់ក្នុងមួយទ្វីប »

នាំឱ្យ  $n(C) = C(4, 1) \times C(2, 1) \times C(3, 1)$   

$$= 4 \times 2 \times 3 = 24$$

គេបាន  $P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{24}{84} = \frac{2}{7}$

ដូចនេះ  $P(C) = \frac{2}{7}$  ។

IV. គេមាន  $f(x) = \frac{x + \ln x}{x^2}$  កំណត់លើ  $I = ]0, +\infty[$

A.. គណនា  $h(1)$

គេមាន  $h(x) = -x + 1 - 2 \ln x$

$$h(1) = -1 + 1 - 2 \ln 1 = \boxed{0}$$

> សិក្សាអថេរភាពនៃ  $h(x)$

ដេរីវេ  $h'(x) = -1 - \frac{2}{x}$  ឬ  $h'(x) = -\frac{x+2}{x}$

ដោយ  $\forall x \in I = ]0, +\infty[ , \frac{x+2}{x} > 0$

នាំឱ្យ  $h'(x) = -\frac{x+2}{x} < 0$  នោះ  $h$  ជាអនុគមន៍ចុះលើ  $I$

តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $h(x)$

|         |   |                       |           |
|---------|---|-----------------------|-----------|
| $x$     | 0 | 1                     | $+\infty$ |
| $h'(x)$ |   | -                     | -         |
| $h(x)$  |   | $\nearrow 0 \searrow$ |           |

ដូចនេះ  $h$  ជាអនុគមន៍ចុះលើចន្លោះ  $I$  និងគ្មានបរិមាទ

• បើ  $x \in (0, 1)$  នោះ  $h(x) > 0$

• បើ  $x \in (1, +\infty)$  នោះ  $h(x) < 0$

• បើ  $x = 1$  នោះ  $h(x) = 0$

B.. ១. គណនាលីមីតនៃ  $f(x)$  ក្រង់ 0 និងក្រង់  $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + \ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} (x + \ln x)$$

$$= +\infty(0 - \infty) = \boxed{-\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x^2} \right)$$

$$= 0 + 0 = \boxed{0}$$

**២. គណនាដេរីវេ  $f'(x)$  នៃអនុគមន៍  $f(x)$**

គេបាន 
$$f'(x) = \frac{(x + \ln x)' x^2 - (x^2)' (x + \ln x)}{x^4}$$

$$= \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right) x^2 - 2x(x + \ln x)}{x^4}$$

$$= \frac{x + 1 - 2x - 2 \ln x}{x^3} = \frac{-x + 1 - 2 \ln x}{x^3}$$

ដូចនេះ 
$$f'(x) = \frac{-x + 1 - 2 \ln x}{x^3} \quad \text{។}$$

**៣. បង្ហាញថានៅលើ  $I$ ,  $f(x)$  មានសញ្ញាដូច  $h(x)$**

គេមាន 
$$f'(x) = \frac{-x + 1 - 2 \ln x}{x^3} = \frac{h(x)}{x^3}$$

ចំពោះ  $\forall x \in I, x^3 > 0$  នោះ  $f'(x)$  មានសញ្ញាដូច  $h(x)$

ដូចនេះ 
$$\forall x \in I, f(x) \text{ មានសញ្ញាដូច } h(x) \quad \text{។}$$

**៤. ទាញយកអថេរភាពនៃ  $f(x)$  លើ  $I$**

គេមាន សញ្ញានៃ  $f'(x)$  ដូចសញ្ញា  $g(x)$  ដែលបានរករួច


ហើយ 
$$f(1) = \frac{1 + \ln 1}{1^2} = 1$$

តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$

|         |   |   |           |
|---------|---|---|-----------|
| $x$     | 0 | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |   | + | -         |
| $f(x)$  |   | 1 | 0         |

• ត្រង់  $x=1$ ,  $f'(x)=0$  ហើយប្តូរសញ្ញាពី (+) ទៅ (-)  
បញ្ជាក់ថា  $f$  មានអតិបរមាធៀបមួយស្មើនឹង  $f(1)=1$  ។

>សង់ក្រាប  $C$  ក្នុងប្លង់កម្រុយអរតូណរម៉ាល់  $(O, \vec{i}, \vec{j})$



**V. ១. រកអនុគមន៍  $f_1(x) = ax^2 + bx + c$  ជាចម្លើយរបស់  $(E)$**

គេមាន 
$$f_1(x) = ax^2 + bx + c$$

$$f_1'(x) = 2ax + b$$

$$f_1''(x) = 2a$$

បើ  $f_1(x)$  ជាចម្លើយរបស់  $(E)$ :  $y'' + 4y = x^2 + 2x - 1$

លុះត្រាតែ 
$$f_1''(x) + 4f_1(x) = x^2 + 2x - 1$$

$$2a + 4(ax^2 + bx + c) = x^2 + 2x - 1$$

$$4ax^2 + 4bx + 2a + 4c = x^2 + 2x - 1$$

ផ្តើមបាន 
$$\begin{cases} 4a = 1 \\ 4b = 2 \\ 2a + 4c = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1/4 \\ b = 1/2 \\ c = -3/8 \end{cases}$$

ដូចនេះ រកបានអនុគមន៍ 
$$f_1(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{8} \quad \text{។}$$

**២. បង្ហាញថាបើ  $f(x)$  ជាចម្លើយនៃសមីការ  $(E)$  នោះ**

$$g(x) = f(x) - f_1(x) \text{ ជាចម្លើយនៃសមីការ } y'' + 4y = 0$$

គេមាន  $f(x)$  ជាចម្លើយនៃសមីការ  $(E)$

នាំឱ្យ 
$$f''(x) + 4f(x) = x^2 + 2x - 1 \quad (1)$$

ហើយ 
$$f_1''(x) + 4f_1(x) = x^2 + 2x - 1 \quad (2)$$

គេយក  $(1) - (2)$  គេបាន

$$f''(x) - f_1''(x) + 4f(x) - 4f_1(x) = 0$$

$$[f(x) - f_1(x)]'' + 4[f(x) - f_1(x)] = 0$$

$$g''(x) + 4g(x) = 0$$

នាំឱ្យ 
$$g(x) = f(x) - f_1(x) \text{ ជាចម្លើយនៃ } y'' + 4y = 0$$

ដូចនេះ 
$$g(x) \text{ ជាចម្លើយនៃ } y'' + 4y = 0 \quad \text{។}$$

**VI. ក. បង្ហាញថាចតុកោណ  $ABCD$  ជាប្រលេឡូក្រាម**

គេមាន  $A(2, 2, 1), B(4, -2, 0),$

$C(3, 1, 1), D(1, 5, 2)$

នាំឱ្យ  $\overrightarrow{AB} = (2, -4, -1)$  និង  $\overrightarrow{DC} = (2, -4, -1)$

ដោយ  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (2, -4, -1)$  នោះចតុកោណ

$ABCD$  ជាប្រលេឡូក្រាម

ដូចនេះ 
$$ABCD \text{ ជាប្រលេឡូក្រាម} \quad \text{។}$$

**➤រកផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម**

តាមរូបមន្ត  $S = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}|$

គេមាន  $\overrightarrow{AB} = (2, -4, -1)$  និង  $\overrightarrow{AD} = (-1, 3, 1)$

គេបាន  $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$

នាំឱ្យ  $S = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$  ឯកតាផ្ទៃក្រឡា

ដូចនេះ  $\text{ផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម } S = \sqrt{6} \text{ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា}$  ។

**ខ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ ដែលកាត់តាមចំណុច**

$A(2, 2, 1)$  និង  $B(4, -2, 0)$

សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ត្រូវរកមានរាង

$(AB) : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt, t \in \mathbb{R} \\ z = z_0 + ct \end{cases}$

ដោយ បន្ទាត់កាត់  $A(2, 2, 1)$

នោះ  $x_0 = 2, y_0 = 2, z_0 = 1$

ហើយ បន្ទាត់មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស  $\overrightarrow{AB} = (2, -4, -1)$

នោះ  $a = 2, b = -4, c = -1$

ដូចនេះ រកបាន  $(AB) : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 2 - 4t, t \in \mathbb{R} \\ z = 1 - t \end{cases}$  ។

**គ. រកសមីការប្លង់ ដែលកាត់តាមចំណុច**

$A(2, 2, 1), B(4, -2, 0), D(1, 5, 2)$

ប្លង់ត្រូវរករាង  $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$

ដោយ ប្លង់កាត់  $A(2, 2, 1)$

នោះ  $x_0 = 2, y_0 = 2, z_0 = 1$

ហើយ ប្លង់មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់  $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = -\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$

នោះ  $a = -1, b = -1, c = 2$

គេបាន  $(ABD) : -(x - 2) - (y - 2) + 2(z - 1) = 0$   
 $x + y - 2z - 2 = 0$

ដូចនេះ  $(ABD) : x + y - 2z - 2 = 0$  ។