

ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២២ សីហា ២០១៦

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ: ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

- I. តើនៅក្នុងស្លឹកមានស្រទាប់អ្វីខ្លះ? តើស្រទាប់នីមួយៗមានតួនាទីដូចម្តេចខ្លះ?
- II. ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថាអង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លា?
- III. ចូរប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកង និងប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកង។
- IV. តើវិស្វកម្មសេនេទិចជួយដល់រុក្ខជាតិដូចម្តេចខ្លះ?
- V. ក្រោយពេលដំឡើយទ្វេហើយ ហេតុអ្វីបានជាម៉ូលេគុល ADN កូនដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុល ADN មេ?
- VI. ហេតុអ្វីបានជាអម៉ូនក្លាចតែកោសិកាគោលដៅ?
- VII. ម៉ូលេគុល ADN មួយមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ C=180000 ដែលមានសមាមាត្រ ៣០នៃ%នុយក្លេអូទីតទាំងអស់។

ក. រកភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ។

ខ. រកប្រវែងម៉ូលេគុល ADN គិតជាមីក្រូម៉ែត្រ (μm)។

គ.រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ADN។

VIII. សែនមួយមានប្រវែង 680 nm។ សែននេះកំណត់សំយោគ ARNm មួយដែលមានទំនាក់ទំនងវីបូនុយក្លេអូទីត 2A-3C=3G-2U។

ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែននេះ។

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARNm បើគេដឹងថាក្នុងម៉ូលេគុល ARNm នេះមានផលដករវាង A និង U=600 ហើយផលដករវាង C និង G=400

ចម្លើយ

I. នៅក្នុងស្លឹកមានស្រទាប់៖

- អេពីឌែមលើ-ក្រោម
- ស្រទាប់ប៉ាលីសាត
- ស្រទាប់ស្ពោត

+ស្រទាប់នីមួយៗមាននាទី

- ស្រទាប់អេពីឌែមលើ-ក្រោមមាននាទីការពារស្លឹករុក្ខជាតិនិងមានស្ពាន់សម្រាប់បណ្តូរឧស្ម័ន និងទឹក។
- ស្រទាប់ប៉ាលីសាតមានក្លរ៉ូផ្លាសដែលផ្ទុកក្លរ៉ូភីលសម្រាប់ធ្វើរស្មីសំយោគ។
- ស្រទាប់ស្ពោតមានសរសៃស៊ីឡៀម-ដូអែម និងរន្ធខ្យល់។

II. អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាព្រោះ អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមួយចំនួនតូចអាចបង្កើនប្រតិកម្មបានមួយចំនួនធំ។

III. ប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកងនិងសត្វឆ្អឹងកង

*លក្ខណៈដូច្នេះ

- មានប្រព័ន្ធប្រសាទ
- ទទួលព័ត៌មាន និងឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មាន

* លក្ខណៈខុសគ្នា៖

សត្វឥតឆ្អឹងកង	សត្វមានឆ្អឹងកង
- មានសរីរាង្គវិញ្ញាណតិច	-មានសរីរាង្គវិញ្ញាណច្រើន
-ខួរក្បាលមានទំហំតូច	-ខួរក្បាលមានទំហំធំ និង

មានលក្ខណៈ

សុគតស្មាញ

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| -គ្មានអង្គគោលខួរ និងខួរតូចទេ | -មានអង្គគោលខួរខ្លះធំ |
| ខួរខ្លះតូច | |

IV. វិស្វកម្មសេនេទិចជួយដល់រុក្ខជាតិ៖

- ធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិធន់នឹងជម្ងឺ
- ធន់នឹងអាកាសធាតុធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិមានផ្លែផ្កាច្រើនធំៗ
- បង្កើនគុណភាពដីដំណាំ

V. ក្រោយតម្លើងទ្វេម៉ូលេគុល ADN កូនទាំងពីរដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុល ADNមេ ព្រោះនៅពេលស្វ័យតម្លើងទ្វេប្រាក់ទាំងពីរបស់

ADNមេធ្វើជាពុម្ពគំរូ នុយក្លេអូទីតសេរីត់ទៅបំពេញតាមគោល
 ការណ៍បំពេញបាល A-T ,F-G ហេតុដូច្នេះ ម៉ូលេគុល ADNកូន
 ទាំងពីរមានច្រវាក់ម្ខាងជារបស់ADNមេ ច្រវាក់ម្ខាងទៀតកើតថ្មីដែល
 ដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុលADNមេ។

VI. អម្ព័នភ្លេចតែកោសិកាគោលដៅព្រោះ កោសិកាគោលដៅមានផ្ទុក
 នៅលើភ្នាស ដែលផ្ទុកនៅលើភ្នាសកោសិកាគោលដៅមានទម្រង់
 ត្រូវគ្នានឹងអម្ព័នដែលបង្កើតបានជាសារធាតុចម្រុះផ្ទុកអម្ព័ន សារ
 ធាតុនេះហើយដែលធ្វើឱ្យកោសិកាឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើរបស់អម្ព័
 ន។

VII. ក. រកភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗ

បម្រាប់៖ $C=180000$

$\%C=30\%$ នៃនុយក្លេអូទីតសរុប

តាមគោលការណ៍បំពេញបាល

A-t ,C-G នាំឱ្យ $A=T$, $C=G$

$100\%=\%A+\%T+\%C+\%G$

$=\%2A+\%2C$

$\%A=50\%-\%2C$

$\%A=50\%-30\%=20\%$

ដូច្នេះ ភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗមាន

$\%A=\%T=20\%$

$\%C=\%G=30\%$

ខ. រកប្រវែងម៉ូលេគុល ADNជា μm

$$\text{ដោយ } C = \frac{30}{100} \times M$$

$$M = \frac{C \times 100}{30}$$

$$= \frac{180000 \times 100}{30} = 600000$$

$$M = 600000 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដោយ ADN ជាប្រភេទទ្វេហើយពីនុយក្លេអូទីតមួយទៅនុយក្លេអូទីត

មានប្រវែង 0.34 nm

$$\ell = \frac{M}{2} \times 0.34 \text{ nm}$$

$$= \frac{600000}{2} \times 0.34 \text{ nm}$$

$$\ell = 102000 \text{ nm}$$

$$\text{ដោយ } 1 \text{ nm} = 10^3 \mu\text{m}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\ell = 102 \mu\text{m}}$$

គ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប

$$\text{ដោយ } A = \frac{20}{100} \times M$$

$$= \frac{20}{100} \times 600000$$

$$= 120000 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\text{ដោយ } A \text{ ភ្ជាប់ } T \text{ ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន}$$

2 ជាន់

$$\boxed{l = 2448 \cdot 10^{-3} \mu\text{m}}$$

$$C \text{ ភ្ជាប់ } G \text{ ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន } 3 \text{ ជាន់}$$

ចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប

$$(L_H) = 2A + 3C$$

$$= (2 \times 120000) + (3 \times 180000) = 780000 \text{ ស}$$

ម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

ដូចនេះ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប

$$L_H = 780000$$

VIII. ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់សែន

បម្រាប់ $L_{\text{សែន}} = 680 \text{ nm}$

$$2A - 3C = 3G - 2U$$

$$A - U = 600 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

$$C - G = 400 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

ដោយសែនជាច្រវាក់ទ្វេហើយពីនុយក្លេអូទីតមួយទៅនុយក្លេអូទីត

មានប្រវែង $0,34 \text{ nm}$

$$\ell = \frac{M}{2} \times 0,34 \text{ nm}$$

$$\Rightarrow M = \frac{2\ell}{0,34} = \frac{2 \times 680 \text{ nm}}{0,34 \text{ nm}}$$

$$= 4000 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដោយ $2A - 3C = 3G - 2U$

$$2A + 2U = 3G + 3C$$

$$2(A + U) = 3(G + C)$$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម

$$A_{\text{សេន}} = T_{\text{សេន}} = (A+U)_{\text{ARNm}}$$

$$C_{\text{សេន}} = G_{\text{សេន}} = (C+G)_{\text{ARNm}}$$

$$2A+2U=3G+3C$$

$$2(A+U)=3(G+C)$$

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស

$$A-T, C-G \quad \text{នាំឱ្យ } A=T, C=G$$

$$M=A+T+C+G=2A+2C$$

$$M=3C+2C=5C$$

$$\text{នាំឱ្យ } C_{\text{សេន}} = \frac{M}{5} = \frac{4000}{5} = 800 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$A_{\text{សេន}} = \frac{M}{2} - C_{\text{សេន}} \\ = \text{នុយក្លេអូទីត}$$

ដូចនេះ នុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗមាន

$$A=T=1200 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$C=G=800 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់ ARNm

$$\text{ដោយ } A+U=600 \text{ នុយក្លេអូទីត} \quad (1)$$

$$C+G=400 \text{ នុយក្លេអូទីត} \quad (2)$$

$$\text{ហើយ } A+U=1200 \text{ នុយក្លេអូទីត} \quad (3)$$

$$C+G=800 \text{ នុយក្លេអូទីត} \quad (4)$$

តាម (1) និង (3) យើងបាន

$$A-U=600$$

$$\underline{A+U=1200}$$

$$2A = 1800 \quad \text{នាំឱ្យ } A = \frac{1800}{2}$$

$A=900$ នុយក្លេអូទីត

$U=1200-A=1200-900=300$ នុយក្លេអូទីត

តាម (2) និង (4) យើងបាន

$$C-G=400$$

$$\underline{C+G=800}$$

$$2C = 1200 \quad \text{នាំឱ្យ } C = \frac{1200}{2}$$

$C=600$ នុយក្លេអូទីត

$G=800-C=800-600=200$ នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ ARNm មាន

$A=900$ រីបូនុយក្លេអូទីត $C=600$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$U=300$ រីបូនុយក្លេអូទីត $G=200$ រីបូនុយក្លេអូទីត