

ប្រជុំសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាពុទ្ធិយក្សម

សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

- I. តើគេហៅឈ្មោះរបស់អង់ស៊ីមបានត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើកត្តាអ្វីខ្លះ?
- II. តើពោតជាតិក្នុងកូដូណូមីតូសូម ឬឌីកូដូណូមីតូសូម? ហេតុអ្វី?
- III. តើមានបាតុភូតអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលរ៉ីបូសូមលោតដល់កូដុងស្តូប?

IV. តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលឲ្យកើតការរស់ប្រភេទថ្មី? ចូររៀបរាប់។

V. ប្រៀបធៀបក្រពេញអ៊ីចសូត្រីន និងក្រពេញអង់ដូត្រីន។

VI. ក. ដូចម្តេចដែលហៅថាអាំងត្រូប្រសាទ?

ខ. ហេតុអ្វីបានជាពេលដែលមានរបូសដោយវត្ថុមុតស្រួចធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់?

VII. ម៉ូលេគុល ADN មួយមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 16×10^4 ។ នុយក្លេអូទីតប្រភេទ C ច្រើនជាងនុយក្លេអូទីតប្រភេទ A ចំនួនពីរដង។

ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN។

ខ. ពេលម៉ូលេគុល ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេដង តើត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីនីមួយៗចំនួនប៉ុន្មាន?

VIII. ម៉ូលេគុល ARN នាំសាមួយមានសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីត $U = 20\%$ $C = 20\%$ $A = 28\%$ ។

ក. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗនៃអង្គត់ ADN ដែលបានសំយោគម៉ូលេគុល ARN នាំសាខាងលើ។

ខ. តើអង្គត់ ADN នេះមានប្រវែងប៉ុន្មានណាណូម៉ែត (nm) បើ $U = 1800$

ចម្លើយ

I. គេហៅឈ្មោះរបស់អង់ស៊ីមបានត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើនាទីរបស់វា គឺឈ្មោះរបស់អង់ស៊ីមបញ្ចប់ដោយពាក្យ “អាស” (ass) បន្ថែមលើឈ្មោះស៊ីបស្រ្តាត។

II. ពោតជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនពីព្រោះ គ្រាប់វាមានកូទីលេដុងមួយស្លឹកវាមានទ្រនុងស្រប ដើមវាមានបាច់សរសៃរាយប៉ាយ ផ្កាមាន៣ស្រទាប់ឬមេគុណ៣ និងឫសជាឫសស្មៅ។

III. នៅពេលដែលវីរូសូមផ្លាស់ទីដល់កូដុងស្តុប សារធាតុចម្រុះទាំងអស់មាន ARN, វីរូសូមនិងច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីតដែលត្រូវបែកចេញពីគ្នាព្រោះកូដុងមិនត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីនេណាមួយឡើយ ពេលនោះការសំយោគប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយមេកូនីនត្រូវផ្តាច់ចេញពីច្រវាក់ប៉ូលីប៊ីបទីតដែរ។

IV. កត្តាដែលធ្វើឲ្យកើតប្រភេទថ្មីមានពីរគឺ៖

- កត្តាទាំងភូមិសាស្ត្រ៖ ពពួកផ្សេងៗត្រូវបែកចេញពីគ្នា ហើយមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា។ ពពួកទាំងនោះមានលក្ខណៈ

ខុសគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងៗហើយមិនអាចបន្តពូជជាមួយគ្នាបាន
ដូច្នេះក៏ក្លាយជាប្រភេទផ្សេងៗពីគ្នា។

- រចាំងជីវសាស្ត្រ: ឯកត្តៈមានរូបរាង និងទំហំប្រដាប់បន្តពូជខុសគ្នា។ ឯកត្តៈធ្វើការបន្តពូជនៅរដូវនិងខែខុសគ្នា។ ការទាក់ទាញរវាងសត្វញី និងសត្វឈ្មោលដើម្បីធ្វើការបន្តពូជមានរបៀបខុសគ្នា។

V. របៀបរៀបរៀបក្រពេញអ៊ីចសូគ្រីន និងក្រពេញអង់ដូគ្រីន

+ លក្ខណៈដូចគ្នា៖ ជាគោសិការ ឬសរីរាង្គដែលមាននាទីក្នុងការបញ្ចេញសារធាតុដែលចាំបាច់សម្រាប់សារពាង្គកាយ។

+ លក្ខណៈខុសគ្នា៖

ក្រពេញអង់ដូគ្រីន

- គ្មានបំពង់នាំ
- មាននាទីផលិតអរម៉ូន

-មានឥទ្ធិពលទៅលើគោសិកាគោលដៅ

-មានឥទ្ធិពលទៅលើគោសិកាគោលដៅ

-បញ្ចេញអរម៉ូនទៅក្នុងចរន្តឈាមដោយផ្ទាល់

ក្រពេញអ៊ីចសូគ្រីន

- មានបំពង់នាំ
- ផលិតសរំលាយអាហារ សំណល់មេតាបូលីត
- មានអំពើទៅលើសារធាតុណាមួយក្នុងលំហនៃសរីរាង្គឬចេញក្រៅសារពាង្គកាយ

-បញ្ចេញរសតាមបំពង់នាំ

VI. ក. អាំងត្តចប្រសាទជាព័ត៌មានដែលដឹកនាំតាមបណ្តោយភីបប្រសាទ។

ខ. បានជាពេលដែលមានរបួលដោយវត្ថុមុតស្រួត ធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ពីព្រោះឆ្អលវិញ្ញាណឈឺចាប់លាតសន្ធឹងយ៉ាងច្រើនក្នុងស្រទាប់អេ

ពីខ្ទេចគឺរួសទៅនឹងការឈឺចាប់។ គ្រប់សរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនាំដែល ទទួលរំញោចឈឺចាប់បានបញ្ជូនព័ត៌មាននេះទៅកាន់សំបកខួរក្បាល (កំពកចំហៀងនៃខួរក្បាល) ដែលនៅទីនោះត្រូវបានវិភាគ និងបកស្រាយ ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់។

VII. ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN

តាមបម្រាប់ $L=160000$, $C=2A$

ដោយ A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 2

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 3

នាំឲ្យ $L=2A+3C$

$$=2A+3(2A) = 160000$$

$$=8A=160000$$

នាំឲ្យ $A=20000$

$$C=2A=40000$$

តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត A-C, C-G នាំឲ្យ $A=T$, $C=G$

ដូចនេះ: ចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN គឺ

$$A = T = 20000 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$C = G = 40000 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ខ. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបនីមួយៗ

ADN មេ 1 ស្វ័យដំឡើងទ្វេ 1 ដងទទួលបាន ADN កូន 2^1

2 ដងទទួលបាន ADN កូន 2^2

.....

n ដងទទួលបាន ADN កូន 2^n

ដោយ ADN មេមួយស្វ័យដំឡើងទ្វេ 3 ដងទទួលបាន ADN កូន 2^3 ក្នុងនោះមាន ADN មេ 1 និង AND ថ្មី 2^3-1

$$A' = T' = A(2^3 - 1) = 20000 \times 7 = 140000$$

$$C' = G' = C(2^3 - 1) = 40000 \times 7 = 280000$$

ដូចនេះ: ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN គឺ

$$A' = T' = 140000 \text{ នុយក្លេអូទីតសេរី}$$

$$C' = G' = 280000 \text{ នុយក្លេអូទីតសេរី}$$

VIII. ក. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗនៃអង្កត់ ADN តាមបម្រាប់ $U=20\%$, $C=20\%$, $A=28\%$

ដោយ ARN_m មានវីរូសនុយក្លេអូទីត៤ប្រភេទ A, U, C, G ហើយវាជាច្រវាក់ទោល

$$A + U + C + G = 100\%$$

$$G = 100\% - 20\% - 20\% - 28\% = 32\%$$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម និងបំពេញបាន

$$\%A_{\text{ស្រី}} = \%T_{\text{ស្រី}} = \frac{(\%U + \%A)ARN_m}{2} = \frac{28\% + 20\%}{2} = 24\%$$

$$\%C_{\text{ស្រី}} = \%G_{\text{ស្រី}} = \frac{(\%G + \%C)ARN_m}{2} = \frac{20\% + 32\%}{2} = 26\%$$

ដូចនេះ: ភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់អង្កត់ ADN គឺ

$$\%A = \%T = 24\%$$

$$\%C = \%G = 26\%$$

ខ. គណនាប្រវែងអង្កត់ ADN នេះគិតជាណាណូម៉ែត

តាមបម្រាប់ $U=1800$

$$\%U = \frac{U \times 100}{m}$$

នាំឱ្យ $m = \frac{U \times 100}{\%U} = \frac{1800 \times 100}{20} = 9000$

ដោយ ARNm ចម្លងចេញពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន

នាំឱ្យ $M_{\text{សែន}} = 2m = 9000 \times 2 = 18000$

ដោយសែនមានច្រវាក់ទ្វេ ហើយនុយក្លេអូទីតមួយមានប្រវែង $0.34nm$

នាំឱ្យ $l = \frac{M}{2} \times 0.34nm = \frac{18000}{2} \times 0.34 = 3060nm$

ដូចនេះ ប្រវែងអង្កត់ ADN គឺ $l = 3060nm$