

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាពុទ្ធិយក្ខម

សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

១. (៦ពិន្ទុ) ដូចម្តេចហៅថា អាំងក្លូតប្រសាទ? តើអាំងក្លូតប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់យ៉ាងដូចម្តេច?
២. (៨ពិន្ទុ) តើរលកសូរមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកផ្សេងៗនៃត្រចៀកយ៉ាងដូចម្តេច?
៣. (៩ពិន្ទុ) តើវិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលល្អនិងផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់មនុស្ស?
៤. (១០ពិន្ទុ) ចូររកលក្ខណៈខុសគ្នារវាង៖
 - ក. (៦ពិន្ទុ) រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន។
 - ខ. (៤ពិន្ទុ) ការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ។
៥. (១១ពិន្ទុ)
 - ក. (៥ពិន្ទុ) តើអាំងស៊ុយលីនជាអ្វី? បើកង្វះអម៉ូនអាំងស៊ុយលីនបណ្តាលឲ្យមានផលវិបាកអ្វី?
 - ខ. (៦ពិន្ទុ) ចូរបកស្រាយពីរបៀបផលិតអម៉ូនអាំងស៊ុយលីនដោយវិស្វកម្មសេនេទិច?

៦. (១១ពិន្ទុ) ក. (៣ពិន្ទុ) ចូររៀបរាប់ពីតួនាទីរបស់អង់ស៊ីម *ARN* ប៉ូលីមេរ៉ាស។

ខ. (៨ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល *ARNm* មួយមានទំនាក់ទំនងរីបូនុយក្លេអូទីត

$$A = 4U; \frac{G}{C} = \frac{1}{2}; \frac{U}{G} = \frac{1}{5}$$

គណនាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់អង្គត់ *ADN* ដែលកំណត់សំយោគ *ARNm* នេះ។

៧. (២០ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល *ADN* មួយ មាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ

$C = 35\%$ នៃនុយក្លេអូទីតសរុប ហើយនុយក្លេអូទីតប្រភេទ *C* លើសនុយក្លេអូទីតប្រភេទ *A* ចំនួន 4400 ។

ក. (១០ពិន្ទុ) គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ *ADN* ។

ខ. (៤ពិន្ទុ) តើម៉ូលេគុល *ADN* នេះមានប៉ុន្មានជំហាន?

គ. (៦ពិន្ទុ) បើម៉ូលេគុល *ADN* នេះស្វ័យដំឡើងទ្វេដង តើវាត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មាន?

អត្ថប្រយោជន៍

១. -អាំងត្យូចប្រសាទជាព័ត៌មានដែលជារ៉ូនដឹកនាំ។ ឬអាំងត្យូចប្រសាទជាព័ត៌មានដែលដឹងនាំតាមបណ្តោយជីវ៉ូននៅចុងអាក់សូនមានចង់តូចៗជាច្រើនដែលផ្ទុកសារធាតុគីមី (ជីវ៉ូនបញ្ជូនសារ)។ ពេលអាំងត្យូចទៅដល់ចុងអាក់សូនចង់ទាំងនោះផ្ទះបែកហើយបញ្ចេញជីវ៉ូនបញ្ជូនសារសាយឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់។ បន្ទាប់មកជីវ៉ូនបញ្ជូនសារនេះបង្កើតអាំងត្យូចប្រសាទនៅ

ក្នុងដង់ឌ្រីតរបស់ណឺរ៉ូនបន្ទាប់ រួចវាធ្វើដំណើរតាមតួកោសិកា និងចុះក្រោម តាមអាក់សូនរហូតដល់ចុងអាក់សូន។

ឬ នៅពេលអាំងត្តចប្រសាទធ្វើដំណើរទៅដល់ចុងអាក់សូន ចង់តូចៗក៏ផ្ទុះ បែកបញ្ចេញសារធាតុគីមី (ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ) ទៅក្នុងស៊ីណាប់ សារធាតុ គីមីនេះត្រូវបានភ្លេចបង្កើតបានជាអាំងត្តចប្រសាទថ្មីនៅក្នុងដង់ឌ្រីតហើយ បញ្ជូនទៅក្នុងកោសិកាចុះតាមអាក់សូន។

២. រលកសូរមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកផ្សេងៗរបស់ត្រចៀក៖
ត្រចៀកក្រៅ៖ ស្លឹកត្រចៀកប្រមូលផ្តុំរលកសូរ ហើយរន្ធត្រចៀក (បំពងសោត វិញ្ញាណ) ដឹកនាំរលកសូរទៅកាន់ត្រចៀកកណ្តាលដោយឆ្លងកាត់ក្រដាស ត្រចៀក។ ក្រដាសត្រចៀកញ័រ ហើយលំញ័រត្រូវបានឆ្លងកាត់ត្រចៀកតាម ឆ្អឹងតូចៗបី។ ឆ្អឹងទាំងបីញ័របណ្តាលឲ្យភ្នាសបង្ហូរចេញពីពងក្រពើញ័រ។ លំញ័រ នៃភ្នាសនេះធ្វើឲ្យធាតុរាវក្នុងបំពងរាងគូទខ្យងញ័រ ដែលបណ្តាលឲ្យធាមល្អិតៗនៃកោសិកាផ្ទួលក្នុងបំពងនោះញ័រ។ ក្រោយមកកោសិកាផ្ទួលប្តូរលំញ័រ ទៅជាអាំងត្តចប្រសាទ។

៣. វិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលល្អនិងផលអាក្រក់ដល់មនុស្ស៖
+ផលល្អដល់មនុស្ស៖
-ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលៈ ផលិតអាំងស៊ុយលីន អាំងទែផេរ៉ុន អាំងទែឡីគីន អង់ទីប្យូទីច អង់ទីគីរ វ៉ាក់សាំង។

-ក្នុងវិស័យកសិកម្ម: ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិមានផ្កា ផ្លែ ធន់ជំងឺ ធន់នឹងអាកាសធាតុ ធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ និងជួយបង្កើនគុណភាពដី ដំណាំ។

-ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម: ស្បៀង ផលិតអាហារ មានអរម៉ូន ទឹកដោះគោជូរ ប្រម៉ាស ស្រាបៀរ នំប៉័ង
+ផលអាក្រក់ដល់មនុស្ស៖

-គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន: រុក្ខជាតិ (GH) ធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិត ជីវៈ ចម្រុះ សត្វល្អិតធន់នឹងរុក្ខជាតិ (GH) មានសកម្មភាពពុលដូចជារុក្ខជាតិ (GH) ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិឈ្មោះអារមិនអាចផលិតគ្រាប់លម្អងសម្រាប់បន្តពូជ។

-គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព: ផលិតសារធាតុគីមីប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមអង់ទីប្យូ ទិច មិនអាចព្យាបាលជំងឺដែលបណ្តាលមកពីសែនដែលធន់នឹងអង់ទីប្យូទិច។

-គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សីលធម៌និងសង្គម: ធ្វើឲ្យសែនមុយតាស្យុងដែល មានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សណ្តានក្រោយ ប៉ះពាល់សាសនា បែងចែកវណ្ណៈ (មានតែអ្នកមានទើបធ្វើវិស្វកម្មសេនេទិចបាន)។

-គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច: ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិ (GH) ការពារស្របច្បាប់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិ (GH) នោះទេ។ គ្រាប់រុក្ខជាតិមិនអាចតពូជបានទេ គឺត្រូវទិញពូជពីក្រុមហ៊ុនជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

៤. លក្ខណៈខុសគ្នា៖

ក. រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិកូទីលេដូន៖

ម៉ូណូកូទីលេដូន		ឌីកូទីលេដូន
----------------	--	-------------

- គ្រាប់មានកូទីលេដុង១
- ស្លឹកមានទ្រនុងស្រប
- ផ្កាមាន៣ស្រទាប់ឬគុណនឹង៣
- ដើមមានបាច់សរសៃនាំរាយប៉ាយ
- ឫសជាឫសស្នែ

- គ្រាប់មានកូទីលេដុង២
- ស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្ទេង
- ផ្កាមាន៤ស្រទាប់ឬ៥ស្រទាប់
- ដើមមានបាច់សរសៃនៃជារង្វង់
- ឫសជាឫសកែង

ខ. ការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ

ការបង្កាត់ជិត

- ជាការបង្កាត់រវាងសត្វចេញពីមេបា
- ១គូឬរវាងមេបានឹងកូនរបស់វា
- សណ្តានក្រោយមានកម្លាំងជីវិតខ្សោយ លទ្ធភាពបន្តពូជថយចុះ បង្កើតភាពមិនប្រក្រតីនៃក្រមួសូមនាំទៅរកការផុតពូជ
- អាចបង្កើតនិងរក្សានូវពូជសុទ្ធចំពោះលក្ខណៈដែលគេចង់បាន។

ការបង្កាត់ឆ្ងាយ

- ជាការបង្កាត់រវាងពូជខុសគ្នាឬស្រលាយខុសគ្នាឬប្រភេទខុសគ្នា
- អ្វីប្រើមានកម្លាំងជីវិតខ្លាំងធន់នឹងជំងឺ ឆាប់លូតលាស់ល្អ ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់
- អារ មិនអាចបង្កកំណើតបាន (ក្នុងករណីមេបាជាប្រភេទខុសគ្នា)

៥. ក. អាំងស៊ុយលីនជាអម្ព័ន្ធ។

- បើកង្វះអាំងស៊ុយលីនបណ្តាលឲ្យគ្រួសក្នុងឈាមកើនឡើង តម្រងនោមមិនអាចធ្វើឲ្យគ្រួសក្នុងទាំងអស់ជ្រាបចេញវិញបាន ហើយបញ្ចេញ

គុយកូសទៅក្នុងទឹកនោម ធ្វើឲ្យទឹកនោមមានបរិមាណគុយកូសច្រើន បង្កឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម។

ខ. របៀបផលិតអម៉ូនអាំងស៊ុយលីនមាន៤ជំហាន៖

- ជំហានទី១: យកក្រូម៉ូសូម ឬ *ADN* របស់មនុស្សដែលផ្ទុកសែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនចេញពីកោសិកាលំពែងរបស់មនុស្ស។ បន្ទាប់មកកាត់យកសែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនដោយប្រើអង់ស៊ីមកាត់ (អង់ស៊ីមបង្រួម)។
- ជំហានទី២: យកប្លាស្ទីត (*ADN* បាក់តេរី) ចេញពីបាក់តេរីហើយកាត់យកអង្កត់ *ADN* ចេញពីប្លាស្ទីតដោយអង់ស៊ីមបង្រួម។
- ជំហានទី៣: បញ្ចូលសែនរបស់មនុស្សទៅនឹងប្លាស្ទីតរបស់បាក់តេរីដោយប្រើអង់ស៊ីមភ្ជាប់។ រួចយកប្លាស្ទីតនេះបញ្ចូលទៅក្នុងបាក់តេរី។
- ជំហានទី៤: បាក់តេរីបន្តពូជ បង្កើតបានបាក់តេរីច្រើនធ្វើឲ្យសែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនបានកាន់តែច្រើន។ សែននីមួយៗសំយោគប្រូតេអ៊ីនអាំងស៊ុយលីន។

៦. អង់ស៊ីម *ARN* ម៉ូលីមេរ៉ាសមាននាទី៖

- ទទួលស្គាល់សញ្ញាសេនេទិចលើ *ADN* ដែលអាចចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់ការសំយោគ *ARN_m* នៅត្រង់កន្លែងណាមួយជាក់លាក់។
- បើកម៉ូលេគុល *ADN* ដោយផ្តាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនដែលភ្ជាប់ច្រវាក់ទាំងពីររបស់ *ADN* ។

-ធ្វើឲ្យមានប៉ូលីមែកម្មនៃរីបូនុយក្លេអូទីត: រីបូនុយក្លេអូទីតសេរីចូលមក
បំពេញច្រវាក់នុយក្លេអូទីតម្ខាងរបស់អង្គត់ ADN តាមគោលការណ៍
បំពេញបាស (ឬគោលការណ៍ចម្លងក្រុម) $A-U, C-G$ ។

ខ. គណនាសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់អង្គត់

ADN

បម្រាប់ ARN_m មាន:

$$A = 4U$$

$$\frac{G}{C} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{U}{G} = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow G = 5U$$

$$C = 2G = 2 \times 5U = 10U$$

ARN_m ជាច្រវាក់ទោល

$$A + U + C + G = 100\%$$

$$4U + U + 10U + 5U = 100\%$$

$$20U = 100\%$$

$$\Rightarrow U = \frac{100\%}{20\%} = 5\%$$

$$\Rightarrow A = 4 \times 5\% = 20\%$$

$$G = 5 \times 5\% = 25\%$$

$$C = 10 \times 5\% = 50\%$$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម

$$\begin{aligned} \%A_{gen} = \%T_{gen} &= \frac{\%(A + U)_{ARN_m}}{2} \\ &= \frac{20\% + 5\%}{2} = 12.5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \%C_{gen} = \%G_{gen} &= \frac{\%(C + G)_{ARN_m}}{2} \\ &= \frac{50\% + 25\%}{2} = 37.5\% \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\%C = \%G = 37.5\%$

$$\%A = \%T = 12.5\%$$

៧. ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ADN

បម្រាប់ $C = 35\%$

$$C - A = 4400 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

គោលការណ៍បាសបំពេញគ្នា

$$A - T, C - G \Rightarrow A = T, C = G$$

$$A + T + C + G = 100\%$$

$$2A + 2C = 100\%$$

$$A + C = 50\%$$

$$\Rightarrow A = 50\% - 35\%$$

$$A = 15\%$$

$$\text{តាម } C - A = 4400 \text{ នុយ.}$$

$$\frac{35M}{100} - \frac{15M}{100} = 4400$$

$$\frac{20M}{100} = 4400$$

$$\Rightarrow M = \frac{4400 \times 100}{20} = 22000 \text{ នុយក្លេអ៊ូទីត}$$

$$A = \frac{15}{100} \times M = \frac{15}{100} \times 22000$$

$$A = 3300 \text{ នុយក្លេអ៊ូទីត}$$

$$C = \frac{35}{100} \times M = \frac{35 \times 2200}{100}$$

$$C = 7700 \text{ នុយក្លេអ៊ូទីត}$$

$$\text{ដូចនេះ: } A = T = 3300 \text{ នុយក្លេអ៊ូទីត}$$

$$C = G = 7700 \text{ នុយក្លេអ៊ូទីត}$$

ខ. ចំនួនជំហានរបស់ ADN

ដោយ ១ ជំហាន = ១០ គូបាស

$$= 20 \text{ នុយក្លេអ៊ូទីត}$$

$$\Rightarrow \text{ចំនួនជំហាន} = \frac{M}{20} = \frac{2200}{20}$$

$$= 1100 \text{ ជំហាន}$$

ដូចនេះ ADN មាន 1100 ជំហាន

គ. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរី

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ១លើកបាន ADN កូន 2^1

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ១លើកបាន ADN កូន 2^1

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ២លើកបាន ADN កូន 2^2

.....

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ n លើកបាន ADN កូន 2^n

ដោយ ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ៤លើក បាន ADN កូន 2^4

ក្នុងនោះមាន ADN មេមួយ $\Rightarrow ADN$ កើតថ្មី $= 2^4 - 1 = 15$

$$M' = M \times 15$$

$$= 22000 \times 15 = 33.10^4 \text{ នុយក្លេអូទីតសេរី}$$

ដូចនេះ $M' = 33 \times 10^4$ នុយក្លេអូទីតសេរី