

ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាពុទ្ធិយក្ខម

សម័យប្រឡង ១៩ សីហា ២០១៩

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ១៥០នាទី

ពិន្ទុ: ១២៥

(ដកស្រង់ដោយ រៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

១. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x^2 + 2x + 3} - (x + 1)]$

២. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x \sin x}{1 - \cos^2 x}$

៣. $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin x}{\sin^4 x - 1}$

II. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងចង្កោមមានប៉ូល១៦ដែលសរសេរ១ដល់១៦។ គេចាប់យកប៉ូល៣ចេញពីចង្កោមដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

A: "គេចាប់បានប៉ូលទាំងបីសុទ្ធតែមានលេខចែកដាច់នឹង៤"

B: "គេចាប់បានប៉ូលទាំងបីមានលេខសុទ្ធតែមិនអាចចែកដាច់នឹង៥"

C: "គេចាប់បានប៉ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង៤"

III. (១៥ពិន្ទុ) ១. ដោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច C សមីការ

$z^2 - 8z + 64 = 0$ ។

២. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 4 + 4i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 4 - 4i\sqrt{3}$ សរសេរ $(2z_1 + \overline{z_2})$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និងគណនា $(2z_1 + \overline{z_2})^3$ ។
(យើងតាងដោយ $\overline{z_2}$ ជាកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z_2)

IV. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx ; \quad J = \int_0^{\ln 6} (e^x - 1) dx$$

$$K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin^4 x \cos x \right] dx$$

V. (២៥ពិន្ទុ) ១. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1; -1; 4)$, $B(7; -1; -2)$, $C(1; 5; -2)$ ។

ក. គណនាកូអរដោនេរបស់វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}$ ។

ខ. ស្រាយបំភ្លឺថាចំណុច A, B និង C កំណត់បានប្លង់មួយ។

គ. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}(1; 1; 1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។

ឃ. ទាញបង្ហាញសមីការរបស់ប្លង់ (ABC)

២. បង្ហាញថាត្រីកោណ (ABC) ជាត្រីកោណសម័ង្ស។

៣. គេមានប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការទូទៅ $y^2 + 4y - 8x - 12 = 0$ ។ ចូរបម្លែងសមីការនេះជាទម្រង់សមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល។ ចូររកកូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាប់ប្រាប់ទិសរួចសង់ប៉ារ៉ាបូល។

VI. (១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល:

$y'' + 3y' + 3y = 2y' + 5y; (E)$ ។ ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលនេះ។

បង្ហាញថាអនុគមន៍ $y = -e^{-2x} + 2e^x$ ជាចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការ (E) ។

VII. (៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0; +\infty)$ ដោយ

$f(x) = \frac{x^2 - 2}{x} - \ln x$ ។ គេតាង (C) ក្រាបរបស់អនុគមន៍ f នៅ

ក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0; \vec{i}; \vec{j})$ ។

១. ក. បង្ហាញចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $(0; +\infty)$ គេអាចសរសេរ

$f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$ និង $f(x) = \frac{1}{x}(x^2 - x \ln x - 2)$

ខ. ប្រើលទ្ធផលដើម្បីគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ។

២. ក. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ និងបង្ហាញចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $(0; +\infty)$; $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $(x^2 - x + 2)$ ។

ខ. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f រួចសង់តារាងអថេរភាពរបស់វា។

៣. ក. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច A នៅលើ (C) ដែលមានអាប់ស៊ីស 1 ។

ខ. រកកូអរដោនេចំណុច B នៃ (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹង (C) ត្រង់ B ស្របនឹងបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = x$ ។

៤. សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A និងត្រង់ B ។

(គេឲ្យតម្លៃ $\ln 2 \approx 0.7$)

អនុវត្តកំណែ

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

១. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{x^2 + 2x + 3} - (x + 1) \right]$ រាងមិនកំណត់ $+\infty - \infty$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\sqrt{x^2 + 2x + 3} \right)^2 - (x + 1)^2}{\left(\sqrt{x^2 + 2x + 3} \right) + (x + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x + 3 - x^2 - 2x - 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x + 1}$$

$$= 0$$

២. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x \sin x}{1 - \cos^2 x}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x \sin x}{1 - \cos^2 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x \sin x}{\sin^2 x} \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = -2\end{aligned}$$

គ. $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin x}{\sin^4 x - 1}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

$$= \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin x}{(\sin^2 x)^2 - 1^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin x}{(\sin^2 x - 1)(\sin^2 x + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin x}{(\sin x - 1)(\sin x + 1)(\sin^2 x + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\sin x - 1)(\sin^2 x + 1)}$$

$$= \frac{1}{[-1 - 1][(-1)^2 + 1]}$$

$$= \frac{1}{-2 \times 2} = -\frac{1}{4}$$

II. ប៊ូល ១៦ ចុះលេខពី ១ ដល់ ១៦ មានប៊ូល ៤ មានលេខចែកដាច់នឹង ៤ និងមានប៊ូល ១៣ មានលេខមិនអាចចែកដាច់នឹង ៥

គេចាប់ប៊ូល ៣ ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ

$$\text{តាមរូបមន្ត } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$\text{បន្សំ } C(n,r) = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

គេបានចំនួនករណីអាចគឺ

$$\begin{aligned} n(S) &= C(16,3) = \frac{16!}{3!(16-3)!} \\ &= \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13!}{3 \cdot 2 \cdot 13!} = 16 \cdot 5 \cdot 7 \end{aligned}$$

គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A, B, C

A : គេចាប់បានប៊ូល៣ មានលេខចែកដាច់នឹង៤

ប៊ូលមានលេខចែកដាច់នឹង៤ មាន **4,8,12,16**

$$\text{ចំនួនករណីស្រប } n(A) = C(4,3) \frac{4!}{1!3!} = 4$$

$$\text{ដូចនេះ } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{560} = \frac{1}{140}$$

B : គេចាប់បានប៊ូលទាំងបីសុទ្ធតែមានលេខចែកដាច់នឹង៥

ប៊ូលមានលេខចែកដាច់នឹង៥ មាន **5,10,15**

នោះប៊ូលមានលេខមិនចែកដាច់នឹង៥មាន **16-3=13**

$$\text{ចំនួនករណីស្រប } n(B) = C(13,3) \frac{13!}{10!3!} = 286$$

$$\text{ដូចនេះ: } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{286}{560} = \frac{143}{280}$$

C : គេចាប់ប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង៤

$$\text{ចំនួនករណីស្រប } n(C) = C(4,1) \times C(12,2) = 4 \times \frac{12!}{10!2!} = 264$$

$$\text{ដូចនេះ: } P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{264}{560} = \frac{33}{70}$$

$$\text{III. ១. ដោះស្រាយសមីការ : } z^2 - 8z + 64 = 0$$

$$\text{គេបាន } \Delta' = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac = (-4)^2 - 64 = -48 = 16.3i^2$$

$$\text{នោះ: } \sqrt{\Delta'} = 4\sqrt{3}i$$

$$\text{មានឫស } z_1 = \frac{-\frac{b}{2} + \sqrt{\Delta'}}{a} = \frac{-(-4) + 4\sqrt{3}i}{1} = 4 + (4\sqrt{3})i$$

$$z_2 = \frac{-\frac{b}{2} - \sqrt{\Delta'}}{a} = \frac{4 - 4\sqrt{3}i}{1} = 4 - (4\sqrt{3})i$$

២. សរសេរ $(2z_1 + \bar{z}_2)$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 4 + (4\sqrt{3})i; z_2 = 4 - (4\sqrt{3})i$ ជាចំនួនកុំផ្លិច

ឆ្លាស់គ្នា គេបាន $\bar{z}_2 = z_1$ ហើយ

$$\text{គេមាន } \bar{z}_2 = 4 + 4i = z_1$$

$$\text{គេបាន } (2z_1 + \bar{z}_2) = 2z_1 + z_1 = 3z_1$$

$$\begin{aligned}
&= 3(4 + 4\sqrt{3}i) \\
&= 24\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\
&= 24\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)
\end{aligned}$$

ដូច្នេះ: $(2z_1 + \bar{z}_2) = 24\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$

- គណនា $(2z_1 + \bar{z}_2)^3$

$$\begin{aligned}
\text{គេបាន } (2z_1 + \bar{z}_2)^3 &= 24^3\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)^3 \\
&= 24^3\left(\cos 3 \cdot \frac{\pi}{3} + i\sin 3 \cdot \frac{\pi}{3}\right) \\
&= 24(\cos \pi + i\sin \pi) \\
&= 24^3(-1 + 0i) = -24^3
\end{aligned}$$

ដូច្នេះ: $(2z_1 + \bar{z}_2)^3 = -24^3$

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx \\
&= \int_0^1 (x^4 + 2x^2 + 1) dx \\
&= \left(\frac{x^5}{5} + \frac{2}{3}x^3 + x\right)\bigg|_0^1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{1}{5} + \frac{2}{5} + 1 \right) - 0 \\
 &= \frac{28}{15}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 J &= \int_0^{\ln 6} (e^x - 1) dx \\
 &= (e^x - x) \Big|_0^{\ln 6} \\
 &= (e^{\ln 6} - \ln 6) - (e^0 - 0) \\
 &= 6 - \ln 6 - 1 = 5 - \ln 6
 \end{aligned}$$

$$K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\sin \left(3x + \frac{\pi}{4} \right) + \sin^4 x \cos x \right] dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(3x + \frac{\pi}{4} \right)' \sin \left(3x + \frac{\pi}{4} \right) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin x)' \sin^4 x dx \\
 &= \frac{1}{3} \left[-\cos \left(3x + \frac{\pi}{4} \right) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{5} \left[\sin^5 x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\
 &= \frac{1}{3} \left[(-\cos \pi) - \left(-\cos \frac{\pi}{4} \right) \right] + \frac{1}{5} \left(\sin^5 \frac{\pi}{4} - \sin^5 0 \right) \\
 &= \frac{1}{3} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \frac{1}{5} \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^5 - 0 \right]
 \end{aligned}$$

$$= \frac{2+\sqrt{2}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{40} = \frac{40+20\sqrt{2}+3\sqrt{2}}{120}$$

$$= \frac{40+23\sqrt{2}}{120}$$

V. ១. ក.គណនាកូអរដោនេរបស់វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}$

គេបាន $\overrightarrow{AB} = (7-1, -1+1, -2-4) = (6, 0, -6)$

$$\overrightarrow{AC} = (1-1, 5+1, -2-4) = (0, 6, -6)$$

$$\overrightarrow{BC} = (1-7, 5+1, -2+2) = (-6, 6, 0)$$

ខ. បង្ហាញថាចំណុច A, B និង C កំណត់បានប្លង់មួយ

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 6 & 0 & -6 \\ 0 & 6 & -6 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & -6 \\ 6 & -6 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 6 & -6 \\ 0 & -6 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= 36\vec{i} + 36\vec{j} - 35\vec{k} \neq \vec{0}$$

ដូចនេះ A, B និង C រត់មិនត្រង់គ្នាគឺកំណត់បានប្លង់មួយ

គ. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាស់ទៅនឹងប្លង់ (ABC)

យើងមាន $\overrightarrow{AB} \& \overrightarrow{AC}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ ABC

$$\text{តែ } \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = 36\vec{i} + 36\vec{j} - 35\vec{k}$$

$$= 36(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = 36\vec{n} \quad (\text{ព្រោះ } \vec{n} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$$

នាំឲ្យ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ និង $\vec{n} = (1,1,1)$ កូលីនេអ៊ែរ។

ដូចនេះ វ៉ិចទ័រ $\vec{n}(1,1,1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ (ABC)

ឃ. ទាញបង្ហាញសមីការរបស់ប្លង់ (ABC)

$\vec{n} = (1,1,1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ប្លង់ (ABC)

$$\Rightarrow (ABC): x + y + z + d = 0$$

$$\text{តែ } A(1,-1,4) \in (ABC) \Rightarrow 1 + (-1) + 4 + d = 0 \Leftrightarrow d = -4$$

ដូចនេះ សមីការប្លង់នេះគឺ $(ABC): x + y + z - 4 = 0$

២. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស

$$\text{យើងមាន } \overrightarrow{AB} = (6,0,-6) \Rightarrow |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{6^2 + 0^2 + (-6)^2} = 6\sqrt{2}$$

$$\overrightarrow{AC} = (0,6,-6) \Rightarrow |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{0^2 + 6^2 + (-6)^2} = 6\sqrt{2}$$

$$\overrightarrow{BC} = (-6,6,0) \Rightarrow |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{(-6)^2 + 6^2 + 0^2} = 6\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow AB = AC = BC$$

ដូចនេះ ត្រីកោណ ABC ត្រីកោណសម័ង្ស

៣. បម្លែងសមីការនេះជាទម្រង់សមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល

$$\text{យើងមានប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការទូទៅ: } y^2 + 4y - 8x - 12 = 0$$

$$\text{គេបាន } y^2 + 4y + 4 = 8x + 16 \Leftrightarrow (y + 2)^2 = 8(x + 2)$$

ដូចនេះ $(y + 2)^2 = 4 \cdot 2(x + 2)$ ជាទម្រង់ស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល

- រកកូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាប់ប្រាប់ទិស

ប៉ារ៉ាបូល $(y + 2)^2 = 4 \cdot 2(x + 2)$ មានរាង $(y - k)^2 = 4p(x - h)$

ដោយធ្វើមេត្តាសម្រេចការទាំងពីរ គេបាន $h = -2, k = -2, p = 2$

ប៉ារ៉ាបូលនេះមានអ័ក្សឆ្លុះស្របនឹងអ័ក្សអាប៊ីស៊ីស និងមាន៖


$$\text{កូអរដោនេកំពូល } V(h, k) \Rightarrow V(-2, -2)$$

$$\text{កូអរដោនេកំណុំ } F(h + p, k) \Rightarrow F(0, -2)$$

$$\text{សមីការបន្ទាប់ប្រាប់ទិស } \Delta : x = h - p \Leftrightarrow \Delta : x = -4$$

សង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ

x	0	-2	0
y	-6	-2	2



VI. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y'' + 3y' + 3y = 2y' + 5y \quad (E)$

$$\Leftrightarrow y'' + y' - 2y = 0$$

សមីការសម្គាល់នៃ (E) គឺ $r^2 + r - 2 = 0$ មានឫស $r_1 = 1, r_2 = -2$
ដូចនេះចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ $y = Ae^{-2x} + Be^x$, $(A, B$ ថេរ)

- បង្ហាញថាអនុគមន៍ $y = -e^{-2x} + 2e^x$ ជាចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E)

យើងមាន

$$y = -e^{-2x} + 2e^x \Rightarrow y' = -(-2e^{-2x}) + 2e^x = 2e^{-2x} + 2e^x$$

$$\text{និង } y'' = 2(-2e^{-2x}) + 2e^x = -4e^{-2x} + 2e^x$$

នោះ

$$\begin{aligned} y'' + y' - 2y &= (-4e^{-2x} + 2e^x) + (2e^{-2x} + 2e^x) - 2(-e^{-2x} + 2e^x) \\ &= -4e^{-2x} + 2e^x + 2e^{-2x} + 2e^x + 2e^{-2x} - 4e^x \\ &= (-4e^{-2x} + 2e^{-2x} + 2e^{-2x}) + (2e^x + 2e^x - 4e^x) \\ &= 0 \text{ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ } (E) \end{aligned}$$

ដូចនេះ $y = -e^{-2x} + 2e^x$ ជាចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E)

VII. អនុគមន៍ $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x} - \ln x$

១. ក. បង្ហាញថា $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$

$$\begin{aligned}
 \text{គេមាន } f(x) &= \frac{x^2 - 2}{x} - \ln x \\
 &= \frac{x^2}{x} - \frac{2}{x} - \ln x \\
 &= x - \frac{2}{x} - \ln x \\
 &= x - \frac{x \ln x}{x} - \frac{2x}{x^2} \\
 &= x \left(1 - \frac{\ln x}{x} - \frac{2}{x^2} \right) \quad \text{ពិត}
 \end{aligned}$$

- បង្ហាញថា $f(x) = \frac{1}{x}(x^2 - x \ln x - 2)$

$$\begin{aligned}
 \text{គេមាន } f(x) &= \frac{x^2 - 2}{x} - \ln x \\
 &= \frac{x^2 - 2 - x \ln x}{x} \\
 &= \frac{1}{x}(x^2 - x \ln x - 2) \quad \text{ពិត}
 \end{aligned}$$

ខ. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និង ∞

$$\begin{aligned}
 - \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x}(x^2 - x \ln x - 2) \right] \\
 &= \frac{1}{0^+}(0 - 0 - 2) = -\infty \quad \text{ព្រោះ } \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0
 \end{aligned}$$

$$- \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\ln x}{x} - \frac{2}{x^2} \right) = +\infty \text{ ព្រោះ}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

២. ក. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$

$$\text{គេមាន } f(x) = \frac{x^2 - 2}{x} - \ln x = x - \frac{2}{x} - \ln x$$

$$\text{គេបាន } f'(x) = 1 + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - x + 2}{x^2}$$

- បង្ហាញ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $(x^2 - x + 2)$

គេដឹងថា $x^2 > 0$ ជានិច្ចចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $(0, +\infty)$

នោះគេបាន $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $(x^2 - x + 2)$

ខ. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f

គេមាន $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $(x^2 - x + 2)$

បើ $x^2 - x + 2 = 0$ ដែល $a = 1, b = -1, c = 2$

$$\text{មាន } \Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 2 = -7 < 0$$

តែ $a = 1 > 0$ នោះ $x^2 - x + 2 > 0$ នាំឲ្យ $f'(x) > 0$

គេបាន f ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើ $(0; +\infty)$ និងគ្មានតម្លៃបរមាធៀប

ទេ។

- សង់តារាងអថេរភាព f

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		
$f(x)$		$+\infty$

៣. ក. រកសមីការបន្ទាប់ប៉ះក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច

$$\text{រូបមន្ត } y = f'(x_A)(x - x_A) + f(x_A)$$

$$\text{ឬ } y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

$$\text{តែ } f'(1) = \frac{1^2 - 1 + 2}{1^2} = 2 \text{ និង } f(1) = \frac{1^2 - 2}{1} - \ln 1 = -1$$

$$\text{គេបាន } y = 2(x - 1) - 1 = 2x - 3$$

ដូចនេះ បន្ទាប់ប៉ះត្រង់ A គឺ $y = 2x - 3$

ខ. រកកូអរដោនេចំណុច B នៃ (C)

តាង $B(x_B, y_B)$ ជាចំណុចដែលត្រូវរក

សម្មតិកម្ម

- បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ B មានមេគុណប្រាប់ទិស

$$f'(x_B) = \frac{x_B^2 - x_B + 2}{x_B^2}$$

- បន្ទាត់ $y = x$ មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង១

បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ B ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = x$ លុះត្រាតែ $f'(x_B) = 1$

គេបាន $\frac{x_B^2 - x_B + 2}{x_B^2} = 1$ សមមូល $x_B^2 - x_B + 2 = x_B^2$

$$-x_B + 2 = 0 \text{ នាំឱ្យ } x_B = 2$$

និង $y_B = f(x_B) = f(2) = \frac{2^2 - 2}{2} - \ln 2 = 1 - 0.7 = 0.3$

ដូចនេះ $B(2, 0.3)$

សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A និងត្រង់ B

តារាងតម្លៃលេខ

- បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុច A គឺ $y = 2x - 3$

x	0	2
y	-3	-1

- បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុច B

$$y = f'(x_B)(x - x_B) + f(x_B)$$

នោះ $y = 1(x - 2) + 0.3 = x - 1.7$

x	0	2
y	1.7	0.3

