

ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាពុទ្ធិយក្ខម

សម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ១៥០នាទី

ពិន្ទុ: ១២៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. គណនាលីមីត

ក. $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{3x^2 - 11}$ ខ. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3} \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}$

គ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 7 - 11 \ln x)$

II. ក្នុងចង្កោមមានឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន២ ឃ្លីពណ៌ខៀវចំនួន៣ និងឃ្លីពណ៌សចំនួន៤។ គេចាប់យកឃ្លីចំនួន៣ ពីក្នុងចង្កោមដោយចៃដន្យ។

គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A: ឃ្លីទាំង៣ មានពណ៌ស

B: ឃ្លីទាំង៣ មានពណ៌ខុសៗគ្នា

III. ក. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$ ។ រក $\overline{z_1}$; ($\overline{z_1}$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច z_1) ។

ខ. រកម៉ូឌុលនិងអត្ថយម៉ងនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1 ។ សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

គ. បង្ហាញថា $\overline{z_1}$ ជាឫសរបស់សមីការ $z^2 = 2(z\sqrt{2} - 2)$

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_0^1 (3x^2 - 2x + 1) dx$$

$$J = \int_0^1 \left(\frac{e^x}{e^x + 1} \right) dx$$

$$K = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x \cos x) dx$$

V. ១. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណ៉ូម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(0, -2, 0); B(-4, 1, 2); C(0, 3, 7)$ និង $D(4, 0, 5)$ ។ រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}$, និង $\overrightarrow{AD}$ រួចបង្ហាញថាតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណកែង តែមិនមែនជាការ៉េ។

២. គេមានសមីការ $9y^2 = 25(3-x)(3+x)$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះសមីការអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ អ័ក្សតូច កូអរដោនេកំពូលទាំងពីរ និងកូអរដោនេកំណុំទាំងពីរបស់អេលីបនេះ។ សង់អេលីបនេះ។

VI. គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' = -4y$ ។

a. បង្ហាញថា $y: \lambda \cos 2x + \mu \sin 2x$ ដែល λ, μ ជាចំនួនពិត ជាចម្លើយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ។

b. រកចម្លើយពិសេសរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y''(0) = 1$ និង $y'(0) = 0$ ។

VII. គេមានអនុគមន៍ f ដែល $f(x) = x - 2 + \frac{2(x+1)}{e^x}$ ។

យើងតាម (C) ក្រាបរបស់អនុគមន៍ f នៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអត្តណរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$ ។

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។ គណនា

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ និង } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \text{ (យើងដឹងថា } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \text{)}$$

២. បង្ហាញថាបន្ទាត់ D ដែលមានសមីការ $y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ត្រង់ $+\infty$ ។ បញ្ជាក់ទីតាំងនៃក្រាប (C) ធៀបនឹងបន្ទាត់ D

៣. យើងតាង $f'(x)$ ដេរីវេនៃ $f(x)$ ។ បង្ហាញថា $f'(x) \frac{e^x - 2x}{e^x}$ ។

គេដឹងថាគ្រប់ x ធាតុរបស់ $\mathbb{R}; e^x - 2x > 0$ ។ ប្រើលទ្ធផលនេះដើម្បីទាញយកការសិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៤. បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ Δ ទៅនឹង (C) ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស ០ ស្របទៅនឹងបន្ទាត់ D ។ សង់បន្ទាត់ $D; \Delta$ និងក្រាប (C) ។

អត្រាភំណែ

I. គណនាលីមីត

$$\text{ក. } \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{3x^2 - 11} \text{ គេបាន}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{3x^2 - 11} = \sqrt{3 \cdot 3^2 - 11} = \sqrt{16} = 4$$

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{3x^2 - 11} = 4$

ខ. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3} \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}$ មានរាង $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3} \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{\left(\frac{\pi}{3} - x\right)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3} \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{-\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}$$

តាង $u = x - \frac{\pi}{3}$ បើ $x \rightarrow \frac{\pi}{3}$ នោះ $u \rightarrow 0$

គេបាន $\lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{3} \sin u}{u} \right) = -\sqrt{3} \times 1 = -\sqrt{3}$

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3} \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{\left(\frac{\pi}{3} - x\right)} = -\sqrt{3}$

គ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 7 - 11 \ln x)$ មានរាង $\infty - \infty$

គេបាន $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 7 - 11 \ln x)$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(2 - \frac{7}{x} - 11 \frac{\ln x}{x} \right) \right] \\ &= +\infty (2 - 0 - 11 \cdot 0) = +\infty \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 7 - 11 \ln x) = +\infty$$

II. បម្រាប៖ ឃ្លីសរុប៩ ក្រហម២ ខៀវ៣ ស៤ គេចាប់យកឃ្លី៣ពីក្នុងថង់
- រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A "ឃ្លីទាំង៣មានពណ៌ស"

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$$

$$C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}; C(n, 1) = n$$

រកចំនួនករណីអាច

$$n(S) = C(9, 3) = \frac{9!}{(9-3)! \cdot 3!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6!}{6! \times 3 \times 2 \times 1} = 84 \text{ ករណី}$$

រកចំនួនករណីស្រប

$$n(A) = C(4, 3) = \frac{4!}{(4-3)! \cdot 3!} = \frac{3! \times 4}{1! \times 3!} = 4 \text{ ករណី}$$

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{84} = \frac{1}{21}$$

$$\text{ដូចនេះ: } P(A) = \frac{1}{21}$$

- រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B: "ឃ្លីទាំង៣មានពណ៌ខុសៗគ្នា"

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$$

រកចំនួនករណីស្រប

$$n(B) = C(2, 1) \times C(3, 1) \times C(4, 1)$$

$$n(B) = 2 \times 3 \times 4 = 24 \text{ កំណើ}$$

$$\text{គេបាន } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{24}{84} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$$

$$\text{ដូចនេះ: } P(B) = \frac{2}{7}$$

III. ក. រក $\overline{z_1}$

$$\text{គេមាន } z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{2} \text{ នាំឲ្យ } \overline{z_1} = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \overline{z_1} = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$$

ខ. រកម៉ូឌុលនិងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច

$$\text{គេមាន } z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{2} \text{ នាំឲ្យ}$$

$$|z_1| = r = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{4} = 2$$

គេបាន

$$\cos \alpha = \frac{a}{r} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4}$$

$$\sin \alpha = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ដូចនេះ: ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច } z_1 \text{ គឺ } |z_1| = r = 2$$

$$\text{អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច } z_1 \text{ គឺ } \alpha = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$$

សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គេបាន $z_1 = 2(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

ដូចនេះ ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1 គឺ

$$z_1 = 2(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$$

គ. បង្ហាញថា $\overline{z_1}$ ជាឫសរបស់សមីការ $z^2 = 2(z\sqrt{2} - 2)$

យក $\overline{z_1} = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$ ជំនួសក្នុងសមីការ $z^2 = 2(z\sqrt{2} - 2)$

គេបាន

$$(\sqrt{2} - i\sqrt{2})^2 = 2[(\sqrt{2} - i\sqrt{2})\sqrt{2} - 2]$$

$$2 - 4i - 2 = 2[2 - 2i - 2] \text{ ដោយ } i^2 = -1$$

$$\Rightarrow -4i = -4i \text{ ផ្ទៀងផ្ទាត់}$$

ដូចនេះ $\overline{z_1}$ ជាឫសរបស់សមីការ $z^2 = 2(z\sqrt{2} - 2)$

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_0^1 (3x^2 - 2x + 1)dx$$

គេបាន $I = [x^3 - x^2 + x]_0^1$

$$= [1^3 - 1^2 + 1] - (0^3 - 0^2 + 0) = 1$$

ដូចនេះ $I = 1$

$$J = \int_0^1 \left(\frac{e^x}{e^x + 1} \right) dx \quad \text{ឃើញ} \quad d(e^x + 1) = e^x dx$$

$$\text{គេបាន} \quad J = \left[\ln \left| \frac{e^x}{e^x + 1} \right| \right]_0^1 = \ln(e + 1) - \ln 2 = \ln \left(\frac{e + 1}{2} \right)$$

$$\text{ដូចនេះ} \quad J = \ln \left(\frac{e + 1}{2} \right)$$

$$K = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x \cos x) dx$$

$$\text{គេបាន} \quad K = \left[\frac{1}{4} \sin^4 x \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{4} \left[\sin^4 \frac{\pi}{2} - \sin^4 \frac{\pi}{4} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[1^4 - \frac{1}{4} \right] = \frac{3}{16}$$

$$\text{ដូចនេះ} \quad K = \frac{3}{16}$$

V. ១. រកកូអរដោនេរបស់វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}$, និង $\overrightarrow{AD}$

គេមានចំណុច $A(0, -2, 0); B(-4, 1, 2); C(0, 3, 7)$ និង $D(4, 0, 5)$

$$\text{គេបាន} \quad \overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$$

$$= (-4 - 0, 1 + 2, 2 - 0) = (-4, 3, 2)$$

$$\text{គេបាន} \quad \overrightarrow{BC} = (x_C - x_B, y_C - y_B, z_C - z_B)$$

$$= (0 + 4, 3 - 1, 7 - 2) = (4, 2, 5)$$

$$\begin{aligned}\text{គេបាន } \overrightarrow{CD} &= (x_D - x_C, y_D - y_C, z_D - z_C) \\ &= (4 - 0, 0 - 3, 5 - 7) = (4, -3, -2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{គេបាន } \overrightarrow{AD} &= (x_D - x_A, y_D - y_A, z_D - z_A) \\ &= (4 - 0, 0 + 2, 5 - 0) = (4, 2, 5)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ដូចនេះ: } \overrightarrow{AB} &= (-4, 3, 2), \overrightarrow{BC} = (4, 2, 5) \\ \overrightarrow{CD} &= (4, -3, -2), \overrightarrow{AD} = (4, 2, 5)\end{aligned}$$

បង្ហាញថា ចតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណកែងតែមិនជាការេ

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD} \text{ ព្រោះ } \frac{-4}{4} = \frac{3}{-3} = \frac{2}{-2}$$

$$\begin{aligned}\text{គេបាន } \overrightarrow{AB} &= \sqrt{(-4)^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{29} \\ \overrightarrow{CD} &= \sqrt{(4)^2 + (-3)^2 + (-2)^2} = \sqrt{29}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{គេបាន } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} &= -4 \cdot 4 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 5 = -16 + 6 + 10 = 0 \\ &\Rightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD}\end{aligned}$$

ក្នុងចតុកោណ $ABCD$ មាន $AB \parallel CD, AB = CD$ និង $AB \perp AD$

គេថា ចតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណកែង តែមិនមែនជាការេព្រោះ

$$AB \neq AD \quad (|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 5^2} = \sqrt{45})$$

ដូចនេះ ចតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណកែង តែមិនមែនជាការេ

២. បង្ហាញថាសមីការ $9y^2 = 25(3-x)(3+x)$ ជាអេលីប

$$\text{គេបាន } 9y^2 = 25(9 - x^2) \Leftrightarrow 9y^2 = 225 - 25x^2$$

$$9y^2 + 25x^2 = 225 \Rightarrow \frac{9y^2}{225} + \frac{25x^2}{225} = 1$$

គេបាន $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ ជាសមីការអេលីបមានអ័ក្សធំឈរ

ដូចនេះ សមីការ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ ជាទម្រង់ស្តង់ដារអេលីបមានអ័ក្សធំឈរ

រកប្រវែងអ័ក្សធំនិងប្រវែងអ័ក្សតូច កំពូល កំណុំអេលីប

$$\text{ដោយ } \frac{(x-0)^2}{3^2} + \frac{(y-0)^2}{5^2} = 1$$

គេបាន $h=0, k=0, a=5, b=3$

$$c^2 = a^2 - b^2 \Leftrightarrow c^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4$$

គេបាន ប្រវែងអ័ក្សធំគឺ $2a = 2 \times 5 = 10$ ឯកតា

ប្រវែងអ័ក្សតូចគឺ $2b = 2 \times 3 = 6$ ឯកតា

កំពូល $V_1 = (0, 0-5); V_2 = (0, 0+5)$

កំណុំ $F_1 = (0, 0-4); F_2 = (0, 0+4)$

ដូចនេះ អេលីបមាន


ប្រវែងអ័ក្សធំគឺ $2a = 10$ ឯកតាប្រវែង

ប្រវែងអ័ក្សតូចគឺ $2b = 6$ ឯកតាប្រវែង

កំពូល $V_1 = (0, -5); V_2 = (0, 5)$

កំណុំ $F_1 = (0, -4); F_2 = (0, 4)$

សង់ក្រាបអេលីប ផ្ចិត $O(0,0)$ កំពូល $v_1(0,-5); v_2(0,5); b=3$



VI. a. បង្ហាញថា $y = \lambda \cos 2x + \mu \sin 2x$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ

$$(E): y'' = -4y$$

$$\text{គេបាន } y = \lambda \cos 2x + \mu \sin 2x$$

$$y' = -2\lambda \sin 2x + 2\mu \cos 2x$$

$$y'' = -4\lambda \sin 2x - 4\mu \cos 2x$$

យក y និង y'' ផ្ទៀងផ្ទាត់ (E)

$$-4\lambda \cos 2x - 4\mu \sin 2x = -4\lambda \cos 2x - 4\mu \sin 2x \quad \text{ពិត}$$

ដូចនេះ $y = \lambda \cos 2x + \mu \sin 2x$ ជាចម្លើយសមីការ (E)

b. រកចម្លើយពិសេសរបស់សមីការ (E)

$$\text{ដោយស្គាល់ } y''(0) = 1, y'(0) = 0$$

$$\text{គេមាន } y'' = -4\lambda \cos 2x - 4\mu \sin 2x$$

$$y''(0) = -4\lambda \cos 0 - 4\mu \sin 0$$

$$y''(0) = -4\lambda \cdot 1 - 4\mu \cdot 0 = -4\lambda$$

ប្រាប់ $y''(0) = 1$

$$\Rightarrow -4\lambda = 1 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{4}$$

គេបាន $y' = -2\lambda \sin 2x + 2\mu \cos 2x$

$$y'(0) = -2\lambda \sin 0 + 2\mu \cos 0$$

$$y'(0) = -2\lambda \cdot 0 + 2\mu \cdot 1$$

គេបាន $y = \lambda \cos 2x + \mu \sin 2x$

ទៅជា $y = -\frac{1}{4} \cos 2x + 0 \sin 2x$

$$y = -\frac{1}{4} \cos 2x$$

ដូចនេះ អនុគមន៍ $y = -\frac{1}{4} \cos 2x$ ជាចម្លើយពិសេសនៃសមីការ (E)

VII. ១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$

គេមាន $f(x) = x - 2 + \frac{2(x+1)}{e^x}$

អនុគមន៍ $f(x)$ កាលណា $e^2 \neq 0$ ពិតគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ព្រោះ

$$e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

ដូចនេះ ដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$

- គណនា $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

គេបាន $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - 2 + \frac{2(x+1)}{e^x} \right] = +\infty$ ព្រោះ

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(x+1)}{e^x} = 0$$

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

• គណនា $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

គេបាន $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x - 2 + \frac{2(x+1)}{e^x} \right]$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x - 2 + e^{-x} \cdot 2(x+1) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} \left[\frac{x}{e^{-x}} - \frac{2}{e^{-x}} + 2(x+1) \right]$$

$$= +\infty[0 - 0 + (-\infty)] = -\infty$$

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

២. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $D: y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)

ខាង $+\infty$

គេមាន $(C): y = f(x) = \left[x - 2 + \frac{2(x+1)}{e^x} \right]$

ដោយ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(x+1)}{e^x} = 0$

នាំឲ្យ $D: y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ខាង $+\infty$

ដូចនេះ បន្ទាត់ $D: y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ខាង $+\infty$

បញ្ជាក់ទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់ D និង (C)

គេមាន $(C): y = f(x) = x - 2 + \frac{2(x+1)}{e^x}$

$D: y = g(x) = x - 2$

គេបាន $f(x) - g(x) = x - 2 + \frac{2(x+1)}{e^x} - (x - 2)$

$f(x) - g(x) = \frac{2(x+1)}{e^x}$ ដោយ $e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

ហេតុនេះសញ្ញារបស់ $f(x) - g(x)$ ដូចសញ្ញារបស់កន្សោម $(x+1)$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x) - g(x)$	$-$	0	$+$

- បើ $x < -1 \Rightarrow f(x) - g(x) < 0$

គេបាន $f(x) < g(x)$ នោះ (C) ស្ថិតក្រោម D

- បើ $x = -1 \Rightarrow f(x) - g(x) = 0$

គេបាន $f(x) = g(x)$ នោះ (C) កាត់ D

- បើ $x > -1 \Rightarrow f(x) - g(x) > 0$

គេបាន $f(x) > g(x)$ នោះ (C) ស្ថិតលើ D

ដូចនេះ: - បើ $x < -1$ ក្រាប (C) ស្ថិតក្រោម D

- បើ $x = -1$ ក្រាប (C) កាត់ D

- បើ $x > -1$ ក្រាប (C) ស្ថិតលើ D

៣. បង្ហាញថា $f'(x) = \frac{e^x - 2x}{e^x}$

គេបាន $f(x) = x - 2 + \frac{2(x+1)}{e^x}$

$$f'(x) = 1 - 0 + 2 \left[\frac{(x+1)' \cdot e^x - e^x(x+1)}{(e^x)^2} \right]$$

$$f'(x) = 1 + \frac{2[e^x - e^x(x+1)]}{(e^x)^2} = 1 + \frac{2(-xe^x)}{e^{2x}}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{2x}{e^x} = \frac{e^x - 2x}{e^x}$$

ដូចនេះ $f'(x) = \frac{e^x - 2x}{e^x}$

ប្រើលទ្ធផលខាងលើទាញយកការសិក្សាអថេរភាពនៃ $f(x)$

គេដឹងថា $e^x - 2x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

គេបាន $f'(x) = \frac{e^x - 2x}{e^x} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

គេថា $f(x)$ ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ច

តារាងអថេរភាព

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

៤. បង្ហាញថា បន្ទាត់ Δ ប៉ះ (C) ត្រង់ $x_o = 0$ ស្រប D

គេបាន $y' = f'(x) = \frac{e^x - 2x}{e^x}$

ចំពោះ $x_o = 0 \Rightarrow y'_o = f'(0) = \frac{e^0 - 2 \cdot 0}{e^0} = 1$

$$\Delta: y - y_o = y'_o(x - x_o)$$

$$\Delta: y = x, D: y = x - 2$$

គេថា Δ ស្រប $a_\Delta = a_D = 1$

ដូចនេះ បន្ទាត់ Δ ស្រប D

សង់ក្រាប $\Delta, D, (C)$

តារាងតម្លៃលេខ

- ចំពោះ $\Delta: y = x$

x	0	1
y	0	1

- ចំពោះ $D: y = x$

x	0	2
y	-2	0

- ចំពោះ (C): $y = f(x) = x - 2 + \frac{2(x+1)}{e^x}$

x	-1	0	1
y	-3	0	$-1 + \frac{4}{e}$

