

ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាពុទ្ធិយក្ខម

សម័យប្រឡង ០៥ ធ្នូ ២០២២

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ១៥០នាទី

ពិន្ទុ: ១២៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គឹមឈីរ)

ប្រធាន

I. (១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

ក. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 1}{2e^x}$

ខ. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1}$

គ. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3}(\frac{\pi}{3}-x)}{\sin(x-\frac{\pi}{3})}$

II. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល

ក. $I = \int_0^1 (2 - x + 2x^2) dx$ ខ. $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\cos 4x - \cos 2x}{2} \right) dx$

គ. គេមាន $f(x) = \frac{x^2-1}{2x-1}$ បង្ហាញថា $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4(2x-1)}$

គណនា $K = \int_{-1}^0 f(x) dx$

III. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = i(3 + 2i)(2 + i)^2$

a. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ពីជគណិតរួចមក $\overline{z_1}$ រកជាចំនួនកុំផ្លិច
ផ្លាស់នៃ z_1 ។

b. សរសេរ $z_2 = z_1 + 19$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ គណនា
 z_2^4, z_2^6 ។

IV. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងមណ្ឌលសុខភាពមួយមានបុគ្គលិកនារី ១ នាក់ និងបុគ្គលិកបុរស ៥ នាក់។ គេរៀបចំជាក្រុមការងារមួយក្រុមគ្នា ៤ នាក់ដោយចៃដន្យឱ្យចុះតាមភូមិ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A: ក្រុមការងារដែលរៀបចំមានបុគ្គលិកទាំង ៤ នាក់សុទ្ធតែនារី

B: ក្រុមការងារដែលរៀបចំមានបុគ្គលិក ៥០% ជានារី

V. (២៥ពិន្ទុ) 1. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច

$$M(0, 1, 1); N(1, 2, 2); P(0, 3, -4); Q(-2, 1, 0)$$

a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{NP}, \overrightarrow{NQ}, \overrightarrow{PQ}$ និងប្រវែងវ៉ិចទ័រទាំងបួននេះ។

b. បង្ហាញថាត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q និងរកផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណនេះ។

2. រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ប៉ារ៉ាបូលដែល មានសមីការ $(y + 2)^2 = -8(x - 2)$ ។ សង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ ។

VI. (៤០ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y' + y = 2(x + 1)e^{-x}$

1. បង្ហាញថាអនុគមន៍ y_0 កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ

$y_0(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E)

2. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E') = y' + y = 0$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $y(0) = e$ ។

VII. (៤០ពិន្ទុ) A. គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = x - \ln(1+x)$ ។ យើងតាងដោយ (C) ក្រាបរបស់ f ។

1. រកដែនកំណត់ D នៃអនុគមន៍ f ។ គណនា $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ។

2. សិក្សាអថេរភាពរបស់អនុគមន៍ $f(x)$ ដោយភ្ជាប់រាងអថេរភាពនៅលើ D និងបញ្ជាក់សញ្ញានៃ $f(x)$ លើ D ។

B. គេចង់សិក្សាទីតាំងរបស់ក្រាប (C) នៃ f ធៀបទៅនឹងក្រាប (P) ដែលមានសមីការ $y = \frac{1}{2}x^2$ ។

1. ក្នុងន័យនេះគេបង្កើតអនុគមន៍ g កំណត់លើ D ដែនកំណត់របស់ f ដោយ $g(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $g(x)$ រួចទាញយកសញ្ញានៃ g កាលណា x រត់នៅលើ D ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប (C) ធៀបនឹងក្រាប (P) ។
2. សង់ក្រាប (C) និងក្រាប (P) ក្នុងតម្រុយអ័រតូណូម៉ាល់ (o, i, j) ។

អេក្រង់កំណែ

I. គណនាលីមីត

$$\text{ក. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 1}{2e^x} = \frac{e^0 + 1}{2e^0} = \frac{1+1}{2} = 1$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 1}{2e^x} = 1$$

$$\text{ខ. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1} \text{ រាង } \frac{0}{0}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1} \times \frac{\sqrt{x+3}+2}{\sqrt{x+3}+2} \times \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}^2 - 2^2}{\sqrt{x}^2 - 1^2} \times \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3-4}{x-1} \times \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x-1} \times \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{គ. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)} \text{ រាង } \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-\sqrt{3}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}$$

$$\text{តាង } t = x - \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = t + \frac{\pi}{3}$$

$$\text{បើ } x \rightarrow \frac{\pi}{3} \text{ នោះ } t \rightarrow 0$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{3} \sin t}{t} \right) = 1(-\sqrt{3}) \times 1 = -\sqrt{3} \quad \left(\text{រូបមន្ត } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1 \right)$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)} = -\sqrt{3}$$

របៀបមួយទៀត

យើងមាន $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}{\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}$

តាង $t = x - \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = t + \frac{\pi}{3}$

បើ $x \rightarrow \frac{\pi}{3}$ នោះ $t \rightarrow 0$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3} - \left(t + \frac{\pi}{3}\right)\right)}{\sin(t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3} - t - \frac{\pi}{3}\right)}{\sin(t)} = \lim_{t \rightarrow 0} -\frac{\sqrt{3}(t)}{\sin(t)} = -\sqrt{3}$$

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}{\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)} = -\sqrt{3}$

រៀបចំបញ្ហាទៀត

យើងមាន $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}{\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-\sqrt{3}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)} = 1(-\sqrt{3}) = -\sqrt{3}$ (ឬប្រើ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$)

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}{\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)} = -\sqrt{3}$

II. គណនាអាំងតេក្រាល

ក. $I = \int_0^1 (2 - x + 2x^2) dx = \left[2x - \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3} \right]_0^1 = \left(2 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \right) - 0 = \left(\frac{12-3+4}{6} \right) = \frac{13}{6}$

ដូចនេះ $I = \int_0^1 (2 - x + 2x^2) dx = \frac{13}{6}$

ខ. $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\cos 4x - \cos 2x}{2} \right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\cos 4x}{2} - \frac{\cos 2x}{2} \right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\cos 4x}{4 \times 2} - \frac{2 \cos 2x}{2 \times 2} \right) dx$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{(\sin 4x)'}{8} - \frac{(\sin 2x)'}{4} \right) dx = \left[\frac{\sin 4x}{8} - \frac{\sin 2x}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \left(\frac{\sin\left(4 \times \frac{\pi}{4}\right)}{8} - \frac{\sin\left(2 \times \frac{\pi}{4}\right)}{4} \right) - \left(\frac{\sin 0}{8} - \frac{\sin 0}{4} \right)$
 $= \left(\frac{\sin(\pi)}{8} - \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{4} \right) - 0 = -\frac{0}{8} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$

ដូច្នេះ $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\cos 4x - \cos 2x}{2} \right) dx = -\frac{1}{4}$

គ. $K = \int_{-1}^0 f(x) dx$

របៀបទី១

បង្ហាញថា $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4(2x-1)}$

យើងមាន $f(x) = \frac{x^2-1}{2x-1}$

តារាងចែកពហុធា

$$\begin{array}{r|l} x^2 + 0x - 1 & 2x - 1 \\ - x^2 - \frac{x}{2} & \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \\ \hline \frac{x}{2} - 1 & \\ - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} & \\ \hline 0 - 1 + \frac{1}{4} & = -\frac{3}{4} \end{array}$$

នាំឲ្យ $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4(2x-1)}$

យើងបាន $K = \int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4(2x-1)} \right) dx = \int_{-1}^0 \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{2 \times 3}{2 \times 4(2x-1)} \right) dx$
 $= \int_{-1}^0 \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3(2x-1)}{8(2x-1)} \right) dx = \left[\left(\frac{x^2}{4} + \frac{x}{4} - \frac{3}{8} \ln|2x-1| \right) \right]_{-1}^0$
 $= \left(\frac{0}{4} + \frac{0}{4} - \frac{3}{8} \ln|-1| \right) - \left(\frac{-1}{4} + \frac{-1}{4} - \frac{3}{8} \ln|-2-1| \right) = \ln|-1| - \left(-\frac{3}{8} \ln 3 \right) = \frac{3}{8} \ln 3$

ដូច្នេះ $K = \frac{3}{8} \ln 3$

របៀបទី២

$$\begin{aligned}\text{យើងមាន } f(x) &= \frac{x^2-1}{2x-1} = \frac{4(x^2-1)}{4(2x-1)} = \frac{4x^2-4}{4(2x-1)} = \frac{4x^2-2x+2x-1-3}{4(2x-1)} \\ &= \frac{4(x^2-1)}{4(2x-1)} + \frac{2x-1}{4(2x-1)} - \frac{3}{4(2x-1)} = \frac{2x(2x-1)}{4(2x-1)} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4(2x-1)} = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4(2x-1)} \\ \text{នាំឲ្យ } f(x) &= \frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4(2x-1)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } K &= \int_{-1}^0 f(x)dx = \int_{-1}^0 \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4(2x-1)} \right) dx = \int_{-1}^0 \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{2 \times 3}{2 \times 4(2x-1)} \right) dx \\ &= \int_{-1}^0 \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3(2x-1)}{8(2x-1)} \right) dx = \left[\left(\frac{x^2}{4} + \frac{x}{4} - \frac{3}{8} \ln|2x-1| \right) \right]_{-1}^0 \\ &= \left(\frac{0}{4} + \frac{0}{4} - \frac{3}{8} \ln|-1| \right) - \left(\frac{-1}{4} - \frac{-1}{4} - \frac{3}{8} \ln|-2-1| \right) = \ln|-1| - \left(-\frac{3}{8} \ln 3 \right) = \frac{3}{8} \ln 3\end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } K = \frac{3}{8} \ln 3$$

III. a. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ពីជគណិតរួចមករក $\overline{z_1}$ រកជាចំនួនកុំផ្លិច
ស្របនៃ z_1

$$\text{យើងមាន } z_1 = i(3+2i)(2+i)^2$$

$$\begin{aligned}\text{នាំឲ្យ } z_1 &= (3i+2)(4+4i-1) = (3i-2)(3+4i) \\ &= 9i-6-12-8i = -18+i\end{aligned}$$

ដោយ $\overline{z_1}$ ជាចំនួនកុំផ្លិចស្របនៃ z_1

$$\text{នាំឲ្យ } \overline{z_1} = -18-i$$

$$\text{ដូចនេះ: } z_1 = -18+i \text{ និង } \overline{z_1} = -18-i$$

b. សរសេរ $z_2 = z_1 + 19$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ គណនា z_2^4, z_2^6

$$\text{យើងមាន } z_2 = z_1 + 19 = -18+i+19 = 1+i$$

$$\text{យើងបាន } |z_2| = \sqrt{2}$$

$$\text{នាំឲ្យ } z_2 = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

- z_2^4

$$\text{នាំឱ្យ } z_2^4 = \left[\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \right]^4$$

$$= 4 \left(\cos\left(\frac{4\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{4}\right) \right) = 4(\cos\pi + i \sin\pi)$$

$$= 4(-1 + 0) = -4$$

- z_2^6

$$\text{នាំឱ្យ } z_2^6 = \left[\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \right]^6$$

$$= 8 \left(\cos\left(\frac{6\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{6\pi}{4}\right) \right)$$

$$= 8 \left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \right)$$

$$= 8 \left(\cos\left(\pi + \frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\pi + \frac{\pi}{2}\right) \right)$$

$$= 8 \left(-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) = 8(0 - i) = -8i$$

$$\text{ដូចនេះ: } z_2 = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right), z_2^4 = -4, z_2^6 = -8i$$

IV. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម

យើងមាន ក្នុងមណ្ឌលសុខភាពមួយមានបុគ្គលិកនារី ៩នាក់និង
បុគ្គលិកបុរស ៥នាក់។

គេរៀបចំ ជាក្រុមការងារមួយក្រុមមានគ្នា ៤នាក់ដោយចៃដន្យឱ្យ
ចុះធ្វើការតាមភូមិ។

$$\text{យើងបាន } n(S) = C(14, 4) = \frac{14!}{10!4!} = \frac{14 \times 13 \times 12 \times 11}{4 \times 3 \times 2 \times 1}$$

$$= 11 \times 7 \times 13 = 1001 \text{ ករណី}$$

A: ក្រុមការងារដែលរៀបចំមានបុគ្គលិកទាំង ៤ នាក់សុទ្ធតែជានារី

$$\text{យើងបាន } n(A) = C(9, 4) = \frac{9!}{5!4!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1}$$

$$= 9 \times 2 \times 7 = 126 \text{ ករណី}$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{126}{1001} = \frac{18}{143}$$

$$\text{ដូចនេះ: } P(A) = \frac{18}{143}$$

B: ក្រុមការងារដែលរៀបចំមានបុគ្គលិក 50% ជានារី

$$\text{យើងបាន } n(B) = C(9, 2) \times C(5, 2) = \frac{9!}{7!4!} \times \frac{5!}{3!2!}$$

$$= \frac{9 \times 8}{2} \times \frac{5 \times 4}{2} = 360 \text{ ករណី}$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{360}{1001}$$

$$\text{ដូចនេះ: } P(B) = \frac{360}{1001}$$

V. 1. a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{NP}, \overrightarrow{NQ}, \overrightarrow{PQ}$ និងប្រវែងវ៉ិចទ័រទាំងបួននេះ។

$$\text{យើងមាន } M(0, 1, 1); N(1, 2, 2); P(0, 3, -4); Q(-2, 1, 0)$$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{MN} = (1 - 0, 2 - 1, 2 - 1) = (1, 1, 1)$$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{NP} = (0 - 1, 3 - 2, -4 - 2) = (-1, 1, -6)$$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{NQ} = (-2 - 1, 1 - 2, 0 - 2) = (-3, -1, -2)$$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{PQ} = (-2 - 0, 1 - 3, 0 + 4) = (-2, -2, 4)$$

$$\text{គេបាន } |\overrightarrow{MN}| = \sqrt{(1)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \text{ (ឯកតាប្រវែង)}$$

$$|\overrightarrow{NP}| = \sqrt{(-1)^2 + (1)^2 + (-6)^2} = \sqrt{38} \text{ (ឯកតាប្រវែង)}$$

$$|\overrightarrow{NQ}| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{14} \text{ (ឯកតាប្រវែង)}$$

$$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + (4)^2} = \sqrt{24} \text{ (ឯកតាប្រវែង)}$$

ដូចនេះ: $\overrightarrow{MN} = (1, 1, 1)$

$$\overrightarrow{NP} = (1, 1, -6)$$

$$\overrightarrow{NQ} = (-3, -1, -2)$$

$$\overrightarrow{PQ} = (-2, -2, 4)$$

$$|\overrightarrow{MN}| = \sqrt{3} \text{ (ឯកតាប្រវែង)}$$

$$|\overrightarrow{NP}| = \sqrt{38} \text{ (ឯកតាប្រវែង)}$$

$$|\overrightarrow{NQ}| = \sqrt{14} \text{ (ឯកតាប្រវែង)}$$

$$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{24} \text{ (ឯកតាប្រវែង)}$$

b. បង្ហាញថាត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q និងរកផ្ទៃក្រឡា
របស់ត្រីកោណនេះ

រៀបចំទី១

យើងមានត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q

$$\text{លុះត្រាតែ } |\overrightarrow{PQ}|^2 + |\overrightarrow{NQ}|^2 = |\overrightarrow{NP}|^2$$

$$\text{យើងមាន } |\overrightarrow{PQ}|^2 + |\overrightarrow{NQ}|^2 = |\overrightarrow{NP}|^2 \Leftrightarrow \sqrt{24}^2 + \sqrt{14}^2 = \sqrt{38}^2 \Leftrightarrow 24 + 14 = 38 \Leftrightarrow 38 = 38 \text{ ពិត}$$

ដូចនេះត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q

រៀបចំទី២

យើងមាន ត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q

$$\text{លុះត្រាតែ } \overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{QN} = 0$$

$$\text{យើងមាន } \overrightarrow{PQ} = (-2, -2, 4) \Rightarrow \overrightarrow{QP} = (2, 2, -4)$$

$$\overrightarrow{NQ} = (-3, -1, -2) \Rightarrow \overrightarrow{QN} = (3, 1, 2)$$

$$\text{យើងបាន } \overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{QN} = (2)(3) + (2)(1) + (-4)(2) = 6 + 2 - 8 = 0 \text{ ពិត}$$

ដូចនេះត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q

+ រកផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណ NPQ

របៀបទី១

$$\text{យើងមាន } \overrightarrow{NP} = (-1, 1, -6) \text{ និង } \overrightarrow{NQ} = (-3, -1, -2)$$

$$\text{យើងបាន } \overrightarrow{NP} \times \overrightarrow{NQ} =$$

$$\begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & -6 \\ -3 & -1 & -2 \end{bmatrix} = (-2-6)\vec{i} - (2-18)\vec{j} + (1+3)\vec{k} = -8\vec{i} + 16\vec{j} + 4\vec{k}$$

$$\text{យើងបាន } |\overrightarrow{NP} \times \overrightarrow{NQ}| = \sqrt{(-8)^2 + (16)^2 + (4)^2} = \sqrt{64 + 256 + 16} = \sqrt{336} = 4\sqrt{21}$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } S_{\Delta NPQ} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{NP} \times \overrightarrow{NQ}| = \frac{4\sqrt{21}}{2} = 2\sqrt{21} \text{ (ឯកតាផ្ទៃ)}$$

$$\text{ដូចនេះ } S_{\Delta NPQ} = 2\sqrt{21} \text{ (ឯកតាផ្ទៃ)}$$

របៀបទី២

$$\text{យើងមាន } |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{24} \text{ (ឯកតាប្រវែង)}, |\overrightarrow{NQ}| = \sqrt{14} \text{ (ឯកតាប្រវែង)}$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } S_{\Delta NPQ} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ}| \times |\overrightarrow{NQ}| = \frac{1}{2} (\sqrt{24} \times \sqrt{14})$$

$$= \frac{\sqrt{336}}{2} = \frac{4\sqrt{21}}{2} = 2\sqrt{21} \text{ (ឯកតាផ្ទៃ)}$$

ដូចនេះ $S_{\Delta NPQ} = 2\sqrt{21}$ (ឯកតាផ្ទៃ)

2. រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ប៉ារ៉ាបូល

យើងមានសមីការ $(y + 2)^2 = -8(x - 2)$ (1)

ប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សឆ្លុះដេកមានសមីការ $(y + k)^2 = 4p(x - h)$ (2)

ធ្វើម (1) និង (2) $\Rightarrow h = 2, k = -2$

$$4p = -8 \Rightarrow p = -2$$


យើងមាន $V(h, k) \Rightarrow (2, -2)$

យើងមាន $F(h + p, k) \Rightarrow F(0, -2)$

យើងមានសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមានសមីការ $x = h - k$

$$\Rightarrow x = 2 + 2 = 4$$

ដូចនេះ $V(2, -2), F(0, -2)$, សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមានសមីការ $x = 4$



VI. 1. បង្ហាញថាអនុគមន៍ y_0 កំណត់លើ R ដោយ

$$y_0(x) = (x^2 + 2x)e^{-x} \text{ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E)}$$

យើងមាន (E): $y' + y = (x^2 + 2x)e^{-x}$

បើ y_0 ជាឫសនៃសមីការ (E): $y' + y = (x^2 + 2x)e^{-x}$ លុះត្រាតែ

$$y'_0 + y_0 = 2(x + 1)e^{-x}$$

យើងមាន $y_0 = (x^2 + 2x)e^{-x}$

$$\begin{aligned} \text{នាំឱ្យ } y'_0 &= [(x^2 + 2x)e^{-x}]' = (2x + 2)e^{-x} - e^{-x}(x^2 + 2x) \\ &= e^{-x}(2x + 2 - x^2 - 2x) = e^{-x}(2 - x^2) \end{aligned}$$

យើងបាន

$$\begin{aligned} y'_0 + y_0 &= (x^2 + 2x)e^{-x} \Leftrightarrow e^{-x}(2 - x^2) + (x^2 + 2x)e^{-x} \\ &= 2(x + 1)e^{-x} \end{aligned}$$

$$\text{នាំឱ្យ } e^{-x}(2 - x^2 + x^2 + 2x) = 2(x + 1)e^{-x} \Leftrightarrow e^{-x}(2 + 2x) = 2(x + 1)e^{-x}$$

$$\text{នាំឱ្យ } 2(x + 1)e^{-x} = 2(x + 1)e^{-x} \text{ ពិត}$$

ដូចនេះ $y_0(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E)

2. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E): $y' + y = 0$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់

$$y(0) = e$$

របៀបទី១ (របៀបដោះស្រាយតាមរូបមន្ត)

យើងមាន (E): $y' + y = 0$

យើងបាន $y = Ae^{-x}$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E')

$$\text{នាំឱ្យ } y(0) = Ae^0 = A$$

តែ $y(0) = e$

នាំឲ្យ $A = e$

យើងបាន $y = e \times e^{-x} = e^{1-x}$

ដូចនេះ $y = e^{1-x}$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល(E')

របៀបទី២ (របៀបដោះស្រាយតាមអាំងតេក្រាល)

យើងមាន (E): $y' + y = 0$

យើងបាន $y' + y = 0 \Leftrightarrow y' = -y \Leftrightarrow \frac{y'}{y} = -1 \Leftrightarrow \int \frac{y'}{y} dx = \int -1 dx$

នាំឲ្យ $\ln|y| = -x + c \Leftrightarrow |y| = e^{-x+c} \Leftrightarrow y = \pm e^{-x+c} \Leftrightarrow y = \pm e^c \times e^{-x}$

តាង $A = \pm e^c \Rightarrow y = Ae^{-x}$

តែ $y(0) = e$

នាំឲ្យ $A = e$

យើងបាន $y = e \times e^{-x} = e^{1-x}$

ដូចនេះ $y = e^{1-x}$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល(E')

VII. A 1. រកដែនកំណត់ D នៃអនុគមន៍ $f \quad \forall \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

យើងមាន $f(x) = x - \ln(1 + x)$

$f(x)$ កំណត់បានកាលណា $1 + x > 0$ នាំឲ្យ $x > -1$

យើងបាន $D = (-1, +\infty)$

គណនាលីមីត

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x - \ln(1+x)) = 1 - \ln(0^+) = 1 - (-\infty) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln(1+x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right) = +\infty(1-0) = +\infty$$

ដូច្នេះ:

$$D = (-1, +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

២. សិក្សាអថេរភាពរបស់អនុគមន៍ $f(x)$ ដោយភ្ជាប់តារាងអថេរភាពនៅលើ D និងបញ្ជាក់សញ្ញា $f(x)$ លើ D

យើងមាន $f(x) = x - \ln(1+x)$

$$\text{នាំឲ្យ } f'(x) = (x - \ln(1+x))' = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{1+x-1}{1+x} = \frac{x}{1+x}$$

ដោយ $1+x > 0, \forall x \in D$

នាំឲ្យ $f'(x)$ កំណត់តាម x

$$\text{បើ } f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$

យើងមាន $f(0) = 0$

តារាងសញ្ញា $f'(x)$

x	-1^+	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

នាំឱ្យ $f(x)$ ចុះចន្លោះ $(-1, 0)$

$f(x)$ កើនចន្លោះ $(0, +\infty)$

$f(x)$ អតិបរមាត្រង់ $x = 0$

តារាងអថេរភាព

x	-1^+	0	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{array}{c} - \\ \\ 0 \\ \\ + \end{array}$	
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

B. 1. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ g និងទាញយកសញ្ញានៃ $g(x)$ កាលណា x រត់នៅលើ D

យើងមាន $g(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$

នាំអោយ $g(x) = x - \ln(1+x) - \frac{x^2}{2}$

យើងបាន $g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} - x = \frac{1+x-1-x^2-x}{1+x} = \frac{-x^2}{1+x}$

ដោយ $1+x > 0, \forall x \in D$

នាំអោយ $g'(x)$ កំណត់តាម $-x^2$

បើ $g'(x) = 0$ នាំឱ្យ $-x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$

យើងមាន $g(0) = 0$

តារាងអថេរភាពនៃ g

x	-1^+	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	$\uparrow$	$-$
$g(x)$	$\nearrow$	0	$\searrow$

យើងបាន $g(x) > 0, \forall x \in (-1, 0)$

$$g(x) < 0, \forall x \in (0, +\infty)$$

$$g(x) = 0 \text{ ត្រង់ } x = 0$$

សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប(C) ធៀននឹងក្រាប(P)

យើងមាន(C): $f(x) = x - \ln(1+x)$ និង(P): $y = \frac{1}{2}x^2$

$$\text{នាំឱ្យ } f(x) - y = x - \ln(1+x) - \frac{1}{2}x^2$$

$$\text{តែ } g(x) = -\ln(1+x) - \frac{1}{2}x^2$$

$$\text{នាំឱ្យ } f(x) - y = g(x)$$

យើងបាន $f(x) - y > 0, \forall x \in (-1, 0)$

នាំឱ្យក្រាប (C) នៅលើក្រាប(P) $\forall x \in (-1, 0)$

យើងបាន $f(x) - y < 0, \forall x \in (0, +\infty)$

នាំឱ្យក្រាប(C) នៅក្រោមក្រាប(P) $\forall x \in (0, +\infty)$

យើងបាន $f(x) - y = 0$ ត្រង់ $x = 0$

នាំឱ្យក្រាប(C) កាត់ក្រាប(P) ត្រង់ $x = 0$

ដូចនេះ ក្រាប(C) នៅលើក្រាប(P) $\forall x \in (-1, 0)$

ក្រាប(C) នៅក្រោមក្រាប(P) $\forall x \in (0, +\infty)$

ក្រាប(C) កាត់ក្រាប(P) ត្រង់ $x = 0$

2. សង់ក្រាបនិងក្រាបក្នុងតម្រុយអវលាម៉ាល់ (o, i, j)

(P): $y = \frac{1}{2}x^2$

x	-1	0	1
y	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$

