

Relatório

August 2, 2026

Resultados

Resultados para o fit global usando limites de integração $q \in [0, 30]$ e $b \in [0, 30]$

	Ensemble A	Ensemble T
$m_g(\text{GeV})$	0.780 ± 0.023	0.937 ± 0.026
ϵ	0.098 ± 0.004	0.132 ± 0.004
$a_1 (\text{GeV}^{-2})$	1.324 ± 0.026	1.171 ± 0.017
FCN	15.27	90.44
χ^2/dof	0.2	0.5

Table 1: Resultados dos ajustes para os ensembles A e T para o modelo $m_{log}(q^2)$

	Ensemble A	Ensemble T
$m_g(\text{GeV})$	0.942 ± 0.027	1.130 ± 0.034
ϵ	0.098 ± 0.004	0.132 ± 0.004
$a_1 (\text{GeV}^{-2})$	1.368 ± 0.026	1.208 ± 0.018
FCN	16.32	92.84
χ^2/dof	0.2	0.5

Table 2: Resultados dos ajustes para os ensembles A e T para o modelo $m_{pl}(q^2)$.




Figure 1: Resultados eiconalizados com fit global até $q^2 = 0.1$ para o *ensemble* ATLAS




Figure 2: Resultados eiconalizados com fit global até $q^2 = 0.1$ para o *ensemble* TOTEM




Figure 3: Resultados eiconalizados com fit global para $\sqrt{s}=7, 8$ e 13 TeV para o *ensemble* ATLAS




Figure 4: Resultados eiconalizados com fit global para $\sqrt{s}=7, 8$ e 13 TeV para o *ensemble* TOTEM