

2024 矩阵论期末考试参考答案

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1-5. DBBAB

6-10. CCDBB

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

(1). 10

(2). $\beta_1 + 2\beta_2$

(3). 100

(4). 8

(5). $\sqrt{5}$

(6). e^{11}

(7). $x+1$

(8). λ

(9).
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(10).
$$\begin{bmatrix} 4t(1+t^2) & 2t+1 \\ 0 & 2t \end{bmatrix}$$

三、计算题（8 分）

在 $F[x]_n$ 中定义内积 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$ ，求

(1) 内积在基 $\varepsilon_1 = 1, \varepsilon_2 = x, \varepsilon_3 = x^2$ 下的矩阵；

(2) 求 $f(x) = -15x^2 - 3x + 6$ 与 $g(x) = x^2 + 2x - 1$ 的内积。

解 (1) $a_{11} = \int_{-1}^1 dx = 2, a_{12} = a_{21} = \int_{-1}^1 x dx = 0, a_{13} = a_{31} = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3},$

$$a_{22} = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, a_{23} = a_{32} = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0, a_{33} = \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5},$$

所以内积在基 $1, x, x^2$ 下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{bmatrix};$ 5 分

(2) 方法 1 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 -15x^4 + 15x^2 - 6dx = -8;$

方法 2 因为 $f(x), g(x)$ 在基 $1, x, x^2$ 下的坐标分别为 $\tilde{f} = [6, -3, -15]^T,$

$$\tilde{g} = [-1, 2, 1]^T, \text{ 从而 } (f, g) = \tilde{f}^T A \tilde{g} = [6, -3, -15] \begin{bmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = -8.$$

..... 8 分

四、计算题（8 分）设 $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ ，求矩阵 A 的最小多项式

$$m_A(x).$$

解 令 $A = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{bmatrix}$ ，其中 $A_1 = A_2 = [5]$ ， $A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

$$m_{A_1}(x) = m_{A_2}(x) = x - 5, \text{3 分}$$

对 $\lambda E - A_3$ 施行初等行变换得

$$\lambda E - A_3 = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -2 & \lambda + 1 & -2 \\ 1 & 0 & \lambda + 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda + 1 & \\ & & (\lambda + 1)^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{因此, } m_{A_3}(x) = (x + 1)^2; \text{6 分}$$

$$m_A(x) \text{ 为 } m_{A_1}(x), m_{A_2}(x), m_{A_3}(x) \text{ 的最小公倍式, } m_A(x) = (x - 5)(x + 1)^2$$

.....8 分

五、计算题（8 分）

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ，求矩阵 A 的谱分解。

解 由 $|\lambda E - A| = 0$ 解出矩阵 A 的为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3, \text{3 分}$

解出它们对应的特征向量分别为

$$\alpha_1 = [1 \ 1 \ 1]^T, \quad \alpha_2 = [1 \ 0 \ -1]^T, \quad \alpha_3 = [1 \ -2 \ 1]^T$$

单位化得

$$\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}[1 \ 1 \ 1]^T, \quad \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1 \ 0 \ -1]^T, \quad \xi_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}[1 \ -2 \ 1]^T \text{6 分}$$

令

$$H_1 = \xi_1 \xi_1^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad H_2 = \xi_2 \xi_2^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad H_3 = \xi_3 \xi_3^T = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix},$$

则矩阵 A 的谱分解为 $A = 0H_1 + 1H_2 + 3H_3$ 。8 分

六、计算题 (8 分)

$$\text{已知 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

(1) 求可逆阵 T , 若当型矩阵 J , 使 $T^{-1}AT = J$ 成立,

(2) 求矩阵 A 的函数 $f(A)$ 和 $\sin\left(\frac{\pi}{4}A\right)$.

解 由 $|\lambda E - A| = 0$ 解出矩阵 A 的特征值分别为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$,

易知特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的几何重数为 1, 因此矩阵 A 的若当型矩阵

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{2 分}$$

令 $T = [t_1 \ t_2 \ t_3]$, 若使 $T^{-1}AT = J$ 成立,

$$\text{即 } A[t_1 \ t_2 \ t_3] = [t_1 \ t_2 \ t_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

从而 $At_1 = t_1, At_2 = 2t_2, At_3 = t_2 + 2t_3$,

解得 $t_1 = [1 \ 0 \ 0]^T, t_2 = [3 \ 0 \ 1]^T, t_3 = [-3 \ 1 \ 0]^T$,

$$\text{则 } T = [t_1 \quad t_2 \quad t_3] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ 为所求,} \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} f(A) &= Tf(J)T^{-1} = T \begin{bmatrix} f(1) & 0 & 0 \\ 0 & f(2) & f'(2) \\ 0 & 0 & f(2) \end{bmatrix} T^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} f(1) & 3f(1) + 3f'(2) - 3f(2) & -3f(1) + 3f(2) \\ 0 & f(2) & 0 \\ 0 & f'(2) & f(2) \end{bmatrix} \\ \sin\left(\frac{\pi}{4}A\right) &= \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & 3\sqrt{2}/2 - 3 & 3 - 3\sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \dots\dots 8 \text{ 分} \end{aligned}$$

七、证明题（8分）

设 V_1, V_2, \dots, V_s 是线性空间 V 的 s 个非平凡子空间, 证明 V 中至少有一向量 α 不属于 V_1, V_2, \dots, V_s 中的任何一个。

证: 对子空间的个数 s 进行数学归纳。当 $s=1$ 时, $V_1 \neq V$ 结论成立;

假设命题对 $m-1$ 个子空间成立, 若 V_1, V_2, \dots, V_{m-1} 均为 V 的真子空间, 则

$$\bigcup_{i=1}^{m-1} V_i \neq V;$$

再看对 m 个子空间的情况, 由归纳假设 $\exists \alpha \notin \bigcup_{i=1}^{m-1} V_i$,

若 $\alpha \notin V_m$ 此时命题成立, 下面设 $\alpha \in V_m$;

由 $V_m \neq V$ 则 $\exists \beta \in V, \beta \notin V_m$; 若 $\beta \notin \bigcup_{i=1}^{m-1} V_i$ 此时命题成立, 下面设 $\beta \in \bigcup_{i=1}^{m-1} V_i$;

考察集合 $W = \{\alpha + \beta, 2\alpha + \beta, \dots, m\alpha + \beta\}$ 中的 m 个元素, 均不属于 V_m ;

而每个 V_i ($i=1, 2, \dots, m-1$) 中包含 W 中元素不多于 1 个(若不然, V_i 中有 2 个 W

中元素, 其差 $(k_1\alpha + \beta) - (k_2\alpha + \beta) = (k_1 - k_2)\alpha \in V_i$, 与 $\alpha \notin \bigcup_{i=1}^{m-1} V_i$ 矛盾);

综上， w 中有某个元素既不属于 v_m 也不属于 $\bigcup_{i=1}^{m-1} v_i$ ；命题对 m 个子空间成立。

由数学归纳法，对一切自然数 s ，命题成立。