Diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.com

{ }

4,5 6.5

ψ phi ∈ L2(**R**)
[0,T0].

kan2=Phi||2 = 1,
∫ +∞
(t) = 0.
-

L2(**R**)
kan.kan g ∈ L2(**R**)
kangkan2=+∞ |g (t) |2dt
ψ phi

J0
ψj phij ψ phi j≥ J0

ψj(t) = 2j /2(2jt)
phij(t) = 2j /2(2jt).

978-1-5090-1990-8 / 16 / $ 31,00 © 2016 IEEE

ψj phij [0,T2j]
j ψj, k phij, k
ψj phij


ψj, k(t) = ψj(t -2jkT0) 2j /2(2jt
= - kT0), Phij(t -2jkT0
phij, k(t) =) 2j /2(2jt - kT0).
=

ψj, k phij, k

$[\frac{kT_0}{2^j}, \frac{(k+1)T_0}{2^j}]$ j[[J0, J -1]] k[[0, 2j-1]]

{Phij0,k}k=20−1 ∪DARI1 j = J 0 {ψj, k} k =2 j k =0 ,

J



(ψj, k)j[[J0, DARI1],k[[0.2j1]]
(Phij0, k)k[[0.2j01]]

L = J - J0
J0
L
L
Cn M
CM N 2J0 CM N
2J0 (sebuahJ0, k)k[[0.2J01]]
2J0
(wJ0, k)k[[0.2J01]] J0
2J0+1
2J0+1 Cn

$$x(t) = \sum_{n}\sum_{j=J_0}^{J-1}\sum_{k=0}^{2^j-1} w_{j,k}\psi_{j,k}(t - nT_0) + \sum_{n}\sum_{k=0}^{2^{J_0}-1} sebuah_{J_0,k}phi_{J_0,k}(t - nT_0).$$

- wj, k k
  j
- sebuahj0, k k
  J0
- ψj, k phij0, k

j = J -1
Cn M =8

M 2J
ψ0,0 phi0,0
j 2j

J0 2J0

- J0=0
  L =3
  Cn n T0


  Cn = {C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8}
  = {sebuah0,0, w0,0, w1.0, w1.1, w2.0, w2.1, w2.2, w2.3.}

J0

- J0 = 1 L =2
  Cn n T0

  Cn = {C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8}
  = {sebuah1.0, sebuah1.1, w1.0, w1.1, w2.0, w2.1, w2.2, w2.3.}


J0 J =3





J_0=0 J_0=1

M =128 10^6

4







4

16

L

L

j

L

J_0=J -1

= 10^3

4 16

4,5 3

c 4

16

j


M		128
S		100
		0: 5: 25 0: 5: 35
n		100000
F		15
J_0		J -1 = 6


10^3 6.5


4

16

= 25








sebuah$_{j,k}$ $w_{j,k}$


g h K

g K

$$\sum_{j=J0+1} 2^j K \leq \sum_{j=1} 2^j K = 2MK.$$

tidak									





O (MK)

O (blog$_2$(M))

O ($\frac{K}{catatan_2(M)}$)

K M

6.5 10^3 4,5

8

40%