Hausübung SDA Chocolate

Dozent: Dr. Matthias Templ ZHAW IDP

Autoren: Phillip Rieser & Pascal Simon Bühler Wi17t 23-4-2021 ZH

Zweck der Übung

Diese Aufgabe hat zum Zweck einen Artikel etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und auf Stimmigkeit zu überprüfen, dazu werden die im Artikel getroffenen Aussagen basierend auf der zugrundeliegenden Studie analysiert.

Schoko Milch gegen normale Sportgetränke

Andy Chesire beschreibt in einem Artikel vom 22 August 2017 die Resultate einer Studie von der Universität Texas at Austin über den Unterschied von post-training verabreichten Schokoladenmilch und normalen Sportgetränken.

Herr Chesire erklärt:

Die Athleten, die Schokoladenmilch tranken, drückten im Durchschnitt 3,5% mehr als vorher auf der Hantelbank, während die Sportler, die das kommerzielle Sportgetränk tranken, ihre Kraft beim Bankdrücken um etwa 3,2% verringerten. Das ist ein Nettounterschied von 6,7% für diejenigen, die Schokoladenmilch im Vergleich zu einem kommerziellen Sportgetränk tranken.

Beide Gruppen zeigten eine Verbesserung bei Kniebeugen, aber die Schokomilch-Trinker zeigten mehr, sie hoben 15% mehr Gewicht als vorher - während die kommerziellen Sportgetränketrinker nur 8% mehr hoben. Das ist fast **doppelt** so viel Kraftzuwachs bei den Schokomilch-Trinkern. $_1$

Weiter beschreibt Herr Chesire dass der Unterschied von normalen Sportgetränken darin besteht, dass dem Sportgetränk das Protein fehle wobei Milch zwei Arten von hochwertigem Protein enthält Kasein und Molkeprotein. Weiter wird wird beschrieben, dass Milch pro Unze (28.35g) jeweils ein gramm Protein enthält welches in Kombination mit den Kohlenhydraten aus der Schokomilch ein ideales Verhätnis zur Muskelerholung enthält. $_2$

Weiter wird gesagt dass Schokomilch ein kostengünstiges Getränk ist zur Rehydration, Auffüllen der glykämischen Speicher und dem Muskelaufbau. Weitere Studien könnten herausfinden, wie andere Faktoren die UT-Ergebnisse beeinflusst haben - Dinge wie die Technik oder die Lebensmittel, die die Sportler zu Hause essen. Die Studie unterstützt jedoch Schokoladenmilch als Regenerationsergänzung für Jugendliche, die an intensivem Training teilnehmen, so dass wir sie dem wachsenden Stapel von Forschungsergebnissen über die Erholung mit Schokoladenmilch für alle hinzufügen können. 2

Desweiteren ist die Studie verlinkt.

₁ Original aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt (Chesire n.d.) ₂ Sinngemäss aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt (Chesire n.d.)

Informationen zur Studie und dem Artikel

Die Studie (Katelyn A. Born and Bartholomew 2019) wurde an der University of Texas at Austin USA durchgeführt und ist finanziert von Diary Max einem Verband von Milchprodukte Vertretern. Der Artikel (Chesire n.d.) ist auf der Website von Dairy Max erschienen und wurde von Andy Chesire welcher ebenfalls an der Studie beteiligt war, geschrieben.

Beschreibung der Studie

103 heranwachsenden Athleten (Frauen und Männer) wurden während eines 5 wöchigen Sommer Trainingsprogramm entweder CM oder CHO direkt nach dem Training verabreicht. in der ersten Woche sowie in der letzen Woche wurden Kraft und Ausdauertests durchgeführt.

Auswahlrahmen Stichprobendesign

	All subjects ($N = 103$)	Male varsity subjects ($n = 43$)	Male JV subjects ($n = 30$)	Female subjects ($n = 30$)	
Age in years (Mean ± SD)	15.3 ± 1.2	16.2 ± 0.93	14.3 ± 0.55	14.90 ± 1.2	
Weight in kg (Mean \pm SD)	73.4 ± 18.6	83.9 ± 18.0	66.6 ± 14.4	65.2 ± 15.9	
Height in cm (Mean ± SD)	172.3 ± 8.9	177.6 ± 5.6	170.7 ± 9.3	165.7 ± 7.7	
Race n (%)					
African American or Black	39 (37.9)	22 (51.2)	5 (16.7)	18 (60)	
White	33 (32)	6 (14)	15 (50)	6 (20)	
Asian	2 (1.9)	1 (2.3)	1 (3.3)	1 (3.3)	
Other	24 (27.4)	13 (30)	9 (30)	5 (16.3)	
Ethnicity n (%)					
Hispanic or Latino	26 (25.2)	6 (14)	16 (53.3)	7 (23.3)	
Not Hispanic or Latino	75 (72.8)	36 (83.7)	13 (43.3)	23 (76.7)	
Sex n (%)					
Male	73 (70.9)	43 (100)	30 (100)	0 (0)	
Female	30 (29.1)	0 (0)	0 (0)	30 (100)	

Figure 1: Subjects

Resultate

-unterschiede in den Stichproben selbst CHO - CM mehr als $10~\mathrm{kg}$ unterschied vorher, trainings effekt nicht linear

⁻fehlende werte? 131 teilnehmer aber nur 103 komplettiert

	Overall	CM Mean ± SD	CHO Mean ± SD	Main effect				Interaction	
	Mean ± SD			F (df)	<i>p</i> -value	ES	F(df)	p-value	ES
Body wei	ght (kg)								
Pre	73.3 ± 18.5	70.3 ± 16.7	76.8 ± 19.8	3.34 (1, 101)	0.07	0.03	0.49 (1, 101)	0.43	0.01
Post	74.4 ± 18.8	71.0 ± 16.6	77.4 ± 20.3						
Composit	te Strength Score (kg)							
Pre	173.6 ± 81.9	166.8 ± 73.5	179.7 ± 89.5	11.09 (1, 49)	0.002	0.18	4.3 (1, 49)	0.04	0.08
Post	185.8 ± 80.2	187.3 ± 75.6	184.5 ± 85.5						
Bench pre	ess (kg)								
Pre	73.1 ± 32.5	71.8 ± 31.8	74.5 ± 33.7	.01 (1, 79)	0.94	<.001	5.01 (1,79)	0.03	0.06
Post	73.3 ± 31.2	74.3 ± 29.4	72.2 ± 33.5						
Squat (kg))								
Pre	104.4 ± 51.2	100.1 ± 43.1	108.5 ± 58.2	14.5 (1, 56)	<.001	0.21	1.07 (1, 56)	0.31	0.002
Post	116.2 ± 50.8	115.2 ± 46.6	117.1 ± 55.1						

Abbreviations: CHO Carbohydrate drink, CM Chocolate Milk drink, SD Standard deviation, kg Kilogram

Figure 2: Results

References

Chesire, Andy. n.d. "NEW Research: CHOCOLATE Milk Vs. REGULAR Sports Drink." Accessed August 22, 2017. https://www.dairydiscoveryzone.com/blog/new-research-chocolate-milk-vs-regular-sports-drink.

Katelyn A. Born, P. Andy Cheshire, Erin E. Dooley, and John B. Bartholomew. 2019. *Chocolate Milk Versus Carbohydrate Supplements in Adolescent Athletes: A Field Based Study*. online: Born et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition.