

习题一

1[单选题]

根据世界卫生组织的报告，全球平均每多少时间就有一人死于交通事故？

- A、三天 B、三十秒 C、三分钟 D、三小时

参考答案：B、

2[单选题]

世界上哪个国家死于交通事故的人数占世界首位？

- A、印度 B、巴西 C、南非 D、中国

参考答案：D、

3[单选题]

“黄金4分钟”的含义是：

- A、救护现场在事发最初4分钟的进行急救时间
B、急救人员赶到现场的时间
C、事故后最佳的求救时间
D、意外伤害的死亡时间

参考答案：A、

4[单选题]

世界急救日是哪一天：

- A、每年5月12日
B、每年5月的第三个周日
C、每年7月的第四个周六
D、每年9月的第二个周六

参考答案：D、

5[单选题]

西方发达国家在人群聚集处一般配置何种普通人应用的急救器械？

- A、AED（自动除颤仪）
B、简易呼吸机
C、心脏起搏器
D、助听器

参考答案：A、

6[单选题]

本课程的教学内容特点：

- A、最简单的救助方法
B、普通人能够掌握并实施的急救技能
C、需要掌握简单的医学知识就能学习
D、只需要具有简单的医疗专用设备就能实施的急救技能

参考答案：B、

7[单选题]

课程包括了下列哪些内容：

- A、包扎止血
- B、应力性骨折的治疗
- C、颅脑外伤的紧急治疗
- D、中毒的紧急药物治疗

参考答案：A、

8[单选题]

外伤救助的教学内容包括：

- A、缝合 B、拆线 C、换药 D、打结

参考答案：C、

9[单选题]

家庭护理的教学内容包括：

- A、口腔护理 B、褥疮护理 C、新生儿护理 D、紧急补液疗法

参考答案：D、

10[单选题]

重病防治的教学内容包括：

- A、心肌梗死的抢救
- B、农药中毒的洗胃
- C、中风的溶栓治疗
- D、中毒的应对

参考答案：D、

11[单选题]

生命教育课程的重点：

- A、心理健康
- B、吸毒干预
- C、自杀干预
- D、急救知识普及

参考答案：A、

12[单选题]

本课程的宗旨：

- A、提高关键时刻的生存率
- B、给学习者普及急救医学知识
- C、提高学习者的急救技能
- D、以上都是

参考答案：D、

13[单选题]

本课程的教学方法：

A、视频观摩 B、在线作业练习 C、实践训练 D、以上都是
参考答案：D、

14[单选题]

本课程的评分方法：

- A、每次面授实践考勤均计入课程成绩
- B、网上在线作业习题计入课程总分
- C、学生自己任选的一项操作实践考试占成绩比重最大
- D、以上都是

参考答案：D、

15[单选题]

网络互动的意义：

- A、可以建立自己的讨论群
- B、可以提出自己的疑惑
- C、交流自己的心得和感悟
- D、以上都是

参考答案：D、

习题二

1[单选题]

以下哪项不属于急救现场止血技术？

- A、压迫包扎法
- B、直接按压止血法
- C、填塞法
- D、“八”字缝合止血法

参考答案：D、

2[单选题]

以下哪项不属于急救现场止血技术？

- A、加垫屈肢止血法
- B、嵌夹法
- C、连续缝合止血法
- D、止血带止血法

参考答案：C、

3[单选题]

以下哪些材料不可以用来急救现场止血？

- A、洁净的毛巾
- B、污染的辅料
- C、洁净的手绢
- D、干净的三角巾

参考答案：B、

4[单选题]

以下哪类伤员应优先处理？

- A、惊恐不安者
- B、有活动性出血者
- C、四肢骨折者
- D、呼吸心跳停止者

参考答案：D、

5[单选题]

手指出血，压迫止血的位置是：

- A、手指的两侧
- B、手指的前后
- C、手指的伤口上
- D、手腕处

参考答案：A、

6[单选题]

以下哪个不是经常使用的包扎材料：

- A、绷带
- B、三角巾
- C、四角巾
- D、四头带

参考答案：C、

7[单选题]

关于头部包扎，以下哪项是错误的：

- A、用无菌敷料或洁净布料压迫止血
- B、耳、鼻漏液时，应该堵塞耳道和鼻孔
- C、用尼龙网套固定敷料包扎

D、耳、鼻漏液提示颅底骨折可能

参考答案：B、

8[单选题]

关于异物扎入，以下哪项是错误的：

A、应立即拔除异物

B、应将大块敷料支撑异物

C、用绷带固定敷料以控制出血

D、避免移动

参考答案：A、

9[单选题]

关于伤口包扎的原则，以下哪项是错误的：

A、注意个人防护

B、常规在伤口上使用消毒剂或消炎粉

C、不对嵌有异物或骨折短端外露的伤口直接包扎

D、绷带勿缠绕手指、足趾末端，除非有损伤

参考答案：B、

10[单选题]

加压包扎止血时以下哪项是错误的：

A、开放性骨折伴出血时，不可将骨折的断端回纳

B、加压包扎时，不要包扎的太紧

C、加压包扎时打结的结头应打在伤口上

D、加压包扎后，应观察四肢末梢的血运情况

参考答案：C、

11[单选题]

以下哪个骨折固定原则是错误的？

A、夹板的长度需超过骨折骨所相邻的两个关节

B、骨折断端暴露，可以送回伤口内

C、固定后，上肢取屈肘位，下肢取伸直位

D、骨折断端暴露，不要拉动，不要送回伤口内

参考答案：B、

12 [单选题]

骨折固定后暴露伤肢末端的原因是？

A、透气 B、节约辅料 C、便于换药 D、便于观察血运情况

参考答案：D、

13[单选题]

骨折固定时，先固定骨折的哪一端？

A、下端 B、中部 C、两端 D、上端

参考答案：D、

14[单选题]

上肢骨折固定后，上肢应保持：

- A、伸直位 B、曲肘位 C、随意体位 D、外展位

参考答案：B、

15[单选题]

以下哪个步骤不属于换药步骤？

- A、揭除沾染敷料
B、用新洁尔灭酊冲洗开放性伤口
C、清理伤口
D、覆盖无菌敷料并包扎固定

参考答案：B、

16[单选题]

以下哪个换药原则是错误的？

- A、严格遵守无菌操作的原则
B、先换清洁伤口，再换污染伤口，最后感染伤口
C、沾染分泌物的敷料，放入专用的容器，不应再接触其他部位
D、换药的两把镊子在使用过程中无需区分

参考答案：D、

17[单选题]

在换药中，最重要的是：

- A、快速 B、每天换药 C、无菌观念 D、早晨换药

参考答案：C、

18[单选题]

换药的目的是：

- A、观察伤口情况，保持创面清洁
B、保持和防止伤口受损和外来感染
C、清除伤口异物、坏死组织
D、以上都是

参考答案：D、

19[单选题]

换药人员准备不包括：

- A、穿工作服 B、吃饭 C、戴工作帽及口罩 D、换药前洗手

参考答案：B

20[单选题]

关于伤口包扎的原则，以下哪项是错误的

- A、注意个人防护
B、检查伤口，加盖敷料
C、动作轻巧，部位准确，松紧适宜

D、应该常规用水冲洗伤口

参考答案：D、

习题三

1[单选题]

下列哪项不是穿脱隔离衣的适应症：

- A、常见的呼吸道疾病有流行性感冒、流行性腮腺炎等
- B、常见的消化道传染病有病毒性肝炎、痢疾等
- C、常见的心血管疾病有高血压、冠心病等
- D、需要保护的易感人群有早产儿、白血病患者等

参考答案：C、

2[单选题]

关于隔离衣的描述哪项是正确的：

- A、隔离衣的长短要合适，如有破洞，可继续穿着
- B、隔离衣如有污染或潮湿仍应继续使用，每日更换一次
- C、隔离衣使用完毕后如挂在半污染区，应清洁面向内
- D、隔离衣使用完毕后如挂在污染区，应清洁面向内

参考答案：D、

3[单选题]

穿隔离衣时哪种说法正确：

- A、穿前选择隔离衣时越长越好，以起到保护自己的目的
- B、穿隔离衣时，清洁面朝向自己
- C、穿隔离衣过程中衣袖可以触及面部
- D、穿完隔离衣能在清洁区随意走动

参考答案：B、

4[单选题]

脱隔离衣时哪种说法错误：

- A、脱隔离衣时应先解开腰带和袖口
- B、消毒双手前解开衣领
- C、消毒双手后解开衣领
- D、脱隔离衣时消毒过的手不能触及隔离衣的外面

参考答案：B、

5[单选题]

关于穿隔离衣的目的哪种说法不正确：

- A、保护自己和患者
- B、防止病原微生物播散
- C、避免交叉感染
- D、以上说法均不对

参考答案：D

??

6[单选题]

下列哪项不是静脉输液的禁忌症：

- A、有严重出血倾向者时
- B、穿刺部位有炎症、肿瘤时
- C、药物不宜口服、皮下、肌内注射时
- D、穿刺部位有外伤、疤痕时

参考答案：C、

7[单选题]

下列哪项不是常见的输液反应：

- A、发热反应
- B、静脉炎
- C、空气栓塞
- D、输液处局部肿胀

参考答案：D、

8[单选题]

关于输液术的描述错误的是：

- A、输液时必须排尽管内空气，预防空气栓塞
- B、输液结束及时更换输液瓶或及时拔针
- C、输液过程中应观察输液者有无不适及输液反应的发生
- D、输液时不需要根据病情和药物性质调节输液速度，成人 40 滴/分，儿童 20 滴/分

参考答案：D、

9[单选题]

输液过程中出现溶液不滴时常见的处理方法哪项是错误的：

- A、针头滑出血管外，应另选血管重新穿刺
- B、针头斜面紧贴血管壁妨碍液体滴入可调整针头或肢体位置
- C、针头阻塞致药液不滴（挤压有阻力无回血）应更换针头重新穿刺
- D、因输液压力过低导致溶液不滴时可拔出针头重新穿刺

参考答案：D、

10[单选题]

关于静脉输液的描述下列哪项不正确：

- A、输液时必须排尽管内空气，预防空气栓塞
- B、输液术应严格执行无菌操作
- C、以上 2 中说法均正确
- D、以上 2 中说法均错误

参考答案：D、

11[单选题]

吸氧浓度的换算公式（%）为：

- A、 $(21+4) \times \text{氧流量 (L/分)}$
- B、 $21+4 \times \text{氧流量 (L/分)}$
- C、 $(21+6) \times \text{氧流量 (L/分)}$
- D、 $21+6 \times \text{氧流量 (L/分)}$

参考答案：B、

12[单选题]

吸氧关键注意点中下列哪项描述是**错误**的：

- A、用氧时切实做好防火、防油、防震、防热，注意用氧安全
- B、按病情选择合理的用氧方法及氧浓度
- C、氧气筒内的氧气一定要用完**
- D、用氧过程中，应观察患者情况

参考答案：C、

13[单选题]

使用氧气时的正确操作方法是：

- A、先鼻导管轻轻插入腔，再打开流量表，调节氧流量
- B、先打开流量表，调节氧流量，再鼻导管蘸水轻轻插入鼻腔**
- C、先打开流量表，再鼻导管蘸水轻轻插入鼻腔，最后调节氧流量
- D、先打开流量表，再鼻导管蘸水，调节氧流量后轻轻将鼻导管插入鼻腔

参考答案：B、

14[单选题]

停用氧气时的正确操作方法是：

- A、先取下鼻导管，再关流量表，最后关总开关**
- B、先关总开关，再关流量表，最后取下鼻导管
- C、先关流量表，再取下鼻导管，最后关总开关
- D、先取下鼻导管，再关总开关，最后关流量表

参考答案：A、

15[单选题]

关于吸氧的描述正确的是：

- A、氧疗目的是纠正缺氧，改善症状，维持机体生命活动，所以给氧越多越好
- B、对于轻度缺氧者可以给予高流量氧气吸入
- C、对于重度缺氧者可以高流量持续给氧一周
- D、要定时检查导管是否通畅并及时清除鼻腔分泌物以防止堵塞**

参考答案：D、

习题四

1[单选题]

关于小儿气道内异物阻塞时的表现及处理下列哪项不正确

- A、呼吸困难、喘息、能咳嗽，不能发出声音或带有高调的喉鸣，表明还有呼吸和气体交换，应尽快送医院救治
- B、呼吸困难、喘息、能咳嗽，不能发出声音或带有高调的喉鸣，表明还有呼吸和气体交换，可现场先抢救，并尽快送医院救治
- C、呼吸困难、哭不出声来，嘴唇、指甲、和皮肤出现紫绀，很快意识丧失、呼吸停止应尽快送医院救治
- D、呼吸困难、哭不出声来，嘴唇、指甲、和皮肤出现紫绀，很快意识丧失、呼吸停止必须尽快现场抢救，然后送医救治

参考答案：C、

2[多选题]

关于气道内异物梗阻的急救原则下列哪项不正确

- A、尽快解除呼吸道的阻塞
- B、对呼吸停止者进行人工呼吸和心脏按压
- C、在发生窒息现场先采取急救措施，勿盲目急着送医院
- D、小儿呼吸道异物阻塞的识别和急救手法与成人相同

参考答案：B、D、

3[单选题]

哪项不是小儿常见呼吸道梗阻的原因

- A、进食时哭闹不慎将块状食物
- B、抓吃花生米、豆类等
- C、小型玩具如玻璃球等
- D、边吃饭边听广播

参考答案：D、

4[单选题]

下列哪项不是成人气道异物阻塞时的常见的表现

- A、突然发生呛咳、不能说话
- B、出现气急、呼吸困难、声嘶
- C、有头晕、呕吐
- D、严重时面色、唇色很快青紫

参考答案：C、

5[单选题]

对于气道内梗阻患者的急救错误的是

- A、首先在发生窒息现场采取急救措施
- B、首先应立即拨打急救电话，送医院
- C、要尽快解除呼吸道的阻塞

D、要对呼吸停止者进行人工呼吸和心脏按压

参考答案：D、

6[单选题]

在进行单人施救成人心肺复苏时，胸外按压和通气比是

A、30:2

B、5:1

C、20:2

D、15:2

参考答案：A、

7[单选题]

成人心肺复苏时，双人施救两人轮换按压和通气的角色

A、每 2 个循环

B、每 10 个循环

C、每 5 个循环

D、每 8 个循环

参考答案：C、

8[单选题]

成年患者胸外按压的推荐深度？

A、至少 2.5 厘米

B、至少 5 厘米

C、至少 7.5 厘米

D、至少 10 厘米

参考答案：B、

9[单选题]

为各年龄患者进行胸外按压的推荐速率为多少？

A、每分钟按压至少 40 次

B、每分钟按压至少 60 次

C、每分钟按压至少 80 次

D、每分钟按压至少 100 次

参考答案：D、

10[单选题]

人工呼吸有效的表现：

A、腹部明显隆起

B、胸廓明显隆起

C、通气球囊已充分按压

D、施救者能听到面罩周围有漏气声

参考答案：B、

11[单选题]

在使用 AED 进行电击之前，下列哪项是错误的

- A、AED 建议电击、充电并提示施救者按电击按钮。
- B、需选择能量
- C、在分析心律时应让所有人离开病人
- D、在按下电击按钮时确保所有人都离开

参考答案：B、

12[单选题]

对不满 8 岁的儿童患者使用 AED 时

- A、如果没有儿童型电极片，可以用婴儿型电极片
- B、只能用成人型电极片或剂量衰减器
- C、如果没有儿童型电极片和儿科剂量衰减器，可以用成人型电极片和成人剂量
- D、可以使用成人型电极片，但使用前应该裁去一半

参考答案：C、

13[单选题]

电极片放置的位置

- A、胸部右上方锁骨正下方，左乳头侧腋下数英寸
- B、胸部左右两侧
- C、可将两个电极片连在一起
- D、两个电极片可以换着用，无所谓左右之分

参考答案：A、

14 [单选题]

有关 AED

- A、要选择能量
- B、无需选择能量

参考答案： B、

15[单选题]

体内安装有起搏器或除颤器的患者能否使用 AED？

- A、能 B、不能

参考答案：A、

16[单选题]

无创呼吸机的使用不适用于

- A、心跳呼吸停止
- B、睡眠呼吸暂停
- C、肥胖低通气综合征
- D、有创通气脱机前的过渡

参考答案：A、

17[单选题]

在使用无创呼吸机时，下列错误的是

- A、出现口咽干燥时，可以间歇喝水缓解，使用湿化器
- B、先将面罩连接好呼吸机并打开呼吸机，再固定面罩
- C、要防止误吸
- D、可间歇松开罩避免长期压迫同一位置，损伤鼻梁与面部皮肤

参考答案：B、

18[单选题]

在使用无创呼吸机期间应监测的内容

- A、神志 B、呼吸频率 C、心率血压 D、以上都是

参考答案：D、

19[单选题]

人体生理呼吸原理

- A、正压通气，即吸气使胸廓扩张产生正压
- B、负压通气，即吸气使胸廓扩张产生负压

参考答案：B、

20[单选题]

呼吸机的原理是

- A、正压通气 B、负压通气

参考答案：A、

习题五

1[单选题]

以下哪项不是关节脱臼时的常见表现：

- A、疼痛
- B、肿胀
- C、关节不能活动
- D、反常活动

参考答案：D、

2[单选题]

关节脱臼时可采取哪项措施：

- A、固定
- B、热敷
- C、按摩
- D、推拿

参考答案：A、

3[单选题]

以下哪项不是关节脱臼时强行复位可能会造成的后果：

- A、骨折
- B、皮肤破裂
- C、神经损伤
- D、血管损伤

参考答案：B、

4[单选题]

以下哪项不是关节脱臼时患处局部冰敷的作用：

- A、暂时减轻脱臼的疼痛
- B、减轻患处的内出血
- C、有利于临时固定
- D、减轻患处的水肿

参考答案：C、

5[单选题]

肩部脱臼临时固定方法：

- A、夹板固定；
- B、三角巾悬吊；
- C、石膏固定；
- D、用手托

参考答案：B、

1[单选题]

活动时关节部位突然过猛扭转最容易引起哪项损伤：

- A、骨折；
- B、韧带损伤；
- C、神经损伤；
- D、血管损伤

参考答案：B、

2[单选题]

以下哪项不是急性扭伤 48 小时内的处理要点：

- A、冰敷；
- B、固定；
- C、休息；
- D、按摩

参考答案：D、

3[单选题]

以下哪项不是发生急性扭伤后的正确做法：

- A、先冷敷止血，再热敷促进吸收；
- B、扭伤部位立即停止运动；
- C、肿胀疼痛后就可以正常活动；
- D、肿胀疼痛仍然剧烈，及时到医院拍片检查

参考答案：C、

4[单选题]

急性腰扭伤不正确的做法：

- A、平卧静养，最好睡软床；
- B、局部先冷敷,后热敷；
- C、起床活动时，扎宽腰带；
- D、好转后，锻炼腰背肌

参考答案：A、

5[单选题]

以下哪项不是踝关节急性扭伤的处理原则：

- A、休息；
- B、冰敷；
- C、按摩；
- D、抬高患肢

参考答案：C、

1[单选题]

以下哪项是现场急救的最后一个环节：

- A、通气；
- B、止血、包扎；
- C、转运；
- D、固定

参考答案：C、

2[单选题]

以下哪项不是转运过程中骨折伤员肢体固定的目的：

- A、减轻疼痛；
- B、减少出血；
- C、减少骨折端的活动；
- D、以免加重血管、神经组织的损坏

参考答案：B、

3[单选题]

对伤情严重伤员的转运哪项是正确的：

- A、转运时必须要保持脊柱平直；
- B、对于开放伤口骨折端外露的，应先复位再固定；
- C、转运过程中必须固定头部；
- D、就近送医院进行抢救

参考答案：D、

4[单选题]

脊柱损伤伤者转运的哪项是错误的：

- A、可以使用背、抱或二人抬的方式进行搬动；
- B、运送时应使用硬质担架或木板；

C、对怀疑有脊柱骨折或不能除外脊柱骨折者，必须按照有脊柱骨折对待；

D、有颈椎损伤者，运送过程中必须固定头部

参考答案：A、

5[单选题]

昏迷伤者的转运哪项是错误的：

A、最为重要的是保持伤者的呼吸道通畅；

B、使患者脸朝上仰卧；

C、随时注意观察伤者；

D、如果伤者出现呕吐，应及时清除其口腔内的呕吐物，防止误吸

参考答案：B、

习题六

1[单选题]

以下哪项说法不对？

A、任何物质都可以成为毒

B、毒物可以通过皮肤吸收

C、安定中毒瞳孔会缩小

D、所有经口吞服的毒物都可以催吐

参考答案：D、

2[单选题]

以下哪项是 CO 中毒的典型症状？

A、瞳孔缩小 B、昏迷 C、皮肤黏膜樱桃红色 D、抽搐

参考答案：C、

3[单选题]

以下哪一项不是有机磷农药中毒的典型症状？

A、瞳孔缩小 B、皮肤黏膜青紫 C、大蒜味 D、流口水

参考答案：B、

4[单选题]

清除尚未吸收的毒物正确的是？

A、强酸强碱中毒立即催吐

B、O 中毒者立即给予吸氧

C、有机磷中毒者用热水清洗身体

D、安定中毒者立即催吐

参考答案：D、

5[单选题]

以下哪一项不是预防中毒的措施之一：

A、车辆在马路上行驶时尽量使用空调

- B、炭火取暖要开窗通风
- C、儿童远离药品和化学物品
- D、尽量原包装保存物品

参考答案：A、

1[单选题]

高危胸痛病因不包括以下哪一项：

- A、急性心梗
- B、气胸
- C、主动脉夹层
- D、纵膈炎

参考答案：B、

2[单选题]

心梗诱因包括：

- A、劳累
- B、暴饮暴食
- C、大量饮酒
- D、以上都是

参考答案：D、

3[单选题]

55 岁男性患者，突发胸背撕裂样疼痛，冷汗，血压 220/100mmHg，首先考虑哪种疾病可能：

- A、主动脉夹层
- B、心梗
- C、气胸
- D、肺栓塞

参考答案：A、

4[单选题]

肺栓塞三联征表现为：

- A、呼吸困难
- B、咯血
- C、胸痛
- D、以上都是

参考答案：D、

5[单选题]

以下哪一项是提示高危胸痛的表现：

- A、不明病因胸痛反复发作，发作频率增加，程度加重
- B、胸痛向左肩、颈部或腹部放射
- C、伴冷汗，伴晕厥或呼吸困难
- D、以上都是

参考答案：D、

1[单选题]

卒中管理 3R 不包括以下哪一项：

- A、减少卒中危险因素
- B、早期溶栓
- C、早期识别
- D、早期呼叫 120

参考答案：B、

2[单选题]

以下哪项是中风的危险因素：

- A、酗酒
- B、高血压
- C、冠心病
- D、以上都是

参考答案：D、

3[单选题]

以下那句话是错的：

- A、80%卒中可以预防
- B、卒中尽早治疗能减少后遗症
- C、卒中康复到6个月为止
- D、任何年龄都可能发生中风

参考答案：C、

4[单选题]

卒中的预防包括：

- A、控制房颤
- B、戒烟戒酒
- C、适当运动
- D、以上都是

参考答案：D、

啦啦啦啦~ 整理完啦 复习信号与系统去！