



哈爾濱工業大學(深圳)

HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

第一章 线性规划


谢秉磊


第一章 线性规划

第二节 基本概念和基本定理

- 基本概念

- 基本定理

基变量、非基变量 

基本解、基 

基本可行解、可行基

最优基本可行解、最优基

非退化基本可行解

退化基本可行解

线性规划的标准形：

$$\min S = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \longrightarrow \min S = CX$$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

.....

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \cdots, n$$

$$AX = b$$

$$X \geq 0$$

$$(LP) \min S = CX$$

$$AX = b$$

$$X \geq 0$$

$$(b_1, b_2, \cdots, b_m)^T$$

$$= (a_{ij})_{m \times n}$$

一. 基本概念:

$$(LP) \min S = CX$$

$$AX = b$$

$$X \geq 0$$

$$C = (c_1,$$

$$X = (x_1,$$

$$b = (b_1,$$

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

设 $R(A) = m (m \leq n)$

因此 A 中有 m 列线性无关, 不妨设前 m 列线性无关

$$A = (\underbrace{p_1, p_2, \cdots, p_m}_{\text{基列}} \underbrace{p_{m+1}, p_{m+2}, \cdots, p_n}_{\text{非基列}}) = (B, N)$$

B (可逆) N (非基矩阵)

称为 (LP) 的一个基 (基矩阵)

注: (LP) 的基不惟一。

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 \quad R(A) = 2$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{P_1} \quad \mathbf{P_2} \quad \mathbf{P_3} \quad \mathbf{P_4}$

该(LP)有5个基:

$$B_1 = (P_1, P_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B_4 = (P_2, P_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_2 = (P_1, P_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B_5 = (P_3, P_4) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_3 = (P_2, P_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad B_6 = (P_1, P_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ 不是基}$$

$$AX = b$$

$$X \geq 0$$

$$AX = b$$

$$(B, N)$$

$$(p_1, p_2, \dots, p_m, p_{m+1}, p_{m+2}, \dots, p_n)$$

$$(B, N) \begin{pmatrix} \text{基列}^B \\ X_N \end{pmatrix} = b$$

非基列

$$\left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \\ x_{m+1} \\ x_{m+2} \\ \vdots \\ x_n \end{array} \right) = b$$

非基变量： 与非基列相对应的分量称为非基变量

注释：基变量，非基变量由基列，非基列来确定。

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4$

$$R(A) = 2$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

$P_1 \quad P_2 \quad P_3 \quad P_4$

该(LP)有5个基, 基列决定基变量:

$$B_1 = (P_1, P_2) \quad X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$$

$$B_2 = (P_1, P_3) \quad X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$$

$$B_3 = (P_2, P_3) \quad X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$$

$$B_4 = (P_2, P_4) \quad X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$$

$$B_5 = (P_3, P_4) \quad X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$$

$$AX = b \rightarrow (B, N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = b \rightarrow BX_B + NX_N = b$$

$$\rightarrow X_B + B^{-1}NX_N = B^{-1}b \rightarrow X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$$

例: $\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad R(A) = 2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 + 2x_3 - x_4 \\ x_2 = 1 - 2x_3 - 0x_4 \end{cases}$$

$$AX = b \rightarrow (B, N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = b \rightarrow BX_B + NX_N = b$$

$$\rightarrow X_B + B^{-1}NX_N = B^{-1}b \rightarrow X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$$

$$\text{令: } X_N = \mathbf{0} \text{ 则: } X_B = B^{-1}b \rightarrow X = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

基本解: $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 是 $AX = b$ 的解, 称为(LP)

关于基 B 的基本解.

注: 基本解完全由基来决定, 一个基对应一个基本解。

$$AX = b \rightarrow (B, N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = b \rightarrow BX_B + NX_N = b$$

$$\rightarrow X_B + B^{-1}NX_N = B^{-1}b \rightarrow X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$$

例: $\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ $R(A) = 2$

\downarrow $x_3 = x_4 = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{基本解}$$

$$X = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 \quad R(A) = 2$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$P_1 \quad P_2 \quad P_3 \quad P_4$

$$X = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

该(LP)有5个基, 5个基对应5个基本解:

$$B_1 = (P_1, P_2) \quad X^1 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^1 = (0, 1, 0, 0)^T$$

$$B_2 = (P_1, P_3) \quad X^2 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^2 = (1, 0, 1/2, 0)^T$$

$$B_3 = (P_2, P_3) \quad X^3 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^3 = (0, 1, 0, 0)^T$$

$$B_4 = (P_2, P_4) \quad X^4 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^4 = (0, 1, 0, 0)^T$$

$$B_5 = (P_3, P_4) \quad X^5 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^5 = (0, 0, 1/2, 1)^T$$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = B_1^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

第一章 线性规划

第二节 基本概念和基本定理

- 基本概念
 - 基变量、非基变量✓
 - 基本解、基✓
 - 基本可行解、可行基←
 - 最优基本可行解、最优基
- 基本定理
 - 非退化基本可行解
 - 退化基本可行解

$$(LP) \min S = CX$$

$$AX = b$$

$$X \geq 0$$

基本解: $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 是 $AX = b$ 的解, 称为 (LP)
基:

关于基 B 的基本解.

基本可行解: 若 $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} \geq 0$, 则称 X 为 (LP) 关于
可行基:

可行基 B 的基本可行解。
(可行域的顶点)

$$AX = b \rightarrow (B, N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = b \quad X = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \geq 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow X_B + B^{-1}NX_N = B^{-1}b \rightarrow X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$$

例: $\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad R(A) = 2$

$\downarrow x_3 = x_4 = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

基本解
基本可行解
B是可行基

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 \quad R(A) = 2$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$P_1 \quad P_2 \quad P_3 \quad P_4$

$$X = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

该(LP)有5个基, 5个基对应都是基本可行解:

$$B_1 = (P_1, P_2) \quad X^1 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^1 = (0, 1, 0, 0)^T$$

$$B_2 = (P_1, P_3) \quad X^2 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^2 = (1, 0, 1/2, 0)^T$$

$$B_3 = (P_2, P_3) \quad X^3 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^3 = (0, 1, 0, 0)^T$$

$$B_4 = (P_2, P_4) \quad X^4 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^4 = (0, 1, 0, 0)^T$$

$$B_5 = (P_3, P_4) \quad X^5 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^5 = (0, 0, 1/2, 1)^T$$

第一章 线性规划

第二节 基本概念和基本定理

- 基本概念
 - 基变量、非基变量✓
 - 基本解、基✓
 - 基本可行解、可行基✓
 - 最优基本可行解、最优基←
- 基本定理
 - 非退化基本可行解
 - 退化基本可行解

$$(LP) \min S = CX$$

$$AX = b \rightarrow X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$$

$$X \geq 0$$

$$S = CX = (\underbrace{c_1, c_2, \dots, c_m}_{C_B}, \underbrace{c_{m+1}, c_{m+2}, \dots, c_n}_{C_N}) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \\ x_{m+1} \\ x_{m+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{matrix} \left. \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{matrix} \right\} X_B \\ \left. \begin{matrix} x_{m+1} \\ x_{m+2} \\ \vdots \\ x_n \end{matrix} \right\} X_N \end{matrix}$$

$$= (C_B, C_N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = C_B X_B + C_N X_N$$

$$= C_B (B^{-1}b - B^{-1}NX_N) + C_N X_N$$

$$= C_B B^{-1}b - C_B B^{-1}NX_N + C_N X_N$$

$$= C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N)X_N$$

$$S = CX = C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N)X_N$$

规划1-2

$$\begin{aligned}\min S &= CX \\ AX &= b \\ X &\geq 0\end{aligned}$$

定理1-1（最优性判别定理）

对于 (LP) 的基 B ，若有 $X_B^* = \underline{B^{-1}b} \geq 0$ 且

$C - C_B B^{-1} A \geq 0$ ($C_N - C_B B^{-1} N \geq 0$)，则基本可行解

$X^* = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 是 (LP) 的最优解，称为**最优基本可行解**，

B 称为**最优基**。最优值为 $C_B B^{-1}b$ 。

证明：对 $\forall X \in D$ 有

$$\begin{aligned}S &= CX = C_B B^{-1}b + \underline{(C_N - C_B B^{-1}N)X_N} \\ &\geq C_B B^{-1}b = (C_B, C_N) \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} \stackrel{\geq 0}{=} CX^* \quad \therefore X^* \text{ 是最优解} \blacksquare\end{aligned}$$

$$S = CX = C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N)X_N$$

规划1-2

$$\min S = CX$$

$$AX = b$$

$$X \geq 0$$

证明: $C - C_B B^{-1} A \geq 0 \Leftrightarrow C_N - C_B B^{-1} N \geq 0$

$$C - C_B B^{-1} A = (C_B, C_N) - C_B B^{-1} (B, N)$$

$$= (C_B, C_N) - (C_B, C_B B^{-1} N)$$

$$= (0, C_N - C_B B^{-1} N) \quad \blacksquare \quad X = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix}$$

定理1-1 (最优性判别定理)

对于 (LP) 的基 B , 若有 $X_B^* = \underline{B^{-1}b} \geq 0$ 且

$C - C_B B^{-1} A \geq 0$ ($C_N - C_B B^{-1} N \geq 0$) , 则基本可行解

$X^* = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 是 (LP) 的最优解, 称为**最优基本可行解**,

B 称为**最优基**。检验数向量 非基变量检验数向量

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 \quad R(A) = 2$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$P_1 \quad P_2 \quad P_3 \quad P_4$

$$X = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

该(LP)有5个基, 5个基对应都是基本可行解: 目标值:

$$B_1 = (P_1, P_2) \quad X^1 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^1 = (0, 1, 0, 0)^T \quad 1$$

$$B_2 = (P_1, P_3) \quad X^2 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^2 = (1, 0, 1/2, 0)^T \quad 2$$

$$B_3 = (P_2, P_3) \quad X^3 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^3 = (0, 1, 0, 0)^T \quad 1$$

$$B_4 = (P_2, P_4) \quad X^4 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^4 = (0, 1, 0, 0)^T \quad 1$$

$$B_5 = (P_3, P_4) \quad X^5 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^5 = (0, 0, 1/2, 1)^T \quad 3$$

$X^1, X^3, X^4 = (0, 1, 0, 0)^T$ 是最优解
 B_1, B_3, B_4 都是最优基

最优目标值: 1

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4$ $R(A) = 2$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & \textcolor{red}{2} & 2 & \textcolor{blue}{1} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \geq \textcolor{red}{0}$$

$$X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{是基本可行解, } B \text{是可行基。}$$

$$C = (1, 1, 2, 2) \quad C_B = (1, 1) \quad C_N = \textcolor{blue}{(2, 2)}$$

$$\because C - C_B B^{-1}A = (1, 1, 2, 2) - (1, 1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (0, 0, 2, 1) \geq \textcolor{red}{0}$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} \text{是最优基本可行解, } B \text{是最优基。最优目标值: } \textcolor{blue}{1}$$

$$\because \textcolor{blue}{C_N - C_B B^{-1}N} = (2, 2) - (1, 1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \textcolor{blue}{(0, 1)} \quad C_B B^{-1}b = (1, 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$$

线性规划1-2

第一章 线性规划

第二节 基本概念和基本定理

- 基本概念
 - 基变量、非基变量✓
 - 基本解、基✓
 - 基本可行解、可行基✓
 - 最优基本可行解、最优基✓
- 基本定理
 - 非退化基本可行解
 - 退化基本可行解

对比概念： $\because R(A) = m \therefore A = (B, N), B - \text{可逆}$

B -基(可逆) $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ - 基本解($AX = b$)

B -可行基 $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ - 基本可行解, $B^{-1}b \geq 0$
($AX = b, X \geq 0$)

B -最优基 $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ - 最优基本可行解
 $B^{-1}b \geq 0, C - C_B B^{-1}A \geq 0$

第一章 线性规划

第二节 基本概念和基本定理

- 基本概念
 - 基变量、非基变量✓
 - 基本解、基✓
 - 基本可行解、可行基✓
 - 最优基本可行解、最优基✓
- 基本定理
 - 非退化基本可行解 ←
 - 退化基本可行解

非退化的基本可行解：

若基本可行解 $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 中， $B^{-1}b > \mathbf{0}$ ，则称该

基本可行解为非退化基本可行解。

退化的基本可行解：

若基本可行解 $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 中， $B^{-1}b \geq \mathbf{0}$ ，即 $B^{-1}b$

中至少有一个分量为 0，则称该基本可行解为退化基本可行解。

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4$ $R(A) = 2$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & \textcolor{red}{2} & 2 & \textcolor{blue}{1} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \geq \mathbf{0}$$

$$X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 是退化的基本可行解, } B \text{ 是可行基。}$$

$$C = (1, 1, 2, 2) \quad C_B = (1, 1) \quad C_N = \textcolor{blue}{(2, 2)}$$

$$\because C - C_B B^{-1}A = (1, 1, 2, 2) - (1, 1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (0, 0, 2, 1) \geq \mathbf{0}$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 是退化的最优基本可行解, } B \text{ 是最优基。}$$

$$\because C_N - C_B B^{-1}N = (2, 2) - (1, 1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = (2, 1) \geq \mathbf{0}$$

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 \quad R(A) = 2$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$P_1 \quad P_2 \quad P_3 \quad P_4$

$$X = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

该(LP)有5个基, 5个基对应都是基本可行解:

$$B_1 = (P_1, P_2) \quad X^1 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^1 = (0, 1, 0, 0)^T \quad \text{退化}$$

$$B_2 = (P_1, P_3) \quad X^2 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^2 = (1, 0, 1/2, 0)^T \quad \text{非退化}$$

$$B_3 = (P_2, P_3) \quad X^3 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^3 = (0, 1, 0, 0)^T \quad \text{退化}$$

$$B_4 = (P_2, P_4) \quad X^4 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^4 = (0, 1, 0, 0)^T \quad \text{退化}$$

$$B_5 = (P_3, P_4) \quad X^5 = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \quad X^5 = (0, 0, 1/2, 1)^T \quad \text{非退化}$$

$$X^1, X^3, X^4 = (0, 1, 0, 0)^T \quad \text{是最优解 退化}$$

$$B_1, B_3, B_4 \quad \text{都是最优基}$$

第一章 线性规划

第二节 基本概念和基本定理

✓ 基本概念

基变量、非基变量✓

基本解、基✓

基本可行解、可行基✓

最优基本可行解、最优基✓

➡ 基本定理

非退化基本可行解✓

退化基本可行解

引理: $(LP) \min S = CX$

$$AX = b$$

$$X \geq 0$$

若 X 是 (LP) 的一个可行解, 若 X 中非零分量所对应的列向量线性无关, 则 X 是 (LP) 的一个基本可行解.

证明:

$$A = (P_1, P_2, \dots, P_r, \dots, P_n)$$

设 X 中的前 r 个分量大于零, 它们所对应的列向量线性无关, 显然 $r \leq m$.

若 $r = m$,

$B = (P_1, P_2, \dots, P_m)$ 且 X

$\Rightarrow B$ 是 (LP) 可行基, X 是基本可行解

若 $r < m, \because R(A) = m$,

有 $(P_1, P_2, \dots, P_r, P_{r+1}, \dots, P_m)$ m 个向量线性无关

它们构成 (LP) 一个基, X 是退化的基本可行解

定理1-2: $(LP) \min S = CX$

$$AX = b$$

$$X \geq 0$$

对于线性规划问题的标准形有以下两个结论成立:

1. 若存在一个可行解, 则必存在一个基本可行解;
2. 若存在一个最优解, 则必存在一个最优基本可行解

证明:

1. 若 $\forall X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为可行解, 有

$$x_1 P_1 + x_2 P_2 + \dots + x_n P_n = b$$

若 $x_1, x_2, \dots, x_r \geq 0$, 则 $x_1 P_1 + x_2 P_2 + \dots + x_r P_r = b$

情形1: 若 P_1, P_2, \dots, P_r 线性无关, X 本身是一个基本可行解。

情形2: 若 P_1, P_2, \dots, P_r 线性相关, 能构造出基本可行解吗?

存在不全为零的常数 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_r$

$$\delta_1 P_1 + \delta_2 P_2 + \dots + \delta_r P_r = 0$$

$$(x_1 - \varepsilon \delta_1) P_1 + (x_2 - \varepsilon \delta_2) P_2 + \dots + (x_r - \varepsilon \delta_r) P_r = b$$

如何选取合适的 ε 构造出新的可行解, 且

$$x_s - \varepsilon \delta_s = 0?$$

$\varepsilon = \min \left\{ \frac{x_i}{\delta_i} \mid \delta_i > 0 \right\}$, 构造的可行解至多有 $r-1$ 个分量。

$\varepsilon = \min\{\frac{x_i}{\delta_i} \mid \delta_i > 0\}$, 构造的可行解至多有 $r-1$ 个分量。

1) 若这 $r-1$ 个分量对应的列向量线性无关

➡ 构造出基本可行解

2) 若这 $r-1$ 个分量对应的列向量线性相关

➡ 继续消元, 直到获得基本可行解

例： $\min Z = -3x_1 - x_2 - 2x_3$ 找出所有的基本解，基本可行解，并确定最优解。

$$\begin{cases} 12x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 9 \\ 8x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_5 = 10 \\ 3x_1 + 0x_2 + 0x_3 - x_6 = 0 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 6 & 3 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & -4 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ \color{red}{P_1} & \color{red}{P_2} & \color{red}{P_3} & \color{red}{P_4} & \color{red}{P_5} & \color{red}{P_6} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 9 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$B_1 = (P_1, P_2, P_3) \ (|B_1| \neq 0) \Rightarrow$ 基本解： $X_1 = (0, \frac{16}{3}, -\frac{7}{6}, 0, 0, 0)^T$

$$B_1^{-1}b = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 6 \\ 8 & 1 & -4 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 9 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 16/3 \\ -7/6 \end{pmatrix} \quad B_4^{-1}b = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 0 \\ 8 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 9 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/4 \\ -4 \\ 21/4 \end{pmatrix}$$

$B_4 = (P_1, P_2, P_6) \ (|B_4| \neq 0) \Rightarrow$ 基本解： $X_4 = (\frac{7}{4}, -4, 0, 0, 0, \frac{21}{4})^T$

例: $\min Z = -3x_1 - x_2 - 2x_3$

$$\begin{cases} 12x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 9 \\ 8x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_5 = 10 \\ 3x_1 + 0x_2 + 0x_3 - x_6 = 0 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 6 & 3 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & -4 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 9 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$P_1 \quad P_2 \quad P_3 \quad P_4 \quad P_5 \quad P_6$

$$X_1 = (0, \frac{16}{3}, -\frac{7}{6}, 0, 0, 0)^T$$

$$X_4 = (\frac{7}{4}, -4, 0, 0, 0, \frac{21}{4})^T$$

16个基本解:

$X =$	(x_1)	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
X_2	0	10	0	-7	0	0
X_3	0	3	0	0	7/2	0
X_4	7/4	-4	0	0	0	21/4
X_5	0	0	-5/2	8	0	0
X_6	0	0	3/2	0	8	0
X_7	1	0	-1/2	0	0	3
X_8	0	0	0	3	5	0

$X =$	(x_1)	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
X_9	5/4	0	0	-2	0	15/4
X_{10}	0	3	-7/6	0	0	0
X_{11}	0	0	-5/2	8	0	0
X_{12}	0	0	0	3	5	0
X_{13}	3/4	0	0	0	2	9/4
X_{14}	0	10	0	-7	0	0
X_{15}	0	0	0	0	7/2	0
X_{16}	0	0	3/2	0	8	0

例:

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 6 & 3 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & -4 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 9 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$P_1 \quad P_2 \quad P_3 \quad P_4 \quad P_5 \quad P_6$

16个基本解: 7个基本可行解:

$X =$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
X_2	0	10	0	-7	0	0
X_3	0	3	0	0	7/2	0
X_4	7/4	-4	0	0	0	21/4
X_5	0	0	-5/2	8	0	0
X_6	0	0	3/2	0	8	0
X_7	1	0	-1/2	0	0	3
X_8	0	0	0	3	5	0

$X =$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
X_9	5/4	0	0	-2	0	15/4
X_{10}	0	3	-7/6	0	0	0
X_{11}	0	0	-5/2	8	0	0
X_{12}	0	0	0	3	5	0
X_{13}	3/4	0	0	0	2	9/4
X_{14}	0	10	0	-7	0	0
X_{15}	0	3	0	0	7/2	0
X_{16}	0	0	3/2	0	8	0

例:

$$X_3 = X_{15} \quad X_6 = X_{16} \quad X_8 = X_{12}$$

但 X_3 相应的基: $B_3 = (P_1, P_2, P_5)$

X_{15} 相应的基: $B_{15} = (P_2, P_5, P_6)$

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 6 & 3 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & -4 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ \mathbf{P_1} & \mathbf{P_2} & \mathbf{P_3} & \mathbf{P_4} & \mathbf{P_5} & \mathbf{P_6} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 9 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

即不同的基对应相同的基本可行解。

7个基本可行解:

$X =$	(x_1)	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
X_3	0	3	0	0	7/2	0
X_6	0	0	3/2	0	8	0
X_8	0	0	0	3	5	0

$X =$	(x_1)	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
X_{12}	0	0	0	3	5	0
X_{13}	3/4	0	0	0	2	9/4
X_{15}	0	3	0	0	7/2	0
X_{16}	0	0	3/2	0	8	0

例: $\min Z = -3x_1 - x_2 - 2x_3$

$$\begin{cases} 12x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 9 \\ 8x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_5 = 10 \\ 3x_1 + 0x_2 + 0x_3 - x_6 = 0 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases} A = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 6 & 3 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & -4 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 9 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$P_1 \quad P_2 \quad P_3 \quad P_4 \quad P_5 \quad P_6$

7个基本可行解: 4个不同的基本可行解:

	$X =$	(x_1)	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		$X =$	(x_1)	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
-3	X_3	0	3	0	0	7/2	0	-9/4	X_{13}	3/4	0	0	0	2	9/4
-3	X_6	0	0	3/2	0	8	0								
0	X_8	0	0	0	3	5	0								

X_3, X_6 是最优解, $\min Z = -3$

第一章 线性规划

第二节 基本概念和基本定理

✓ 基本概念

基变量、非基变量✓

基本解、基✓

基本可行解、可行基✓

最优基本可行解、最优基✓

✓ 基本定理

非退化基本可行解✓

退化基本可行解