1. Mi a konvex függvény definíciója?

1. Definíció. *Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $I \subset \mathcal{D}_f$ egy intervallum. Ha $\forall a, b \in I$, $a < b$ esetén igaz az, hogy*

- *ha $\forall x \in (a, b)$: $f(x) \leq \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$, akkor azt mondjuk, hogy az f függvény* **konvex az I intervallumon**,

2. Mi a konvexitás geometriai jelentése?

Emlékezzünk, hogy egy függvény konvexitása bizonyos „alaki" tulajdonságaival van összefüggésben. Az mondtuk, hogy egy függvény szigorúan konvex (konkáv) egy I intervallumon, ha tetszőleges $a, b \in I$, $a < b$ pontpár esetén a függvény (a, b) intervallumhoz tartozó része az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokat összekötő húr alatt (felett) van. Az alábbi ábrák ezt a ***geometriai jelentést*** illusztrálják, ahol a bal oldali függvény szigorúan konvex, és a jobb oldali függvény szigorúan konkáv.



3. Jellemezze egy függvény konvexitását az első deriváltfüggvény segítségével!

1. Tétel (A konvexitás és a derivált kapcsolata). *Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D(I)$. Ekkor*

1. *f konvex [illetve f konkáv] I-n $\iff$ $f' \nearrow$ [illetve $f' \searrow$] I-n,*
2. *f szigorúan konvex [illetve f szigorúan konkáv] I-n $\iff$ $f' \uparrow$ [illetve $f' \downarrow$] I-n.*

4. Jellemezze egy függvény konvexitását a második deriváltfüggvény segítségével!

2. Tétel (A konvexitás és a kétszeres derivált kapcsolata). *Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D^2(I)$. Ekkor*

1. *f konvex [illetve f konkáv] I-n $\iff$ $f'' \geq 0$ [illetve $f'' \leq 0$] I-n;*
2. *$f'' > 0$ [illetve $f'' < 0$] I-n $\implies$ f szigorúan konvex [illetve f szigorúan konkáv] I-n.*

5. Mi az inflexiós pont definíciója?

2. Definíció. *Legyen $(a,b) \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D(a,b)$. Ekkor azt mondjuk, hogy a $c \in (a,b)$ pont az f függvénynek* **inflexiós pontja**, *ha*

$$\exists \delta > 0\colon f \text{ konvex } (c-\delta, c]\text{-n} \quad \text{és} \quad \text{konkáv } [c, c+\delta)\text{-n},$$

vagy fordítva.

6. Mit mond az inflexiós pontra vonatkozó másodrendű szükséges feltétel?
??

7. Mondjon példát olyan kétszer deriválható függvényre, amelynek egy adott pontban a második deriváltja nulla, de a függvénynek ott nincs inflexiós pontja!

az $f(x) := x^4$ $(x \in \mathbb{R})$ függvény esetében
$f''(0) = 0$, de 0 nem inflexiós pontja az f függvénynek.

8. Hogyan viselkedik a függvény grafikonján húzott érintő a függvény inflexiós pontján? ??

9. írja le a 0/0 esetre vonatkozó L'Hospital-szabályt!

4. Tétel (L'Hospital-szabály a $\frac{0}{0}$ esetben). *Legyen $-\infty \le a < b < +\infty$, illetve $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Ekkor*

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ f, g \in D(a,b), \\ \bullet\ \forall x \in (a,b)\colon g'(x) \neq 0, \\ \bullet\ \lim\limits_{a+0} f = \lim\limits_{a+0} g = 0, \\ \bullet\ \exists \lim\limits_{a+0} \dfrac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}. \end{array}\right\} \implies \exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'}.$$

10. Írja le a +∞/+∞ esetre vonatkozó L'Hospital-szabályt!

5. Tétel (L'Hospital-szabály a $\frac{+\infty}{+\infty}$ esetben). *Legyen $-\infty \le a < b < +\infty$, illetve $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Ekkor*

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ f, g \in D(a,b), \\ \bullet\ \forall x \in (a,b)\colon g'(x) \neq 0, \\ \bullet\ \lim\limits_{a+0} f = \lim\limits_{a+0} g = +\infty, \\ \bullet\ \exists \lim\limits_{a+0} \dfrac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}. \end{array}\right\} \implies \exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'}.$$