

Actividad 3.1

1. **Análisis de Varianza:** Se supone que cualquier variación que exista entre los promedios de los agregados se distribuye a 1) la variación en la absorción entre los observados dentro de los tipos de agregados, y 2) la variación entre los tipos de los agregados, es decir, las diferencias en la composición química de los agregados.

Se utiliza para partir la suma total de cuadrados en 2 partes, una parte debida a la regresión y otra al error.

2. **Heterogeneidad:** Los objetos a tratar se mantienen constantes.
3. **Error experimental:** mide la desviación que tiene la observación con respecto de la media del tratamiento.
4. **Tratamiento:** Se utiliza por lo general para designar las diversas clasificaciones, ya sean diferentes agregados, analistas, fertilizadores o regiones del país.
5. **SCT:** Si H_0 es verdadera, un estimado de σ^2 basado en $K-1$ grados de libertad es dado y por ello cada α_i es igual a 0. Si H_a es verdadera y S^2 es un estimado no sesgado de σ^2 .

6. **SCE**: Se calcula con STC , SCT y SCB y se obtiene mediante una resta y puede o no ser sesgado independientemente de la veracidad o falsedad de cualquier hipótesis nula.

7. **SCB**: El estimado S_2^2 es un estimado no sesgado de σ^2 si los efectos de los bloques $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_b = 0$. Si los efectos de los bloques no son iguales a cero, S_2^2 sobrestimarán a σ^2 .

8. **STC**: Expresa cómo las variaciones entre los tratamientos y dentro de los tratamientos contribuyen a la suma total de cuadrados.

9. **Prueba de Bartlett**: Se basa en estadístico cuya distribución muestral proporciona valores críticos para los tamaños de las muestras son iguales.

10. **Prueba de Cochran**: proporciona un procedimiento de cálculo sencillo, aunque está limitado a situaciones en que los tamaños muestrales son iguales.

11. **Comparación o contraste**: Cualquier función lineal de la forma

$$\omega = \sum_{i=1}^k C_i / M_i$$

donde $\sum_{i=1}^k C_i = 0$ en las medias de los tratamientos.

Held Pamela Martina Martinez
1952997 N1

12. **Procedimiento de Tukey:** permite la formación de intervalos de confianza del $100(1-\alpha)\%$ simultáneos para todas las comparaciones por pares. El método se basa en la distribución del rango estudentizado.

13. **Prueba de Duncan:** También se basa en el concepto general del rango estudentizado, este debe exceder cierto valor antes de que se encuentre que cualquiera de las p medias.

14. **Sesgo:** Puede originarse con una asignación sistemática.