

2018-2019 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题

1、设 A, B 均为 n 阶正交矩阵, 若 $|A| = 1, |B| = -1$, 则 $|B + A| =$ _____

2、设 $D = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 7 \\ 2 & 2 & 6 \\ 8 & x & y \end{vmatrix}$, 若 D 的代数余子式满足 $A_{11} + A_{12} + A_{13} = 4$, 则 $x =$ _____

3、设 A, B 均为 n 阶方阵, 若 A 和 B 的秩分别为 r 和 n , 则 $R(AB) - R(A) =$ _____

4、设 A 为 n 阶实对称矩阵, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$, 通过正交变换 $X = PY$, 可化为标准型 $y_1^2 - y_2^2 + 2y_3^2$, 设 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|2A^{-1} - A^*| =$ _____

5、若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 则 $x =$ _____

6、设 n 阶方阵 $A(a_{ij})$, 把 A 中每个元素 a_{ij} 都换到第 $n - i + 1$ 行, 第列 $n - i + 1$ 的位置上, 得到方阵 B . 若 $|A| = m$, 则 $|B| =$ _____

7、设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是其次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 _____ 也是它的基础解系

A、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 任一个等价向量组

B、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 任一个等秩向量组

C、 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

D、 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

8、设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 则下列四个命题中正确的是 ()

(1) A 与 B 相似, $\iff |\lambda E_n - A| = |\lambda E_n - B|$

(2) n 元二次型 $X^T A x$ 和 $X^T B x$ 有相同规范形 $\iff |\lambda E_n - A| = |\lambda E_n - B|$

(3) 若 A 和 B 相似, 则 A 和 B 合同

(4) 若 A 和 B 合同, 则 A 和 B 相似

A、(1)(2)

B、(2)(3)

C、(1)(3)

D、(1)(4)

9、设 n 维向量组 S_1, S_2 和 $S_1 \cup S_2$ 的秩依次为 r, s, t , 则 ()

A、 $t \geq r + s$

B、 $t \leq r + s$

C、 $t = r + s$

D、不确定

10、 $m \times n$ 矩阵 A 的秩等于 n 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 有唯一解的 ()

- A、充分必要条件 B、充分非必要条件 C、必要非充分条件 D、非充分非必要条件

二、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 且满足 $A^*x = A^{-1} + 2x$, 求矩阵 x

三、已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -5 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 10 \\ 15 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -9 \\ 3-2a \end{pmatrix}$ 线性相关, 求 a 的值, α_4

能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 请写出表达式

四、已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 有三个线性无关解

(1) 求方程组系数矩阵的秩

(2) 求 a, b 及方程组通解

学解 《线性代数B》历年题

五、设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A x = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ ($b > 0$), 已知二次型矩阵 A 所有特征值之和为1, 之积为-12,

(1) 求 a, b

(2) 利用正交变换将其代为标准形, 并写出标准形和所用正交变换的正交矩阵

六、在次数不超过 n 的实系数多项式关于通常的多项式加法及数乘多项式乘法下所成的线性空间

$V = R[x]_n$ 中定义变换 $T = T(f(x)) = f(x+1) - f(x), \forall f(x) \in R[x]_n$, 已知

$B = \left\{ \alpha_1 = 1, \alpha_2 = x, \dots, \alpha_{n+1} = \frac{1}{n!} x(x-1) \cdots (x-n+1) \right\}$ 是 V 的一个基,

(1) 证明 T 是 V 的一个线性变换

(2) 求 T 在 B 这组基下的矩阵

学解 《线性代数B》历年题

七、设 A 是 n 阶可逆实对称矩阵, B 是 n 阶实反对称矩阵(即 $B^T = -B$)且 $AB = BA$, 证明:

(1) $A^{-1}B$ 是反对称矩阵

(2) $A+B$ 是可逆矩阵

2018-2019 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空选择题

1、【正解】0

【学解】 $|A+B| = |A^T+B^T| = |A^{-1}+B^{-1}| = |A^{-1}(A+B)(B^{-1})| = |A^{-1}||A+B||B^{-1}|$

$$|A+B| \frac{1}{|A||B|} = -|A+B|, \text{故 } |A+B| = 0$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10——向量的概念与运算

2、【正解】7

$$\text{【学解】 } A_{11} + A_{12} + A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 6 \\ 8 & x & y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & x-8 & y-8 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & x-8 \end{vmatrix} = 4(8-x) = 4$$

解得 $x = 7$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2——行列式的展开

3、【正解】0

【学解】由 $R(A) = r \leq n$, $R(A) \geq R(AB) \geq R(A) + R(B) - n = R(A)$, 故 $R(AB) = R(A)$

$$\text{因此 } R(AB) - R(A) = 0$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9——矩阵的秩和矩阵等价

4、【正解】-32

【学解】由题可知矩阵 A 的特征值分别为 $1, -1, 2$, 则 A^* 特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$, 即 $-2, 2, -1$, 而 A^{-1} 特

征值则为 $\frac{1}{\lambda}$, 即 $1, -1, \frac{1}{2}$, 故 $2A^{-1} - A^*$ 特征值为 $4, -4, 2$, 故

$$|2A^{-1} - A^*| = 4 \cdot (-4) \cdot 2 = -32$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19——特征值与特征向量

5、【正解】0

【学解】若矩阵等价，则矩阵的秩相同， $r(B) = r \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & -3 & 4 \end{pmatrix} = 2$

$$\text{故 } r(A) = 2 \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0, \text{ 故 } x = 0$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点9——矩阵的秩和矩阵等价

6、【正解】 m

$$\text{【学解】 } B = \begin{pmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ \ddots & & \\ 1 & & \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ \ddots & & \\ 1 & & \end{pmatrix}, \text{ 故 } |B| = \begin{vmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ \ddots & & \\ 1 & & \end{vmatrix}^2 |A| = m$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4——矩阵的概念和基本运算

7、【正解】 D

$$\text{【学解】 } (\alpha_1 + \alpha_2 \quad \alpha_2 - \alpha_3 \quad \alpha_3 - \alpha_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3), \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ 可逆, 故 } (\alpha_1 + \alpha_2 \quad \alpha_2 - \alpha_3 \quad \alpha_3 - \alpha_1) \text{ 也是基础解系}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点16——齐次线性方程组

8、【正解】 C

【学解】若两矩阵相似，则特征值相同，故 $|\lambda E_n - A| = |\lambda E_n - B|$ ，则(1)正确

两矩阵相似，特征值相同，则规范性的正负惯性系数相同，故必合同

【考点延伸】《考试宝典》知识点23——矩阵的合同

9、【正解】 B

$$\text{【学解】 } r(s_1 | s_2) \leq r(s_1) + r(s_2)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点9——矩阵的秩和矩阵等价

10、【正解】C

【学解】非齐次线性方程组有唯一解的充分必要条件是系数矩阵和增广矩阵的秩相等且等于 n

【考点延伸】《考试宝典》知识点17——非齐次线性方程组

二、【学解】 $A^X X = A^{-1} + 2X$

$$|A|A^{-1}X = A^{-1} + 2X$$

$$|A|X = E + 2AX$$

$$(|A|E - 2A)X = E$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 4$$

$$X = (|A|E - 2A)^{-1} = (4E - 2A)^{-1}$$

$$(4E - 2A) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -2 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{array} \right) \quad \therefore X = (XE - 2A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4——矩阵的概念和基本运算

$$\text{三、【学解】} (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 7 \\ 1 & -5 & 10 & -9 \\ 3 & -1 & 15 & 3-2a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \\ 0 & -6 & 7 & -12 \\ 0 & -4 & 6 & -2a-6 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2-2a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2-2a \end{pmatrix}$$

由于线性相关, 故 $2-2a=0$, $a=1$, α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

$$\alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11——向量组的线性相关和线性表示

四、【学解】(1) 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix}$, 向量 $\beta = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$AX = \beta, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \text{ 有三线性无关解, 则 } r(A) = 2$$

$$(2) A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a \end{pmatrix}, \text{ 若 } r(A) = 2, \text{ 则 } \frac{1-a}{-1} = \frac{3-a}{1} = \frac{b-a}{-5}$$

$$\Rightarrow a=2, b=-3$$

$$(A|\beta) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{则运行 } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad k_1, k_2 \in R$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17——非齐次线性方程组

五、【学解】 $f(x_1, x_2, x_3) = [x_1 \ x_2 \ x_3] \begin{bmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = X^T A X$

(1) 由 $a+2+(-2)=1$, 故: $a=1$

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{vmatrix} = -4 - 2b^2 = -12, \text{ 又 } b > 0, \text{ 故: } b=2$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)[(\lambda-1)(\lambda+2)-4] = (\lambda-2)^2(\lambda+3)$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -3$$

$$(2E - A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 取单位正交特征向量}$$

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(-3E - A) = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$Q = [\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-5}{\sqrt{30}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad Q^T = Q^{-1}, \text{ 故 } X = QY, Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$$f = X^T A X = Y^T Q^T A Q Y = 2y_1^2 + 2y_1^2 - 3y_3^2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22——二次型

六、【学解】(1) $T(f(x)) = f(x+1) - f(x)$

$$T(f(y)) = f(y+1) - f(y)$$

$$\text{而 } T(f(x) + f(y)) = f(x+1) + f(y+1) - f(x) - f(y) = T(f(x)) + T(f(y))$$

$$T(kf(x)) = kf(x+1) - kf(x) = kT(f(x)), \text{ 故 } T \text{ 是 } V \text{ 的一个线性变换}$$

$$(2) \text{ 有 } T(a_1) = 1 - 1 = 0, T(a_2) = (x+1) - x = 1 = a_1, T(a_3) = \frac{(x+1)x}{2!} - \frac{x(x-1)}{2!}$$

$$= x = a_2, \dots, T(a_{n+1}) = a_n, \text{ 故在 } B \text{ 这组基下的矩阵为 } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15——向量空间

$$\text{七、【学解】(1) } (A^{-1}B)^T = B^T(A^{-1})^T = -B(A^T)^{-1} = -BA^{-1}$$

$$AB = BA \rightarrow B = A^{-1}BA, -BA^{-1} = -A^{-1}B$$

$$\text{故 } (A^{-1}B)^T = -A^{-1}B, \text{ 故 } A^{-1}B \text{ 为反对称矩阵}$$

$$(2) \text{ 设 } \lambda, \alpha \text{ 分别为 } A^{-1}B \text{ 的特征值特征向量, 则 } A^{-1}B\alpha = \lambda\alpha,$$

$$\text{则 } \alpha^T(A^{-1}B)\alpha = \alpha^T\lambda\alpha = \lambda\alpha^T\alpha$$

$$\text{同时 } \alpha^T(A^{-1}B)\alpha = \alpha^T(A^{-1}B)^T\alpha = -\alpha^T(A^{-1}B)\alpha = -\lambda\alpha^T\alpha$$

$$\text{故 } \lambda\alpha^T\alpha = -\lambda\alpha^T\alpha, \text{ 因此 } A^{-1}B \text{ 的实特征值只能为 } 0$$

$$\text{故 } |A+B| = |A(E+A^{-1}B)| = |A||E+A^{-1}B| = (-1)^n|A||-E-A^{-1}B| \neq 0$$

因此 $A+B$ 可逆

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4——矩阵的概念和基本运算