

APLICAÇÃO DA ESCALA DE ALDRETE E KROULIK NO PÓS OPERATÓRIO IMEDIATO

CENTRO CIRÚRGICO

POT CC No: 029

Edição: 09/10/2017 Versão: 000

Data Versão: 09/10/2017

Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Aplicar a Escala de Aldret e Kroulik para adultos na admissão, a cada 15 minutos na primeira hora, cada 30 minutos na segunda hora e a cada hora a partir da terceira hora, de acordo com a gravidade do paciente. O Enfermeiro estipulará o intervalo de aplicação da Escala de Aldrete e Kroulik após a avaliação inicial na admissão do paciente da SRPA.

2. ABRANGÊNCIA

Sala de recuperação pós anestésica.

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Enfermeiro.

4. MATERIAL

- 4.1 Prontuário do paciente;
- 4.2 Sistema de informações PAGU.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- 5.1 Avaliar todos os parâmetros da EAK, conforme segue:
 - 5.1.1 Atividade;
 - 5.1.2 Respiração;
 - 5.1.3 Circulação;
 - 5.1.4 Consciência;
 - 5.1.5 Saturação.
- 5.2 A pontuação em cada item é de 0 a 2 pontos para cada parâmetro clínico;
- 5.3 A soma dos pontos obtidos indica a possibilidade de alta da SRPA, sendo assim o total deve ser de 8 a 10 pontos;
- 5.4 Ao admitir o paciente o enfermeiro irá avaliar na beira do leito e após preencher o formulário de avaliação pós-anestésica;
- 5.5 Realizar avaliação conforme escala a seguir:



APLICAÇÃO DA ESCALA DE ALDRETE E KROULIK NO PÓS OPERATÓRIO IMEDIATO

CENTRO CIRÚRGICO

POT CC Nº: 029

Edição: 09/10/2017

Versão: 000

Data Versão: 09/10/2017

Página 2 de 3

1. Atividade	Nota	Adm	15	30	45	60	90	120	Alta
Movimento voluntário ou sob comando de									
4 extremidades									
Movimento voluntário ou sob comando de									
2 extremidades									
Incapaz de se mover	0								
2. Respiração		Adm	15	30	45	60	90	120	Alta
Respira profundamente e tosse									
Dispnéia ou respiração limitada									
Apnéia	0								
3. Circulação	Nota	Adm	15	30	45	60	90	120	Alta
TA variando do nível pré-anestésico + 20%	2								
TA variando do nível pré-anestésico 20 a	1								
49%	I								
TA variando do nível pré-anestésico + 50%	0								
4. Consciência		Adm	15	30	45	60	90	120	Alta
Totalmente desperto									
Desperta quando chamado									
Não responde	0								
5. Saturação	Nota	Adm	15	30	45	60	90	120	Alta
Capaz de manter saturação de O2 acima	2								
de 92% em ar ambiente									
Necessita de O2 para manter saturação	1								
acima 90%									
Saturação de O2 menor que 90% mesmo									
com suplementação de Oxigênio	0								
Total									

6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Indicado a todos os pacientes submetidos no pós-operatório imediato submetidos à anestesia.

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE/FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

8. REGISTROS

Registar no formulário de avaliação pós-anestésica.

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

A não adesão dos colaboradores.



APLICAÇÃO DA ESCALA DE ALDRETE E KROULIK NO PÓS OPERATÓRIO IMEDIATO

CENTRO CIRÚRGICO

POT CC Nº: 029

Edição: 09/10/2017

Versão: 000

Data Versão: 09/10/2017

Página 3 de 3

10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

Realizar capacitação e reforçar a importância do processo.

11. REFERÊNCIAS

SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. **Práticas Recomendadas**, 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013;

POTTER, A. P., et all, **Fundamentos de Enfermagem.** 6ª ed. Vol.2, Rio de Janeiro – ELSEVIER, 2005.

12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	09/10/2017	Enf ^a Liliani Mireider Mendonça Enf ^o Marcelo de Oliveira	Emissão do documento

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por				
09/11/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Gerente do Setor Liliani Mireider Mendonça	Diretor da Área Vitor Alves	Gerente de Enfermagem Angélica Bellinaso		