제 2 교시

수학 영역

5지선다형

- 1. ³√27×4^{-1/2} 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

- 2. 함수 $f(x) = x^2 2x + 3$ 에 대하여 $\lim_{h \to 0} \frac{f(3+h) f(3)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4
- **⑤** 5

- **3.** 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} (2a_k + 3) = 60$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?
 - [3점]

- ① 10

- ⑤ 30

4. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 f(x)가

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 4 - f(1)$$

- 을 만족시킬 때, f(1)의 값은? [3점]
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 다항함수 f(x)에 대하여 함수 g(x)를

$$g(x) = (x^3 + 1)f(x)$$

라 하자. f(1) = 2, f'(1) = 3일 때, g'(1)의 값은? [3점]

- ① 12
- 2 14
- ③ 16
- **4** 18
- ⑤ 20

- 6. $\cos \theta < 0$ 이고 $\sin (-\theta) = \frac{1}{7} \cos \theta$ 일 때, $\sin \theta$ 의 값은? [3점]

- $4 \frac{\sqrt{2}}{10}$ $5 \frac{3\sqrt{2}}{10}$

- 7. 상수 a(a>2)에 대하여 함수 $y=\log_2(x-a)$ 의 그래프의 점근선이 두 곡선 $y = \log_2 \frac{x}{4}$, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB} = 4$ 일 때, a의 값은? [3점]
 - ① 4
- ② 6
- 3 8
- **4** 10
- ⑤ 12

- 8. 두 곡선 $y=2x^2-1$, $y=x^3-x^2+k$ 가 만나는 점의 개수가 2가 되도록 하는 양수 *k*의 값은? [3점]
 - 1
- 2 2 3 3 4 4
- - **⑤** 5

9. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k-1)a_k} = n^2 + 2n$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{10}{21}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{16}{21}$ ⑤ $\frac{6}{7}$


10. 양수 k에 대하여 함수 f(x)는

$$f(x) = kx(x-2)(x-3)$$

이다. 곡선 y = f(x)와 x 축이 원점 O와 두 점 P, $Q(\overline{OP} < \overline{OQ})$ 에서 만난다. 곡선 y=f(x)와 선분 OP로 둘러싸인 영역을 A, 곡선 y=f(x)와 선분 PQ로 둘러싸인 영역을 B라 하자.

일 때, *k*의 값은? [4점]

- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$




4

수학 영역

11. 그림과 같이 실수 t(0 < t < 1)에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 중에서 직선 y = 2tx - 1과의 거리가 최소인 점을 P라 하고, 직선 OP가 직선 y = 2tx - 1과 만나는 점을 Q라 할 때,

 $\lim_{t\to 1-} \frac{\overline{PQ}}{1-t}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]



12. $a_2 = -4$ 이고 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 을 $b_n = a_n + a_{n+1} (n \geq 1)$ 이라 하고, 두 집합 A, B를

$$A = \left\{a_1,\, a_2,\, a_3,\, a_4,\, a_5\right\}, \quad B = \left\{b_1,\, b_2,\, b_3,\, b_4,\, b_5\right\}$$

라 하자. $n(A\cap B)=3$ 이 되도록 하는 모든 수열 $\left\{a_n\right\}$ 에 대하여 a_{20} 의 값의 합은? [4점]

- ① 30
- ② 34
- ③ 38
- **4** 42
- ⑤ 46


13. 그림과 같이

$$\overline{BC} = 3$$
, $\overline{CD} = 2$, $\cos(\angle BCD) = -\frac{1}{3}$, $\angle DAB > \frac{\pi}{2}$

인 사각형 ABCD에서 두 삼각형 ABC와 ACD는 모두 예각삼각형이다. 선분 AC를 1:2로 내분하는 점 E에 대하여 선분 AE를 지름으로 하는 원이 두 선분 AB, AD와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 각각 P_1 , P_2 라 하고,

선분 CE를 지름으로 하는 원이 두 선분 BC, CD와 만나는 점 중 C가 아닌 점을 각각 Q_1 , Q_2 라 하자.

 $\overline{P_1P_2}:\overline{Q_1Q_2}=3:5\sqrt{2}$ 이고 삼각형 ABD의 넓이가 2일 때, $\overline{AB} + \overline{AD}$ 의 값은? (단, $\overline{AB} > \overline{AD}$) [4점]



① $\sqrt{21}$ ② $\sqrt{22}$ ③ $\sqrt{23}$ ④ $2\sqrt{6}$

14. 실수 $a(a \ge 0)$ 에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \ge 0)$ 에서의 속도 v(t)를

$$v(t) = -t(t-1)(t-a)(t-2a)$$

라 하자. 점 P가 시각 t=0일 때 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 a에 대하여, 시각 t=0에서 t=2까지 점 P의 위치의 변화량의 최댓값은? [4점]

$$\bigcirc 1 \frac{1}{5}$$

$$2 \frac{7}{30}$$

①
$$\frac{1}{5}$$
 ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{4}{15}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

$$\bigcirc \frac{1}{3}$$

수학 영역

15. 자연수 k에 대하여 다음 조건을 만족시키는 수열 $\left\{a_n\right\}$ 이 있다.

$$a_1 = k$$
이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \left\{ \begin{array}{ll} a_n + 2n - k & \left(a_n \leq 0\right) \\ \\ a_n - 2n - k & \left(a_n > 0\right) \end{array} \right.$$

이다.

 $a_3 imes a_4 imes a_5 imes a_6 < 0$ 이 되도록 하는 모든 k의 값의 합은? [4점]

- 10
- 2 14
 - ③ 18 ④ 22
- ⑤ 26

단답형

16. 부등식 $2^{x-6} \le \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 을 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합을 구하시오. [3점]

17. 함수 f(x)에 대하여 $f'(x) = 8x^3 - 1$ 이고 f(0) = 3일 때, f(2)의 값을 구하시오. [3점]

수학 영역

7

- 18. 두 상수 a, b에 대하여 삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx + a$ 는 x = 1에서 극소이다. 함수 f(x)의 극솟값이 -2일 때, 함수 f(x)의 극댓값을 구하시오. [3점]
- 20. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 f(x)에 대하여 함수

$$g(x) = \int_{0}^{x} f(t) dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, f(9)의 값을 구하시오. [4점]

 $x \ge 1$ 인 모든 실수 x에 대하여 $g(x) \ge g(4)$ 이고 $|g(x)| \ge |g(3)|$ 이다.

19. 두 자연수 a, b에 대하여 함수

$$f(x) = a\sin bx + 8 - a$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, a+b의 값을 구하시오. [3점]

- (가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \ge 0$ 이다.
- (나) $0 \le x < 2\pi$ 일 때, x에 대한 방정식 f(x) = 0의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

8

수학 영역

21. 실수 t에 대하여 두 곡선 $y=t-\log_2 x$ 와 $y=2^{x-t}$ 이 만나는 점의 x좌표를 f(t)라 하자.

<보기>의 각 명제에 대하여 다음 규칙에 따라 A, B, C의 값을 정할 때, A+B+C의 값을 구하시오. (단, $A+B+C\neq 0$) [4점]

- 명제 ㄱ이 참이면 A=100, 거짓이면 A=0이다.
- 명제 ㄴ이 참이면 B=10, 거짓이면 B=0이다.
- 명제 ㄷ이 참이면 C=1, 거짓이면 C=0이다.

- $\neg . f(1) = 1$ 이고 f(2) = 2이다.
- ㄴ. 실수 t의 값이 증가하면 f(t)의 값도 증가한다.
- \Box . 모든 양의 실수 t에 대하여 $f(t) \ge t$ 이다.

22. 정수 $a(a \neq 0)$ 에 대하여 함수 f(x)를

$$f(x) = x^3 - 2ax^2$$

이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k의 값의 곱이 -12가 되도록 하는 a에 대하여 f'(10)의 값을 구하시오. [4점]

함수 f(x)에 대하여

$$\left\{\frac{f\left(x_{1}\right)-f\left(x_{2}\right)}{x_{1}-x_{2}}\right\}\times\left\{\frac{f\left(x_{2}\right)-f\left(x_{3}\right)}{x_{2}-x_{3}}\right\}<0$$

을 만족시키는 세 실수 $x_1,\,x_2,\,x_3$ 이 열린구간 $\left(k,\,k+\frac{3}{2}\right)$ 에 존재한다.

- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

5지선다형

- **23.** 포물선 $y^2 = -12(x-1)$ 의 준선을 x = k라 할 때, 상수 k의 값은? [2점]
 - ① 4

- ② 7 ③ 10 ④ 13
- ⑤ 16
- 24. 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여

$$2\overrightarrow{AB} + p\overrightarrow{BC} = q\overrightarrow{CA}$$


일 때, p-q의 값은? (단, p와 q는 실수이다.) [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

25. 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD에서

$$(\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{BC}) \cdot (\overrightarrow{AC} + 3k\overrightarrow{CD}) = 0$$

일 때, 실수 *k*의 값은? [3점]



- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

26. 두 초점이 F(12,0), F'(-4,0)이고, 장축의 길이가 24인 타원 C가 있다. $\overline{F'F} = \overline{F'P}$ 인 타원 C 위의 점 P에 대하여 선분 F'P의 중점을 Q라 하자. 한 초점이 F'인 타원

 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이 점 Q를 지날 때, $\overline{PF} + a^2 + b^2$ 의 값은?

- (단, a와 b는 양수이다.) [3점]
- ① 46
- ② 52 ③ 58
- **4** 64
- ⑤ 70

- 27. 포물선 $(y-2)^2 = 8(x+2)$ 위의 점 P와 점 A(0,2)에 대하여 $\overline{OP} + \overline{PA}$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P를 P $_0$ 이라 하자. $\overline{OQ} + \overline{QA} = \overline{OP}_0 + \overline{P}_0\overline{A}$ 를 만족시키는 점 Q에 대하여 점 Q의 y좌표의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M^2 + m^2$ 의 값은? (단, O는 원점이다.) [3점]
 - ① 8
- 2 9
- ③ 10
 - 10 ④ 11
- ⑤ 12
- **28.** 좌표평면의 네 점 A(2,6), B(6,2), C(4,4), D(8,6)에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 점 X의 집합을 S라 하자.
 - $(7) \ \left\{ \left(\overrightarrow{OX} \overrightarrow{OD} \right) \cdot \overrightarrow{OC} \right\} \times \left\{ \left| \overrightarrow{OX} \overrightarrow{OC} \right| 3 \right\} = 0$
 - (나) 두 벡터 $\overrightarrow{OX} \overrightarrow{OP}$ 와 \overrightarrow{OC} 가 서로 평행하도록 하는 선분 AB 위의 점 P가 존재한다.

집합 S에 속하는 점 중에서 y좌표가 최대인 점을 Q, y좌표가 최소인 점을 R이라 할 때, $\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OR}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]

- ① 25
- ② 26
- 327
- **4** 28
- **⑤** 29

4

수학 영역(기하)


단답형

29. 두 점 F(c, 0), F'(-c, 0)(c>0)을 초점으로 하는 두 쌍곡선

$$C_1: x^2 - \frac{y^2}{24} = 1$$
, $C_2: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{21} = 1$

이 있다. 쌍곡선 C_1 위에 있는 제2사분면 위의 점 P에 대하여 선분 PF'이 쌍곡선 C_2 와 만나는 점을 Q라 하자.


 $\overline{PQ} + \overline{QF}$, $2\overline{PF'}$, $\overline{PF} + \overline{PF'}$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 직선 PQ의 기울기는 m이다. 60m의 값을 구하시오. [4점]



30. 직선 2x+y=0 위를 움직이는 점 P와
타원 2x²+y²=3 위를 움직이는 점 Q에 대하여

$$\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$$

를 만족시키고, x좌표와 y좌표가 모두 0 이상인 모든 점 X가 나타내는 영역의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. p+q의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]



- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.