









1. الأسماء والمرادفات

Foeniculum vulgare Mill.

الاسم: الشمر.

الفصيلة: الخيمية.

أسماء أخرى: السنوت أو الشمر المر او الرازيانج أو البسباس، الشمر الحلو او الحبة الحلوة.

2. الجزء المستخدم

الثمرة المجففة الناضجة.

3. دواعي الاستعمال

- 1. علاج الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات.
 - 2. الم الدورة الشهرية.
 - 3. طارد للبلغم.

4. كيفية الاستخدام:

- ثمار الشمر الناضجة المجففة الكاملة أو المطحونة في أكياس شاي الأعشاب مع 0.25 لتر من الماء المغلى.
 - مسحوق الشمر مستخلص الشمر السائل باستخدام الماء كمذيب.
 - خلاصة الشمر الجافة باستخدام مزيج من الإيثانول والماء بتركيزات مختلفة.
 - زيت الشمر.

5. أمثلة لأدوية في الصيدلية:

- 1. كبسو لات هربانا مكمل غذائي
 - 2. أفتر ميلز كبسول
 - 3. دای جیست ایز کبسول
- 4. أكياس شاي أعشاب رويال ريجيم

6. الجرعة والاستخدام:

الجرعة: (12 سنة وما فوق) الجرعة المقبولة / يوم = 10 ميكرو غرام × وزن الجسم (كجم). مدة الاستخدام: لا يجب تناوله لأكثر من أسبوعين للبالغين وأسبوع واحد للأطفال الذين يعانون من أعراض خفيفة مؤقتة وتحت إشراف طبي.

7. الآثار الجانبية والسمية:

التفاعلات تحسسية للشمر: قد تؤثر على الجلد أو الجهاز التنفسي وفي حالة حدوثها يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي. التفاعلات تحسسية لزيت الشمر: قد تؤثر على الجلد والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي قد يحدث نوبات، او هلوسة، او غثيان، او قيء، أو فقدان الشهية.

8. موانع الاستخدام:

- الحساسية للمواد الفعالة.
- لا يجب استخدام المستحضرات المحتوية على 0.05 جرام من زيت الشمر الأطفال الذين تقل أعمار هم عن سنة واحدة.

9. تحذيرات واحتياطات خاصة للاستخدام:

Pharmacognosy Department





- يجب على المرضى الذين يعانون من فرط الحساسية المعروفة تجاه المواد الفعالة للشمر ان يتجنبوا استخدام مستحضراته.
 - قد يسبب زيت الشمر العطري التهابات وتهيج الجهاز الهضمي.
 - قد يبطئ الشمر تخثر الدم، وقد يؤدي تناول الشمر إلى زيادة خطر النزيف.
- بسبب نشاطه الاستروجين، الجرعات الزائدة من زيت الشمر قد تؤثر على العلاج الهرموني، حبوب منع الحمل، والعلاج بالهر مونات البديلة.
- يجب استخدام الأطفال تحت 4 سنوات تحت إشراف طبى بسبب خطر تشنج الحنجرة وضيق التنفس وإثارة الجهاز العصبى.

10. التفاعلات الدوائية:

مضادات الاختلاج: قد يزيد الشمر من خطر النوبات.

سيبروفلوكساسين: يؤثر الشمر على امتصاص والتخلص من سيبروفلوكساسين. إذا تم استخدام الاثنين بشكل متزامن، فيجب فصل جرعاتهما بساعتين على الأقل.

11. الخصوبة والحمل والرضاعة:

- يمكن استخدام الشمر أثناء الحمل والرضاعة بالجرعة الموصى بها.
 - لا توجد بيانات خصوبة متاحة.

12. التأثيرات على القدرة على القيادة واستخدام الآلات:

لم يتم إجراء أي دراسات حول التأثير على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

13. المصادر

- **1.** WHO monographs on selected medicinal plants (2007). Monographs on selected medicinal plants, **3**, 136-144.
- **2.** Community Herbal Monograph on *Foeniculum vulgare* Miller Subsp. *vulgare*, Fructus (2007). Committee on herbal Medicine Products (HMPC).
- **3.** Faudale, M., Viladomat, F., Bastida, J., Poli, F. and Codina, C. (2008). Antioxidant activity and phenolic composition of wild, edible, and medicinal fennel from different Mediterranean countries. *J. Agric. Food Chem.* **56**, 1912–1920.
- **4.** Community Herbal Monograph on *Foeniculum vulgare* Miller Subsp. *vulgare*, Aetheroleum (2007). Committee on herbal Medicine Products (HMPC).
- **5.** https://escop.com/wp-content/uploads/edd/2019/03/Foeniculi-fructus-ESCOP 2019.pdf
- 6. Mosby's Handbook of Herbs and Natural Supplements .4th ed., ISBN: 978-0-323-05741-7
- 7. http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/monoReg.do?id=50&lang=eng
- 8. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-311/fennel
- **9.** https://www.ema.europa.eu/en/documents/public-statement/publicstatement- use-herbal-medicinal-products-containing-estragole_en.pdf
- **10.** PV safety report on fennel oil. EPVC-EDA, 12/6/2022.
- **11.** PDR for Herbal Medicines (2002). Montvale, NJ: Medical Economics Company, 2nd ed., ISBN 1-56363-361-2.
- 12. https://www.rxlist.com/fennel/supplements. htm