

Baccalauréat 2013 session Normale

Exercice 1 (3points)

Une urne contient 4boules blanches et 2boules noires indiscernables au toucher.

On effectue au hasard un tirage de 2 boules simultanément de l'urne.

On note A_0 l'événement « on a obtenu aucune boule noire »

On note A_1 l'événement « on a obtenu une seule boule noire »

On note A_2 l'événement « on a obtenu deux boules noires »

Soit x la variable aléatoire qui, associe le nombre de boules noires tirées.

Parmi les réponses proposées pour chaque question ci-après, une seule réponse est exacte.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Le nombre de tirages possibles est :	C_6^2	A_6^2	6^2
2	La probabilité $p(A_0)$ est :	$\frac{4}{6}$	$\frac{6}{15}$	$\left(\frac{4}{6}\right)^2$
3	La probabilité $p(A_1)$ est :	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$
4	La probabilité $p(A_2)$ est :	$\frac{4}{6}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{1}{15}$
5	L'espérance mathématique de X est :	$\frac{2}{3}$	$\frac{16}{15}$	4

Recopie et complète le tableau suivant en choisissant la bonne réponse.

Aucune justification n'est demandée :

Question	1	2	3	4	5
Réponse					

Exercice 2 (5points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1.a) Résoudre dans \mathbb{C} l'équation : $(E_1) \quad z^2 + 2z + 10 = 0$

On note z_1 et z_2 ses solutions avec $I_m(z_2) \leq 0$

b) Résoudre dans \mathbb{C} l'équation : $(E_2) \quad z^2 - 4z + 20 = 0$

On note z_3 et z_4 ses solutions avec $I_m(z_4) \leq 0$

2) on considère les points A, B, K, L et E d'affixes respectives :

$$z_A = z_1 ; z_B = z_2 , z_K = z_3 , z_L = z_4 \text{ et } z_E = z_3 - 2i$$

a) Placer les points A, B, K, L et E dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

b) Écrire $z_E = z_3 - 2i$ sous forme algébrique et trigonométrique.

c) Déterminer la nature du quadrilatère ABLE et du triangle AKE.

3) Pour tout nombre complexe z tel que $z \neq -1 + 3i$ on pose : $f(z) = \frac{z-2-4i}{z+1-3i}$

Déterminer et représenter dans le même repère les ensembles des points M du plan d'afixe z dans chacun des cas suivants :

* Γ_1 tel que $|f(z)| = 1$

* Γ_2 tel que $|f(z) - 1| = \sqrt{10}$

Exercice 3 (4points)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 6$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$U_{n+1} = 3U_n + 10n - 13$$

1a) Calculer u_1, u_2 et vérifier que $U_3 = 43$

b) Justifier que la suite numérique (u_n) n'est ni géométrique ni arithmétique.

2) On définit la suite numérique (v_n) par : pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $V_n = U_n + 5n - 4$

a) Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. Exprimer v_n en fonction de n .

b) A partir de quel terme a-t-on $V_n \geq 2013$

c) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = 2 \times 3^n - 5n + 4$

3) Pour tout entier naturel n , on pose $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$.

Déterminer l'expression de S_n en fonction de n .

Exercice 4 (8points)

Partie A

On considère la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par : $g(x) = x^2 - 3 + 2\ln x$

1a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

b) Calculer la dérivée $g'(x)$ et dresser le tableau de variation de g .

2a) Montrer que g réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on déterminera.

b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α .

Vérifier que $1,34 \leq \alpha \leq 1,35$.

c) En déduire le signe de la fonction g sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

Partie B

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = x - 2 + \frac{1 - \ln x}{x^2}$

On note Γ sa courbe représentative dans le plan, muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé

1a) Démontre que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 2)) = 0$

b) Interpréter graphiquement les limites précédentes

c) Étudier le signe de $d(x) = f(x) - (x - 2)$, Résumer dans un tableau et interpréter graphiquement.

2a) Calculer $f'(x)$ et justifier que $f'(x)$ a même signe que $g(x)$

b) Montrer que $f(\alpha) = \frac{3\alpha^3 - 4\alpha^2 - 1}{2\alpha^2}$ et donner une valeur approchée de $f(\alpha)$ à 10^{-1} près

c) En déduire le tableau de variation de f

3a) Donner l'équation de la tangente T à Γ au point A d'abscisse $x_0 = 1$

b) Montrer que la courbe Γ coupe l'axe des abscisses en un deuxième point autre que A d'abscisse β telle que $1,9 \leq \beta \leq 2$

c) Tracer l'allure de la courbe dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$

4) Soit n un entier naturel $n \geq 3$, on considère l'aire du domaine E du plan compris entre la courbe et les droites d'équations respectives $y = x - 2$, $x = 3$ et $x = n$

a) Justifier que cette aire, exprimé en cm^2 , est donnée par : $I_n = \int_3^n \frac{n-1+\ln x}{x^2} dx$

b) Calculer $J_0 = \int_3^n \frac{\ln x}{x^2} dx$ à l'aide d'une intégration par parties. En déduire I_n en fonction de n

c) Calculer la limite de l'aire I_n du domaine E quand n tend vers $+\infty$

Corrigé baccalauréat 2013 session Normale

Exercice 1

Question n°	1	2	3	4	5
Réponse	A	B	A	C	A

Exercice 2

1a) $z^2 + 2z + 10 = 0$

$$\Delta = 4 - 40 = -36 = 36i^2 = (6i)^2$$

$$z_1 = \frac{-2 + 6i}{2} = -1 + 3i$$

$$z_2 = \frac{-2 - 6i}{2} = -1 - 3i$$

$$S = \{-1 + 3i; -1 - 3i\}$$

b) $z^2 - 4z + 20 = 0$

$$\Delta = 4 - 80 = -64 = 64i^2 = (8i)^2$$


$$z_3 = \frac{4 + 8i}{2} = 2 + 4i$$

$$z_4 = \frac{4 - 8i}{2} = 2 - 4i$$

$$\Rightarrow S = \{2 + 4i; 2 - 4i\}$$

2) $z_A = z_1 = -1 + 3i$; $z_B = z_2 = -1 - 3i$, $z_K = z_3 = 2 + 4i$, $z_L = z_4 = 2 - 4i$,
 $z_E = z_3 - 2i = 2 + 4i - 2i = 2 + 2i$

a)



b) $|z_E| = |2 + 2i| = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

$$\arg z_E = \arg(2 + 2i) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

$$z_E = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

c)

$$\text{le milieu du segment}[AL] = \frac{Z_A + Z_L}{2} = \frac{-1 + 3i + 2 - 4i}{2} = \frac{1 - i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$\text{le milieu du segment}[BE] = \frac{Z_B + Z_E}{2} = \frac{-1 - 3i + 2 + 2i}{2} = \frac{1 - i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$$

Les segments $[AL]$ et $[BE]$ ont le même milieu donc le quadrilatère ABLE est un parallélogramme.

$$AE = |z_E - z_A| = |2 + 2i + 1 - 3i| = |3 - i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

$$AK = |z_K - z_A| = |2 + 4i + 1 - 3i| = |3 + i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

$$AE = AK = \sqrt{10} \Rightarrow \text{Le triangle AKE est isocèle en A}$$

$$3) f(z) = \frac{z-2-4i}{z+1-3i}$$

$$* |f(z)| = 1 \Rightarrow$$

$$\left| \frac{z-2-4i}{z+1-3i} \right| = 1$$

$$\left| \frac{z-(2+4i)}{z-(-1+3i)} \right| = 1$$

$$\left| \frac{Z_M - Z_K}{Z_M - Z_A} \right| = 1$$

$$\frac{KM}{AM} = 1$$

$$KM = AM$$

$\Rightarrow \Gamma_1$ Est la médiatrice du segment $[AK]$.

$$* |f(z) - 1| = \sqrt{10} \Rightarrow$$

$$\left| \frac{z-2-4i}{z+1-3i} - 1 \right| = \sqrt{10} \Rightarrow$$

$$\left| \frac{z-2-4i-z-1+3i}{z+1-3i} \right| = \sqrt{10} \Rightarrow$$

$$\left| \frac{-3-i}{z+1-3i} \right| = \sqrt{10} \Rightarrow$$

$$\frac{\sqrt{10}}{|z+1-3i|} = \sqrt{10} \Rightarrow$$

$$\sqrt{10}|z+1-3i| = \sqrt{10} \Rightarrow$$

$$|z+1-3i| = 1 \Rightarrow$$

$$|Z_M - (-1+3i)| = 1 \Rightarrow$$

$$|Z_M - Z_A| = 1 \Rightarrow$$

$$AM = 1$$

Γ_2 est le cercle de centre A et de rayon $r = 1$

Corrigé l'Exercice 3

$$\begin{cases} U_0 = 6 \\ U_{n+1} = 3U_n + 10n - 13 \end{cases}$$

$$1a) U_1 = 3U_0 - 13 = 3 \times 6 - 13 = 18 - 13 = 5$$

$$U_2 = 3U_1 + 10 - 13 = 3 \times 5 + 10 - 13 = 15 + 10 - 13 = 12$$

$$U_3 = 3U_2 + 10 \times 2 - 13 = 3 \times 12 + 20 - 13 = 36 + 20 - 13 = 43$$

b)

$$\begin{cases} U_1 - U_0 = 5 - 6 = -1 \\ U_2 - U_1 = 12 - 5 = 7 \end{cases} \Rightarrow \boxed{U_1 - U_0 \neq}$$

$\boxed{U_2 - U_1} \Rightarrow (U_n)$ n'est pas une suite arithmétique

$$\begin{cases} \frac{U_1}{U_0} = \frac{5}{6} \\ \frac{U_2}{U_1} = \frac{12}{5} \end{cases} \Rightarrow \boxed{\frac{U_1}{U_0} \neq \frac{U_2}{U_1}} \Rightarrow (U_n) \text{ n'est pas une suite géométrique}$$

$$2^a) V_n = U_n + 5n - 4$$

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= U_{n+1} + 5(n+1) - 4 \\ &= 3U_n + 10n - 13 + 5n + 5 - 4 \\ &= 3U_n + 15n - 12 \\ &= 3(U_n + 5n - 4) \\ V_{n+1} &= 3V_n \end{aligned}$$

(V_n) est une suite géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme

$$v_0 = U_0 - 4 = 6 - 4 = 2$$

$$V_n = V_0 q^n = 2 \times 3^n$$

$$b) V_n \geq 2013 \Rightarrow 2 \times 3^n \geq 2013$$

$$\Rightarrow 3^n \geq \frac{2013}{2}$$

$$\Rightarrow n \ln 3 \geq \ln \left(\frac{2013}{2} \right)$$

$$\Rightarrow n \geq \frac{\ln \left(\frac{2013}{2} \right)}{\ln 3}$$

$$v_n \geq 2013 \Rightarrow n \geq \frac{6,914234245}{1,098612289} = 6,29360723$$

$V_n \geq 2013$ à partir de V_7

$$c) V_n = U_n + 5n - 4 \Rightarrow U_n = V_n - 5n + 4$$

$$\Rightarrow U_n = 2 \times 3^n - 5n + 4$$

$$3) S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$$

(S_n) est la somme de la suite géométrique (V_n) et la suite arithmétique (w_n) définie par

$$w_n = -5n + 4$$

$$D'où S_n = \frac{V_0}{1-q} (1 - q^{n+1}) + \frac{(n+1)(w_0 + w_n)}{2}$$

$$S_n = \frac{2}{1-3} (1 - 3^{n+1}) + \frac{(n+1)(4 - 5n + 4)}{2}$$

$$S_n = -(1 - 3^{n+1}) + \frac{(n+1)(8 - 5n)}{2}$$

$$S_n = -1 + 3^{n+1} + \frac{8n - 5n^2 + 8 - 5n}{2}$$

$$S_n = -1 + 3^{n+1} + \frac{3n - 5n^2 + 8}{2}$$

$$S_n = -1 + 3^{n+1} + \frac{3}{2}n - \frac{5}{2}n^2 + 4$$

$$S_n = 3 + 3^{n+1} + \frac{3}{2}n - \frac{5}{2}n^2$$

Exercice 4

Partie A

$$g(x) = x^3 - 3 + 2\ln x$$

$$1a) \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^3 - 3 + 2\ln x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 3 + 2\ln x) = +\infty - 3 + \infty = +\infty$$

$$b) g'(x) = 3x^2 + \frac{2}{x} > 0$$

TV de g

X	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

2a) g est continue et strictement croissante de $]0, +\infty[$ vers $J=\mathbb{R}$ donc g réalise une bijection.

b) g réalise une bijection et change de signe une seule fois donc il existe un unique réel $\alpha > 0$ tel que $g(\alpha) = 0$

$$g(1,34) < 0 \text{ et } g(1,35) > 0 \Rightarrow g(1,34) \times g(1,35) < 0 \text{ donc } 1,34 < \alpha < 1,35$$

Signe de g(x)

$$c) \begin{cases} \text{Si } x \in]0, \alpha] \Rightarrow g(x) \leq 0 \\ \text{Si } x \in [\alpha, +\infty[\Rightarrow g(x) \geq 0 \end{cases}$$

Partie B

$$1a) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x - 2 + \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x - 2 + \frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2} \\
 &= 0 - 2 + \infty + \infty \\
 &= +\infty
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} x - 2 + \frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2} \\
 &= +\infty - 2 + 0 - 0 \\
 &= +\infty
 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) - (x - 2) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x - 2 + \frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2} - x + 2$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x - 2) = 0$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \Rightarrow \mathbb{I}$ admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x - 2) = 0 \Rightarrow \mathbb{I}$ admet une asymptote oblique d'équation $y = x - 2$

$$c) d(x) = f(x) - (x - 2)$$

$$d(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$x^2 > 0 \Rightarrow$ le signe de $d(x)$ est celui de $1 - \ln x$

$$d(x) = 0 \Rightarrow 1 - \ln x = 0$$

$$\Rightarrow \ln x = 1$$

$$\Rightarrow x = e$$

x	$-\infty$	e	$+\infty$
Signe d(x)	+	0	-
P.R	Γ/D	0	D/Γ

2a)

$$f'(x) = 1 + \frac{-\frac{1}{x} \times x^2 - 2x(1 - \ln x)}{x^4}$$

$$f'(x) = 1 + \frac{-x - 2x + 2x \ln x}{x^4}$$

$$= 1 + \frac{-3x + 2x \ln x}{x^4}$$

$$= \frac{x^4 - 3x + 2x \ln x}{x^4}$$

$$= \frac{x^4}{x^4} \frac{x^3 - 3 + 2 \ln x}{x^4}$$

$$= \frac{x^3 - 3 + 2 \ln x}{x^3}$$

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$$

$x \in]0, +\infty[\Rightarrow x^3 > 0$ donc le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$

b)

$$f(\alpha) = \alpha - 2 + \frac{1 - \ln \alpha}{\alpha^2}$$

$$\begin{aligned}\text{on a } g(\alpha) = 0 &\Rightarrow \alpha^3 - 3 + 2\ln\alpha = 0 \\ &\Rightarrow 2\ln\alpha = 3 - \alpha^3 \\ &\Rightarrow \ln\alpha = \frac{3 - \alpha^3}{2}\end{aligned}$$

On remplace $\ln\alpha$ dans l'expression de $f(\alpha)$

$$f(\alpha) = \alpha - 2 + \frac{1 - \frac{(3 - \alpha^3)}{2}}{\alpha^2}$$

$$f(\alpha) = \alpha - 2 + \frac{2 - 3 + \alpha^3}{2\alpha^2}$$

$$f(\alpha) = \alpha - 2 + \frac{-1 + \alpha^3}{2\alpha^2}$$

$$f(\alpha) = \frac{2\alpha^3 - 4\alpha^2 - 1 + \alpha^3}{2\alpha^2}$$

$$f(\alpha) = \frac{3\alpha^3 - 4\alpha^2 - 1}{2\alpha^2}$$

$$f(\alpha) \cong -0,2$$

c) TV de f

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		0	
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

$$3a) f(x_0) = f(1) = 0$$

$$f'(x_0) = f'(1) = -2$$

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$


$$y = -2(x - 1)$$

$$y = -2x + 2$$

b) $f(1) = 0 \Rightarrow$ la courbe Γ coupe l'axe des abscisses en un premier A point d'abscisse 1
Puisque f change de signe 2 fois sur $]0, +\infty[$ donc il existe un deuxième point autre que A d'abscisse $\beta \in [\alpha, +\infty[$

$$\begin{cases} f(1,9) = -0,006 < 0 \\ f(2) = 0,076 > 0 \end{cases} \Rightarrow f(1,9) \times f(2) < 0 \Rightarrow 1,9 < \beta < 2$$

c)



4) Sur $[\beta, +\infty[$ on a $d(x) < 0 \Rightarrow I_n = -\int_3^n d(x) dx$

$$\Rightarrow I_n = -\int_3^n \frac{1-\ln x}{x^2} dx$$

$$\Rightarrow I_n = \int_3^n \frac{-1+\ln x}{x^2} dx$$

$$\text{b) } J_n = \int_3^n \frac{\ln x}{x^2} dx$$

$$\text{on pose } \begin{cases} u = \ln x \rightarrow u' = \frac{1}{x} \\ v' = \frac{1}{x^2} \rightarrow v = \frac{-1}{x} \end{cases}$$

\Rightarrow

$$J_n = \left[\frac{-\ln x}{x} \right]_3^n + \int_3^n \frac{1}{x^2} dx \Rightarrow$$

$$J_n = \frac{-\ln n}{n} + \frac{\ln 3}{3} + \left[\frac{-1}{x} \right]_3^n$$

d'où

$$J_n = \frac{-\ln n}{n} + \frac{\ln 3}{3}$$

$$I_n = \int_3^n \left(\frac{-1}{x^2} + \frac{\ln x}{x^2} \right) dx$$

$$I_n = \int_3^n -\frac{1}{x^2} dx + \int_3^n \frac{\ln x}{x^2} dx$$

$$I_n = \int_3^n -\frac{1}{x^2} dx + J_n$$

$$I_n = \left[\frac{1}{x} \right]_3^n + \frac{-\ln n}{n} + \frac{\ln 3}{3} - \frac{1}{n} + \frac{1}{3}$$

$$I_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{3} - \frac{\ln n}{n} + \frac{\ln 3}{3} - \frac{1}{n} + \frac{1}{3}$$

$$I_n = \frac{\ln 3}{3} - \frac{\ln n}{n}$$

c)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln 3}{3} - \frac{\ln n}{n} = \frac{\ln 3}{3}$$