

Exercice 1 (4,75pts)

Afin d'étudier la cinétique de décomposition de l'iodure d'hydrogène HI en diiode et dihydrogène, on place à la date $t=0$ dans un thermostat maintenu à 380°C des ampoules scellées identiques, contenant chacune la même quantité de matière en iodure d'hydrogène.

À la date t donnée, une ampoule est refroidie rapidement et ouverte.

Le diiode formé à cet instant est mis en solution et dosé par un volume V d'une solution de thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, de concentration C .

1.1. Pourquoi refroidit-on rapidement l'ampoule ? (0,5pt)

1.2. Écrire les demi-équations électroniques des couples oxydants réducteurs et l'équation bilan de la réaction correspondant au dosage. On donne : $E^\circ_{\text{I}_2/\text{I}^-} = 0,55\text{V}$ et $E^\circ_{\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 0,08\text{V}$ (1pt)


1.3. Montrer que la quantité de matière du diiode formée à la date t est donnée par la relation $n(\text{I}_2) = \frac{CV}{2}$ (0,75pt)

2. Les courbes représentatives de la fonction $C_0=f(t)$ sont données par la figure pour deux températures. Où C_0 représente la concentration en diiode.

2.1. Définir la vitesse instantanée de formation du diiode (1pt)

2.2. Calculer les vitesses de formation du diiode à $t=0$. (1pt)

2.3. Quel facteur cinétique ces deux expériences mettent-elles en évidence ? (0,5pt)



Exercice 2 (4,25pts)

1. On dispose d'un volume de 100mL d'une solution aqueuse S_A d'acide méthanoïque HCOOH de concentration molaire $C_A = 6 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$ et de $\text{pH} = 2,49$.

1.1. Donner la définition d'un acide faible et d'un acide fort. Cet acide est-il fort ou faible ? (0,75pt)

1.2. Écrire l'équation de la réaction entre cet acide et l'eau. (0,5pt)

1.3. Établir le tableau d'avancement. Calculer le taux d'avancement final τ de cette réaction. Conclure. (1pt)

2. Pour vérifier la valeur de la concentration C_A de la solution S_A , on réalise un dosage acido-basique colorimétrique.

Dans un bécher, on verse un volume $V_A = 5\text{mL}$ de cette solution et on y ajoute progressivement une solution aqueuse S_B d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,05\text{mol/L}$. La couleur de la solution dosée change de teinte si on verse un volume de 6mL au moment où le pH devient $\text{pH} = 8,7$.

2.1. Écrire l'équation de la réaction du dosage. (0,5pt)

2.2. Retrouver la valeur de C_A . (0,5pt)

2.3. Choisir, en justifiant la réponse, l'indicateur coloré adéquat pour repérer

| Indicateur coloré | Hélianthine | B.B.T | Bleu de thymol |
|-------------------|-------------|---------|----------------|
| Zone de virage | 3 - 4,4 | 6 - 7,6 | 8 - 9,6 |

l'équivalence parmi les indicateurs du tableau ci-dessus. (0,5pt)

2.4. À quoi correspond le pH du mélange lorsqu'on verse un volume de 3mL de soude ? (0,5pt)

Exercice 3(5,5pts)

Dans tout l'exercice les frottements sont négligeables

Un solide S assimilable à un point matériel de masse m est abandonné au point A de la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale (voir fig2).

Il glisse sur AB et arrive en B avec la vitesse V_B .

On donne $\alpha=30^\circ$ et $g=10\text{m/s}^2$.

1.1. Etablir l'équation horaire du mouvement du solide S sur AB. (1pt)

1.2. Calculer la longueur $l=AB$, en déduire les valeurs de la vitesse en B et en C. (1pt)


2. Le solide quitte la piste au point C pour tomber au point P sur l'axe Cx.

2.1. Etablir l'équation de la trajectoire du mobile entre C et P dans le repère (Cx;Cy) en fonction de V_B , α et g . (1pt)

2.2. Donner l'expression de la portée CP en fonction de V_B , α et g puis en fonction de l et α .

Calculer CP. (1,25pt)

2.3. Donner l'expression de la flèche en fonction de V_B , α et g . Pour quelle valeur de α cette flèche est-elle maximale ? (1,25pt)



Exercice 4(5,5pts)

Le poids de l'électron sera négligeable devant les autres forces appliquées.

1. Un faisceau d'électrons est émis sans vitesse par une cathode C et accéléré par une anode A à l'aide d'une différence de potentiel $U_0 = V_A - V_C$.

1.1. Déterminer le signe de U_0 appliquée entre C et A et calculer sa valeur si $AC=d_0=3\text{cm}$ et $E=6.10^3\text{V/m}$. (0,75pt)

1.2. Calculer la vitesse V_0 de l'électron lorsqu'il arrive en O'.

On donne : $e=1,6.10^{-19}\text{C}$, $m=9.10^{-31}\text{kg}$. (0,75pt)

2. En O, les électrons pénètrent avec la vitesse \vec{V}_0 dans une zone où règne un champ électrique dû à une tension U existant entre deux plaques P_1 et P_2 de longueur l et distantes de d . (voir fig3)

2.1. Etablir l'expression de l'équation de la trajectoire de l'électron entre les plaques. Donner cette expression en fonction de U_0 , U et d .

Préciser sa nature. (1pt)

2.2. Déterminer la valeur de la tension U si la déviation angulaire électrique est telle que $\tan\alpha=0,3$. On donne : $l=d=4\text{cm}$. (0,75pt)



3. On remplace le champ électrique \vec{E} par un champ magnétique \vec{B} crée dans une zone carré MNPQ de côté $a=4\text{cm}$.

Les électrons pénètrent dans cette zone au point O avec la vitesse \vec{V}_0 . (Voir fig4).

3.1. Déterminer la nature du mouvement de l'électron dans le champ magnétique \vec{B} . Donner l'expression du rayon de la trajectoire en fonction de m , e , B et U_0 . (1pt)

3.2. Déterminer la valeur de la déviation angulaire magnétique α' si les électrons sortent entre P et N. On donne : $B=2,25.10^{-4}\text{T}$. (0,5pt)

3.3. Quelle est la valeur de B pour que l'électron effectue un quart de cercle ? (0,75pt)



BAC-D-PC 2020

Exercice 1 :

Afin d'étudier la cinématique de décomposition de l'iodure d'hydrogène **HI** en diiode et dihydrogène, on place à la date **t = 0** dans un thermostat maintenu à **380°C** des ampoules scellées identiques, contenant chacune la même quantité de matière en iodure d'hydrogène.

À la date **t** donnée, une ampoule est refroidie rapidement et ouverte.

Le diiode formé à cet instant est mis en solution et dosé par un volume **V** d'une solution de thiosulfate de sodium **Na₂S₂O₃**, de concentration **C**.

1.1. Pourquoi refroidit-on rapidement l'ampoule?

1.2. Ecrire les demi-équations électroniques des Couples oxydants réducteurs et l'équation bilan de La réaction correspondant au dosage. On donne :

$$E_{I_2/I^-}^0 = 0,55V \text{ et } E_{S_2O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}}^0 = 0,08V$$

1.3. Montrer que la quantité de matière du diiode

Formée à la date **t** est donnée par la relation $n(I_2) = \frac{cV}{2}$

2. Les courbes représentatives de la fonction $C_0 = f(t)$


Sont données par la figure pour deux températures. Où C_0

Représente la concentration en diiode.

2.1. Définir la vitesse instantanée de formation du diiode.

2.2. Calculer les vitesses de formation du diiode à **t = 0**.

2.3. Quel facteur cinétique ces deux expériences mettent-elles en évidence?



Exercice 2 :

1. On dispose d'un volume de **100ml** d'une solution aqueuse **S_A** d'acide méthanoïque **HCOOH** de concentration molaire **C_A = 6.10⁻² mol/l** et de **PH = 2,49**.

1.1. Donner la définition d'un acide faible et d'un acide fort. Cet acide est-il fort ou faible?

1.2. Ecrire l'équation de la réaction entre cet acide et l'eau.

1.3. Etablir le tableau d'avancement. Calculer le taux d'avancement final **τ** de cette réaction. Conclure.

2. Pour vérifier la valeur de la concentration **C_A** de la solution **S_A**. On réalise un dosage acido-basique colorimétrique.

Dans un bécher, on verse un volume **V_A = 5ml** de cette solution et on y ajoute progressivement une solution aqueuse **S_B** d'hydroxyde de sodium de concentration **C_B = 0,05 mol/l**. La couleur de la solution dosée change de teinte si on verse un volume de **6ml** au moment où le **PH** devient **PH = 8,7**.

2.1. Ecrire l'équation de la réaction du dosage.

2.2. Retrouver la valeur de **C_A**.

2.3. Choisir, en justifiant la Réponse, l'indicateur coloré

| Indicateur coloré | Hélianthine | B.B.T | Bleu de thymol |
|-------------------|-------------|---------|----------------|
| Zone de virage | 3 - 4,4 | 6 - 7,6 | 8 - 9,6 |

Adéquat pour repérer l'équivalence parmi les indicateurs du tableau ci-dessus.

2.4. À quoi correspond le **PH** du mélange lorsqu'on verse un volume de **3ml** de soude?

Exercice 3 :

Dans tout l'exercice les frottements sont négligeables.

Un solide **S** assimilable à un point matériel de masse **m** est abandonné au point **A** de la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontal (voir fig2).

Il glisse sur **AB** et arrive en **B** avec la vitesse **V_B**.

On donne $\alpha = 30^\circ$ et $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1.1. Etablir l'équation horaire du mouvement

Du solide **S** sur **AB**.

1.2. Calculer la longueur $l = AB$, en déduire les Valeurs de la vitesse en **B** et en **C**.

2. Le solide quitte la piste au point **C** pour tomber


Au point **P** sur l'axe **Cx**.

2.1. Etablir l'équation de la trajectoire du mobile entre **C** et **P** dans le repère (**Cx**; **Cy**) en fonction de **V_B**, α et **g**.

2.2. Donner l'expression de la portée **CP** en fonction de **V_B**, α et **g** puis en fonction de **l** et α .

Calculer **CP**.

2.3. Donner l'expression de la flèche en fonction de **V_B**, α et **g**. Pour quelle valeur de α cette flèche est-elle maximale?



Exercice 4 :

Le poids de l'électron sera négligeable devant les autres forces appliquées.

1. Un faisceau d'électron est émis sans vitesse par une cathode **C** et accéléré par une anode **A** à l'aide d'une différence de potentiel $U_0 = V_A - V_C$.

1.1. Déterminer le signe de U_0 appliquée entre **C** et **A** et calculer Sa valeur si $AC = d_0 = 3 \text{ cm}$ et $E = 6 \cdot 10^3 \text{ V/m}$.

1.2. Calculer la vitesse **V₀** de l'électron lorsqu'il arrive en **O'**.

On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m = 9 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$.

2. En **O**, les électrons pénètrent avec la vitesse **V₀** dans une zone Où règne un champ électrique dû à une tension **U** existant entre Deux plaques **P₁** et **P₂** de longueur **l** et distantes de **d**. (voir fig3)

2.1. Etablir l'expression de l'équation de la trajectoire de l'électron Entre les plaques. Donner cette expression en fonction de **U₀**, **U** et **d**. Préciser sa nature.

2.2. Déterminer la valeur de la tension **U** si la déviation angulaire Électrique est telle que $\tan \alpha = 0,3$. On donne : $l = d = 4 \text{ cm}$.


3. On remplace le champ électrique \vec{E} par un champ magnétique \vec{B} crée dans une Zone carre **MNPQ** de coté $a = 4 \text{ cm}$.

Les électrons pénètrent dans cette zone au point **O** avec la vitesse **V₀**. (voir fig4)

3.1. Déterminer la nature du mouvement de l'électron dans le champ magnétique \vec{B} . Donner l'expression du rayon de la trajectoire en fonction de **m**, **e**, **B** et **U₀**.

3.2. Déterminer la valeur de la déviation angulaire magnétique α' si les électrons sortent entre **P** et **N**. On donne : $B = 2,25 \cdot 10^{-4} \text{ T}$.

3.3. Quelle est la valeur de **B** pour que l'électron effectue un quart de cercle?



Correction

Exercice 1 :

1.1. Pour provoquer un blocage cinétique de la décomposition de l'iodure d'hydrogène **HI**.

1.2. Les demi-équations : $\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}^-$; $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{S}_2\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^-$

L'équation bilan de la réaction : $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightarrow \text{S}_2\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$

1.3. À l'équivalence : $\frac{n(\text{I}_2)}{1} = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2} \Rightarrow n(\text{I}_2) = \frac{CV}{2}$

2.1. Définition de la vitesse de formation de I_2 C'est la dérivée de la concentration de I_2 par rapport au temps ce qui correspond la valeur du coefficient directeur de la tangente à la courbe au instant considéré.

2.2 On choisit deux points de la tangente :

Pour $\theta = 280^\circ \Rightarrow V_{0(\text{I}_2)} = 1,66 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l. min}$

Pour $\theta = 380^\circ \Rightarrow V_{0(\text{I}_2)} = 3,33 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l. min}$

2.3 Le facteur cinétique responsable à ces deux expériences est la température.

Exercice 2 :

1.1. Définition : L'acide faible est une espèce chimique qui réagit partiellement dans l'eau en donnant l'ion H_3O^+ .

Définition : L'acide fort est une espèce chimique qui réagit totalement dans l'eau en donnant l'ion H_3O^+ .

PH $\neq -\log C_A \Rightarrow \text{HCOOH}$ est un acide faible

1.2. L'équation de la réaction de **HCOOH** avec l'eau : $\text{HCOOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$

1.3. Le tableau d'avancement :

| | Avancement | HCOOH | + | H_2O | \rightleftharpoons | HCOO^- | + | H_3O^+ |
|---------|------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|---|------------------------|
| $t = 0$ | 0 | $n_A = 6 \cdot 10^{-3}$ | | Excès | | 0 | | 10^{-8} |
| $t > 0$ | X | $6 \cdot 10^{-3} - X$ | | Excès | | X | | X |
| t_f | X_f | $6 \cdot 10^{-3} - X_f$ | | Excès | | X_f | | X_f |

$$\tau = \frac{X_f}{n_A} = \frac{n(\text{H}_3\text{O}^+)}{n_A} = \frac{V \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{V \cdot C_A} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C_A} = \frac{10^{-2,49}}{6 \cdot 10^{-2}} = 0,054 = 5,4\% < 1$$

Conclusion : la réaction de l'acide méthanoïque et l'eau n'est pas totale, elle est limitée.

2.1. L'équation de la réaction du dosage : $\text{HCOOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O}$

2.2. À l'équivalence : $n_A = n_B \Leftrightarrow C_A V_A = C_B V_{BE} \Rightarrow C_A = \frac{C_B V_{BE}}{V_A} = 6 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$

2.3. L'indicateur coloré approprié de ce dosage est le **Bleu de thymol** car $\text{PH}_E = 8,7 \in [8 - 9,6]$

2.4. $n_A = 3 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$ et $n_B = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \Rightarrow n_A = 2n_B \Rightarrow$ La solution est tampon Donc le **PH** = **pka**

Exercice 3 :


1.1. L'équation horaire du mouvement : $\sum \vec{F}_{App} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} + \vec{R}_n = m\vec{a}$

Projection suivant (\overrightarrow{AB}) : $ma = mg \sin \alpha \Rightarrow a = g \sin \alpha$ donc : mr_{uv}

$$x = \frac{1}{2}at^2 + V_0t + x_0 \text{ Avec } V_0 = 0 \text{ et } x_0 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}at^2 = 2,5t^2$$

$$1.2. \sin \alpha = \frac{h}{l} \Rightarrow l = \frac{h}{\sin \alpha} = 2,5m$$

$$V_B^2 - V_A^2 = 2al \text{ Avec } V_A = 0 \text{ m/s} \Rightarrow V_B = \sqrt{2al} \Rightarrow V_B = 5 \text{ m/s}$$



$$\Delta E_{C \rightarrow C} = \sum W_{\vec{F}_{APP}} \Rightarrow E_{C(C)} - E_{C(B)} = W_{\vec{P}} + W_{\vec{R}_n} \text{ Avec } W_{\vec{P}} = 0J \text{ et } W_{\vec{R}_n} = 0J$$

$$\Rightarrow E_{C(C)} = E_{C(B)} \Rightarrow \text{Donc : } V_C = V_B = 5 \text{ m/s}$$

2.1. Les conditions initiales :

$$C(0;0) \quad \vec{V}_C = \begin{cases} V_{Cx} = V_C \cos \alpha \\ V_{Cy} = V_C \sin \alpha \end{cases}$$

$$\sum \vec{F}_{App} = m\vec{a} \Rightarrow m\vec{a} = \vec{P}$$

Projection suivant l'axe (\vec{Cx}) : $ma_x = 0 \Rightarrow a_x = 0 \Rightarrow mru \Rightarrow$

$$x = V_{Cx}t + x_C = V_C \cos \alpha t \quad (1)$$

Projection suivant l'axe (\vec{Cy}) :

$$ma_y = -p = -mg \Rightarrow a_y = -g = cst \Rightarrow mruv$$

$$y = \frac{1}{2}a_y t^2 + V_{Cy}t + y_C = -\frac{1}{2}gt^2 + V_C \sin \alpha t \quad (2)$$

De (1) $t = \frac{x}{V_C \cos \alpha}$ on remplace dans (2) on trouve : $y = -\frac{g}{2V_C^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x$ Avec $V_C = V_B$

$$y = -\frac{g}{2V_B^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x$$

$$2.2. \text{ L'expression de la portée } CP : P \in (Cx) \Rightarrow y_P = 0 \Rightarrow -\frac{g}{2V_B^2 \cos^2 \alpha} x_P^2 + \tan \alpha x_P = 0 \Rightarrow$$

$$\left(-\frac{g}{2V_B^2 \cos^2 \alpha} x_P + \tan \alpha\right) x_P = 0 \Rightarrow -\frac{g}{2V_B^2 \cos^2 \alpha} x_P + \tan \alpha = 0 \Rightarrow x_P = \frac{2V_B^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g}$$

$$\text{Donc : } CP = x_P = \frac{2V_B^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g} \text{ Avec } \sin 2\alpha = 2 \cos \alpha \sin \alpha \Rightarrow CP = \frac{V_B^2 \sin 2\alpha}{g}$$

$$\text{L'expression de la portée } CP \text{ en fonction de } l \text{ et } \alpha : CP = \frac{2V_B^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g} \text{ Avec } V_B = \sqrt{2al} =$$

$$\sqrt{2lg \sin \alpha} \Rightarrow CP = 4l \cos \alpha \sin^2 \alpha \quad \text{A.N : } CP = 2,16m$$

2.3. L'expression de la flèche h :

$$\text{Au sommet } V_y = 0 \Rightarrow -\frac{g}{V_B^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha = 0 \Rightarrow x = \frac{V_B^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g}$$

$$h = -\frac{g}{2V_B^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x \text{ On remplace } x \text{ par } x = \frac{V_B^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g} \text{ On trouve } h = \frac{V_B^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

Autre méthode : Le mouvement est $r.u.v$ suivant (Cy) : $V_{Sy}^2 - V_{Cy}^2 = 2a_y h$ Avec $V_{Sy} = 0$

$$\Rightarrow h = -\frac{V_{Cy}^2}{2a_y} \text{ Avec } a_y = -g \text{ et } V_{Cy} = V_C \sin \alpha \Rightarrow h = \frac{V_C^2 \sin^2 \alpha}{2g} \text{ Avec } V_C = V_B$$

$$\text{Donc : } h = \frac{V_B^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

$$\text{La flèche est maximale si } \sin^2 \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \mp \frac{\pi}{2}$$

Exercice 4 :

1.1. Les électrons sont chargés négativement, ils se déplacent de **C** vers **A** sous l'action de la force électrique \vec{F}_e . Les électrons sont donc attirés par **A** qui est chargée positivement ; **C** est alors chargée négativement c'est-à-dire que $V_A > V_C \Rightarrow V_A - V_C > 0 \Rightarrow U_0 > 0$

$$U_0 = d_0 E = 180V$$

1.2. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre **C** et **A**:

$$\Delta E_C = W_{\vec{F}_e} \Rightarrow E_C = -qU_0 \Rightarrow \frac{1}{2}mV_0^2 = eU_0 \Rightarrow V_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$$

$$V_0 = 8.10^6 \text{ m/s}$$

2.1. Les conditions initiales : $\mathbf{O} (x_0 = 0 ; y_0 = 0) \quad \vec{V}_0 \begin{cases} V_{0x} = V_0 \\ V_{0y} = 0 \end{cases}$

$$\sum \vec{F}_{App} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{F}_e = m\vec{a}$$

Projection suivant l'axe (ox): $m a_x = 0 \Rightarrow a_x = 0 \Rightarrow m.r.u$

$$x = V_{0x}t + x_0 \text{ Avec } V_{0x} = V_0 \text{ et } x_0 = 0 \Rightarrow x = V_0 t \quad (1)$$

Projection suivant l'axe (oy): $m a_y = F_e \Rightarrow a_y = \frac{|q|E}{m} = cst$

$$\Rightarrow m.r.u.v \quad y = \frac{1}{2} a_y t^2 + V_{0y}t + y_0 \text{ Avec } V_{0y} = 0 \text{ et } y_0 = 0$$

$$\Rightarrow y = \frac{|q|E}{2m} t^2 \text{ Avec } |q| = e \Rightarrow y = \frac{eE}{2m} t^2 \quad (2)$$

$$\text{De (1) } t = \frac{x}{V_0} \text{ on remplace dans (2) on trouve } y = \frac{eE}{2mV_0^2} x^2$$

L'expression de l'équation de la trajectoire en fonction de U_0, U et d :

$$y = \frac{eE}{2mV_0^2} x^2 \text{ Avec } E = \frac{U}{d} \text{ et } V_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}} \Rightarrow y = \frac{U}{4dU_0} x^2$$

La trajectoire est parabolique.

2.2. Soit les électrons sortent de ce champ par le point S (voir fig1) :

$$\tan \alpha = \frac{V_{ys}}{V_{xs}} = \frac{\frac{dy}{dt}_S}{\frac{dx}{dt}_S} = \frac{dy}{dx}_S = \frac{U}{2dU_0} x_S \text{ Avec } x_S = l = d$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{U}{2U_0} \Rightarrow U = 2U_0 \tan \alpha = 108V \Rightarrow \boxed{U = 108V}$$

$$\text{Autre méthode : } \tan \alpha = \frac{y_S}{x_S} = \frac{y_S}{l} = 2 \times \frac{y_S}{l} = 2 \times \frac{U}{4ldU_0} x_S^2 \text{ Avec } x_S = l = d$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{U}{2U_0} \Rightarrow U = 2U_0 \tan \alpha = 108V$$

3.1 La nature du mouvement :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}_{App} = \vec{F}_m \Rightarrow m\vec{a} = q\vec{V} \wedge \vec{B} \Rightarrow \vec{a} = \frac{q}{m} \cdot \vec{V} \wedge \vec{B}$$

À tout instant on a $\vec{a} \perp \vec{V} \Rightarrow$ l'accélération tangentielle est nulle

$$\Rightarrow a_t = \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow V = V_0 = cst \Rightarrow \text{Le mouvement est uniforme}$$

$$\text{Projection suivant l'axe normale : } a_n = \frac{V_0^2}{R} = \frac{|q|V_0 B}{m} \Rightarrow R = \frac{mV_0}{|q|B} = cst$$

\Rightarrow Le mouvement est circulaire

Donc : Le mouvement est circulaire uniforme.

$$\text{L'expression de } R \text{ en fonction de } m, e, B \text{ et } U_0 : R = \frac{mV_0}{|q|B}$$

$$\text{Avec } V_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}} \text{ et } |q| = e \Rightarrow R = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU_0}{e}}$$

3.2. Voir fig2

$$\sin \alpha' = \frac{a}{R} \text{ Avec } R = 20cm \Rightarrow \sin \alpha' = 0,2 \Rightarrow \alpha' = 20^\circ$$

3.3. La valeur de B pour que l'électron effectue un quart de cercle (voir fig3) :

$$R = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU_0}{e}} \Rightarrow B = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{2mU_0}{e}}$$

$$\text{Avec } R = \frac{a}{2} \text{ Comme l'électron effectue un quart de cercle.}$$

$$A.N : B = 2,25.10^{-3}T$$

