

Exercice 1 (3 points)

Soit (u_n) la suite numérique définie par $u_n = 3^n + n - 1$. On pose $v_n = u_{n+1} - u_n$ et $w_n = \ln\left(\frac{-1+v_n}{2}\right)$.

Parmi les réponses proposées pour chaque question ci-après, une seule est correcte.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La suite (u_n) est :	arithmétique	géométrique	ni arithmétique, ni géométrique	0.5 pt
2	La suite (u_n) est	convergente	divergente	bornée	0.5 pt
3	Si $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$, alors la valeur de S_n est	$\frac{3^{n+1}-1}{2} + \frac{(n+1)(n-2)}{2}$	$\frac{1-3^{n+1}}{-2} + \frac{(n+1)(n-1)}{2}$	$\frac{1-3^{n+1}}{2} + \frac{(n+1)(n-2)}{2}$	0.5 pt
4	Le terme général de la suite (v_n) est :	$v_n = 2 \times 3^n + 1$	$v_n = 2 \times 3^n + 2n + 1$	$v_n = 3^n + 1$	0.5 pt
5	Le plus petit entier naturel n tel que $v_n \geq 2019$ est :	$n = 6$	$n = 7$	$n = 8$	0.5 pt
6	Si $T_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$, alors la valeur de T_n est	$\frac{(n+1)^2}{2} \ln 3$	$\ln\left(\frac{3^{n+1}-1}{2}\right)$	$\frac{n^2+n}{2} \ln 3$	0.5 pt

Recopier sur la feuille de réponse et compléter le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée.

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 (5 points)

- 1° a) Déterminer les racines carrées du nombre complexe $-3+4i$ 0.5 pt
b) En déduire les solutions, dans \mathbb{C} , de l'équation $z^2 + (3-6i)z - 6-10i = 0$. 0.5 pt
- 2° Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -2+2i$; $z_B = i$ et $z_C = -1+4i$.
a) Placer les points A, B et C. 0.5 pt
b) Déterminer la nature du triangle ABC. 0.5 pt
c) Déterminer l'affixe du point D tel que ABDC soit un parallélogramme. 0.25 pt
- 3° Pour tout nombre complexe $z \neq i$; on pose : $f(z) = \frac{z+1-4i}{z-i}$.
a) Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z)| = 1$. 0.75 pt
b) Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M d'affixe z tel que $f(z)$ soit imaginaire pur. 0.75 pt
c) Déterminer et construire l'ensemble Γ_3 des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z)-1| = \sqrt{2}$. 0.75 pt
- 4° On pose, pour tout entier $n \geq 1$; $z_n = (z_A)^n$.
a) Ecrire z_n sous forme trigonométrique. 0.25 pt
b) Déterminer la longueur du segment OM_{2019} , où M_{2019} est le point d'affixe z_{2019} . 0.25 pt

Exercice 3 (6 points)

- A. 1° Déterminer la solution générale de l'équation différentielle (E) : $y'' - 4y' + 4y = 0$. 0.5 pt
2° Soit h la solution de (E) qui vérifie $h(0) = -1$ et $h'(0) = -1$. Montrer que $h(x) = (x-1)e^{2x}$. 0.5 pt

B. On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = h(x) + 2x - 2 = (x-1)(2+e^{2x})$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. Interpréter graphiquement.

1 pt

b) Montrer que la droite D d'équation $y = 2x - 2$ est asymptote à (C) et étudier leurs positions relatives.

0.75 pt

2° a) Montrer que $f'(x) = 2 + (2x-1)e^{2x}$ et en déduire l'expression de $f''(x)$. (f' et f'' étant respectivement la dérivée première et la dérivée seconde de f).

0.5 pt

b) Montrer que le point $A(0; -3)$ est un point d'inflexion pour la courbe (C) .

0.5 pt

c) Etudier les variations de f' et en déduire qu'elle est strictement positive sur \mathbb{R} .

0.5 pt

d) Dresser le tableau de variation de f .

0.5 pt

3° a) Déterminer le point B de (C) où la tangente T est parallèle à la droite D . Ecrire une équation de T .

0.5 pt

b) Tracer D , T et (C) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

0.5 pt

c) Discuter graphiquement suivant les valeurs du paramètre réel m le nombre de solutions de l'équation $x-1 = me^{-2x}$.

0.25 pt

Exercice 4 : (6 points)

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = (x-1)(1-\ln x)$ et Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1° On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{1}{x} - \ln x$.

a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

0.5 pt

b) Calculer la dérivée $g'(x)$ puis dresser le tableau de variation de g .

0.5 pt

c) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet sur $]0; +\infty[$ une unique solution α telle que $1,7 < \alpha < 1,8$.

0.5 pt

d) En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$.

0.25 pt

2° a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement.

1 pt

b) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = g(x)$, où f' est la dérivée de f .

0.5 pt

c) Dresser le tableau de variation de f .

0.5 pt

3° a) Montrer que $f(\alpha) = \frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$ où α est le réel trouvé dans la question 1°c).

0.25 pt

b) Déterminer les points d'intersection de la courbe Γ avec l'axe (Ox) .

0.25 pt

4° Soit h la restriction de f sur l'intervalle $I = [\alpha; +\infty[$.

a) Montrer que h réalise une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle $J =]-\infty; f(\alpha)]$.

0.25pt

b) Calculer $(h^{-1})'(0)$.

0.25 pt

c) Construire Γ et Γ' dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où Γ' est la courbe de h^{-1} .

0.5 pt

5° a) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e (x-1) \ln x dx = \frac{e^2 - 3}{4}$.

0.25pt

b) En déduire l'aire du domaine plan délimité par la courbe Γ , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x=1$ et $x=e$

0.5 pt

Fin

CORRECTION DU BAC D 2019

Session Normale

Série : SN
Epreuve : Mathématiques
Durée : 4 heures
Coefficient : 6

DATE: Vendredi 14/06/2019

Exercice 1 (3 points)

N°Question	1	2	3	4	5	6
Réponse	C	B	A	A	B	C
Note	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Exercice 2 (5 points)

1. a) On pose $Z = x + iy$ et $u = -3 + 4i$

$$|u| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5 \Leftrightarrow |u| = 5$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = |u|^2 = 25 & (1) \\ x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(u) = -3 & (2) \\ 2xy = \operatorname{Im}(u) = 4 & (3) \end{cases}$$

$$(1) + (2) \quad 2x^2 = 2 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

$$(1) - (2) \quad 2y^2 = 8 \Leftrightarrow y^2 = 4 \Leftrightarrow y = \pm 2$$

De (3) on a $2xy = 4 \Leftrightarrow xy = 2 > 0$

donc x et y sont de même signe d'où

$$Z_1 = 1 + 2i \text{ et } Z_2 = -1 - 2i \quad [0,5]$$

b)

$$Z^2 + (3 - 6i)Z - 6 - 10i = 0$$

$$\Delta = (3 - 6i)^2 - 4(-6 - 10i) = 9 - 36i - 36 + 24 + 40i$$

$$\Delta = -3 + 4i = (1 + 2i)^2 \Rightarrow \delta = 1 + 2i$$

$$Z_1 = \frac{-b - \delta}{2} = \frac{-3 + 6i - 1 - 2i}{2} = \frac{-4 + 4i}{2} \Leftrightarrow Z_1 = -2 + 2i$$


$$Z_2 = \frac{-b + \delta}{2} = \frac{-3 + 6i + 1 + 2i}{2} = \frac{-2 + 8i}{2} \Leftrightarrow Z_2 = -1 + 4i \quad [0,5]$$

2.

$$a) Z_A = -2 + 2i \Leftrightarrow A(-2, 2)$$

$$Z_B = i \Leftrightarrow B(0, 1)$$

$$Z_C = -1 + 4i \Leftrightarrow C(-1, 4) \text{ Voir figure } [0,5]$$



$$b) \frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B} = \frac{-2 + 2i + 1 - 4i}{-2 + 2 - i} = \frac{-1 - 2i}{-i} = i \Leftrightarrow \frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B} = i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B} \right| = 1 \\ \text{et} \\ \operatorname{Arg} \left(\frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B} \right) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{AC}{AB} = 1 \Leftrightarrow BA = BC \\ \text{et} \\ (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

Donc le triangle ABC est rectangle et isocèle en A [0,5]

d) ABDC est un parallélogramme ssi

$$\overline{CD} = \overline{AB} \Leftrightarrow Z_D - Z_C = Z_B - Z_A$$

$$\Leftrightarrow Z_D = Z_B - Z_A + Z_C \Leftrightarrow Z_D = i + 2 - 2i - 1 + 4i$$

$$\Leftrightarrow Z_D = 1 + 3i \Leftrightarrow D(1, 3) \quad [0,25]$$

(Le point D et sa représentation graphique ne sont pas demandé)

$$3. f(Z) = \frac{Z + 1 - 4i}{Z - i} \Leftrightarrow f(Z) = \frac{Z - Z_C}{Z - Z_B}$$

$$Z \neq i \Leftrightarrow Z \neq Z_B \Leftrightarrow M \neq B$$

$$a) |f(Z)| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{Z - Z_C}{Z - Z_B} \right| = 1 \Leftrightarrow \frac{MC}{MB} = 1 \Leftrightarrow MB = MC$$

Donc l'ensemble (Γ_1) des points M est la médiatrice du segment [BC]. [0,5]

b)

$$f(Z) \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} f(Z) = 0 \\ \text{ou} \\ \operatorname{Arg} f(Z) = \frac{\pi}{2} [\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Z - Z_C = 0 \Leftrightarrow Z = Z_C \\ \text{ou} \\ \operatorname{Arg} \left(\frac{Z - Z_C}{Z - Z_B} \right) = \frac{\pi}{2} [\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} M = C \\ \text{ou} \\ (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}) = \frac{\pi}{2} [\pi] \end{cases} \text{ Donc l'ensemble } \Gamma_2 \text{ des points M est}$$

le cercle de diamètre [BC] privé de B. [0,5]

$$c) |f(Z) - 1| = \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| \frac{Z + 1 - 4i}{Z - i} - 1 \right| = \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{Z + 1 - 4i - Z + i}{Z - i} \right| = \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| \frac{1 - 3i}{Z - i} \right| = \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{|1 - 3i|}{|Z - i|} = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{10}}{|Z - i|} = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1}{|Z - i|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{|Z - i|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow |Z - i| = \sqrt{5} \Leftrightarrow BM = \sqrt{5}.$$

Donc l'ensemble (Γ_3) des points M est le cercle de centre C et de rayon $\sqrt{5}$. [0,5]

$$4. \forall n \geq 1 \quad Z_n = (Z_A)^n \quad M_n(Z_n)$$

$$a) Z_A = -2 + 2i$$

$$|Z_A| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad \theta = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \quad \operatorname{Arg}(Z_A) = \frac{3\pi}{4} [2\pi]$$

$$|Z_n| = |Z_A|^n = (2\sqrt{2})^n$$

$$\operatorname{Arg}(Z_n) = \operatorname{Arg}((Z_A)^n) = n \operatorname{Arg}(Z_A) = \frac{3n\pi}{4} [2\pi]$$

$$Z_n = (2\sqrt{2})^n \left(\cos \left(\frac{3n\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{3n\pi}{4} \right) \right) \quad [0,25]$$

$$c) OM_{2019} = |Z_{2019}| = |Z_A|^{2019} = (2\sqrt{2})^{2019}$$

$$OM_{2019} = (2\sqrt{2})^{2019} \quad [0,25]$$

Exercice 3 (5 points)

PARTIE A

1. (E) $y'' - 4y' + 4y = 0$

On pose l'équation caractéristique :

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \quad \Delta = 16 - 16 = 0 \quad r_1 = r_2 = r = \frac{4}{2} = 2$$

Donc $h(x) = (Ax + B)e^{2x}$

2. $h(x) = (Ax + B)e^{2x}$

$(uv)' = u'v + v'u$

$h'(x) = Ae^{2x} + 2(Ax + B)e^{2x}$

$\Leftrightarrow h'(x) = (2Ax + A + 2B)e^{2x}$

$\begin{cases} h(0) = -1 \\ h'(0) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (A(0) + B)e^0 = -1 \\ (2A(0) + A + 2B)e^0 = -1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} B = -1 \\ A + 2B = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = -1 \\ A = 1 \end{cases} \Leftrightarrow h(x) = (x - 1)e^{2x}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} B = -1 \\ A + 2B = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = -1 \\ A = 1 \end{cases} \Leftrightarrow h(x) = (x - 1)e^{2x}$

PARTIE B

1. $f(x) = (x - 1)e^{2x} + 2x - 2 = (x - 1)(2 + e^{2x})$

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\underbrace{(x - 1)}_{\rightarrow -\infty} \underbrace{\left(2 + \underbrace{e^{2x}}_{\rightarrow 0} \right)}_{\rightarrow 2} \right) = -\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ [0,25]

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{(x - 1)}_{\rightarrow +\infty} \underbrace{(2 + e^{2x})}_{\rightarrow +\infty} \right) = +\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ [0,25]

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{(x - 1)(2 + e^{2x})}{x} \right)$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{\left(1 - \frac{1}{x} \right)}_{\rightarrow 1} \underbrace{\left(2 + \frac{e^{2x}}{x} \right)}_{\rightarrow +\infty} \right) = +\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ [0,25]

Donc la courbe (C) admet une branche parabolique (BP) de direction (Oy) au voisinage de $+\infty$ [0,25]

b) On pose $D: y = 2x - 2$

$f(x) - y = f(x) - (2x - 2) = (x - 1)e^{2x}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 1)e^{2x}$

$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2} \frac{(2x)e^{2x} - e^{2x}}{1} \right) = 0$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - y) = 0$ [0,25]

Donc la droite $D: y = 2x - 2$ est une asymptote oblique à la courbe (C) au voisinage de $-\infty$ [0,25]

Position relative de (C) et (D)

On étudie le signe de $f(x) - y = (x - 1)e^{2x}$

Comme $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^{2x} > 0$ alors le signe de $f(x) - y$ est celui de $x - 1$

$x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ [0,25]

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - y$	+	0	-
Position relative de (C) par rapport à (D)	C/D	$C \cap D = \{0\}$	D/C

$D: y = 2x - 2 \quad x = 1 \Leftrightarrow y = 0 \quad \text{donc } \Omega(1, 0)$

2.a) $f(x) = (x - 1)(2 + e^{2x})$

$(uv)' = u'v + v'u$

$f'(x) = 2 + e^{2x} + 2(x - 1)e^{2x}$

$= 2 + (1 + 2x - 2)e^{2x}$

$\Leftrightarrow f'(x) = 2 + (2x - 1)e^{2x}$ [0,25]

$f''(x) = 2e^{2x} + 2(2x - 1)e^{2x} = (2 + 4x - 2)e^{2x}$

$\Leftrightarrow f''(x) = 4xe^{2x}$ [0,25]

b) Comme $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^{2x} > 0$ alors le signe de $f''(x)$ est celui de $4x$

Signe de $f''(x)$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

$f(0) = (0 - 1)(2 + e^0) = -3$ Donc le point $A(0, -3)$

est un point d'inflexion à la courbe (C) [0,5]

c) Tableau de variations (TV) de f'

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f'(x)$	\searrow	1	\nearrow

$f'(0) = 2 + (2(0) - 1)e^0 = 1$

D'après le TV de f' elle admet une valeur minimale absolue qui est $f'(0) = 1$

Donc $\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) \geq 1 > 0$

$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) > 0$ [0,25]

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	+

d) TV de f

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

3.a) $D: y = 2x - 2$ son coefficient directeur est $\alpha = 2$

$T // D \Leftrightarrow f'(x) = 2 \Leftrightarrow 2 + (2x - 1)e^{2x} = 2$

$\Leftrightarrow (2x - 1)e^{2x} = 0 \Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} - 1\right)\left(2 + e^{2\left(\frac{1}{2}\right)}\right) \Leftrightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{2+e}{2} = -2,35$

$B\left(\frac{1}{2}, -\frac{2+e}{2}\right) \approx (0,5; -2,35)$ [0,25]

Equation de la tangente (T) à (C) au point A :

$T: y = f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow T: y = 2\left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{2+e}{2}$

$T: y = 2x - \frac{4+e}{2}$ [0,25]

c) $x - 1 = me^{-2x}$

$\Leftrightarrow (x - 1)e^{2x} = m$


$\Leftrightarrow (x - 1)e^{2x} + 2x - 2 = 2x - 2 + m$ [0,25]

$\Leftrightarrow f(x) = 2x - 2 + m$

$\Rightarrow f(x) = 2x + m'$ avec $m' = -2 + m$
 Donc le nombre de solutions de l'équation paramétrique revient au nombre de points d'intersections de la courbe (C) avec la droite $D_m: y = 2x - 2 + m$ ou $D'_m: y = 2x + m'$ avec $m' = -2 + m$ qui est parallèle à D et T.

m'		Nombre de solutions
$m' < -\frac{4+e}{2}$	$m < -\frac{e}{2}$	0
$m' = -\frac{4+e}{2}$	$m = -\frac{e}{2}$	1
$-\frac{4+e}{2} < m' < -2$	$-\frac{e}{2} < m < 0$	2
$m' \geq -2$	$m \geq 0$	1

b) Représentation graphique [0,5]



Exercice 4 (7 points)

1. $\forall x \in]0, +\infty[$ $g(x) = \frac{1}{x} - \ln x$

$$a) \lim_{0^+} g(x) = \lim_{0^+} \left(\frac{1}{x} - \ln(x) \right) = +\infty$$

$$\Leftrightarrow \lim_{0^+} g(x) = +\infty \quad [0,25]$$

$$\lim_{+\infty} g(x) = \lim_{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \ln(x) \right) = -\infty$$

$$\Leftrightarrow \lim_{+\infty} g(x) = -\infty \quad [0,25]$$

b) $g(x) = \frac{1}{x} - \ln(x)$

$$\Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} = -\frac{1+x}{x^2} < 0 \quad [0,25]$$

x	0	α	$+\infty$
$g'(x)$		-	
$g(x)$	$+\infty$	0	$-\infty$

Diagram illustrating the function $g(x)$ and its derivative $g'(x)$ over the interval $[0, +\infty)$. The function $g(x)$ is shown as a decreasing curve starting from $+\infty$ at $x=0$, passing through a point marked $0,25$ (likely $1/4$), and approaching $-\infty$ as $x \rightarrow +\infty$. The derivative $g'(x)$ is negative throughout the interval.

c) D'après le T.V de g elle est continue et change de signe une fois sur $[0, +\infty[$ donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0, +\infty[$ [0,25]
 g est continue sur $[1, 7; 1, 8]$.

De plus

$$g(1,7) = 0,05 > 0 \text{ et } g(1,8) = -0,03 < 0$$

$$\Leftrightarrow [g(1,7) \times g(1,8) < 0]$$

D'après le théorème de la valeur intermédiaire (V.I)

$$\exists! \alpha \in]1,7; 1,8[/ g(\alpha) = 0 \quad [0,25]$$

b) Donc d'après le T.V de g son signe est

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$		+	-

0,25

2.a) $f(x) = (x-1)(1-\ln x)$

$$\lim_{0^+} f(x) = \lim_{0^+} \left(\left(\frac{x-1}{-1} \right) \left(\frac{1-\ln x}{+\infty} \right) \right) = -\infty$$

$$\Leftrightarrow \lim_{0^+} f(x) = -\infty \quad [0,25]$$

Donc $x = 0$ est A.V à la courbe (Γ). [0,25]

$$\lim_{+\infty} f(x) = \lim_{+\infty} \left(\left(\frac{x-1}{+\infty} \right) \left(\frac{1-\ln x}{-\infty} \right) \right) = -\infty$$

$$\Leftrightarrow \lim_{+\infty} f(x) = -\infty \quad [0,25]$$

$$\lim_{+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{+\infty} \left(\frac{(x-1)(1-\ln x)}{x} \right)$$

$$= \lim_{+\infty} \left(\left(1 - \frac{1}{x} \right) \left(\frac{1-\ln x}{-\infty} \right) \right) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{+\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

Donc la courbe (Γ) admet une B.P de direction (Oy) au voisinage de $+\infty$. [0,25]

b) $f(x) = (x-1)(1-\ln x)$

$$(uv)' = u'v + v'u$$

$$f'(x) = (1-\ln x) + (x-1) \left(-\frac{1}{x} \right)$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{1}{x} - \ln x \Leftrightarrow f'(x) = g(x) \quad [0,5]$$

c) Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$		$f(\alpha)$	

$-\infty$ $0,5$ $-\infty$

3.a) $g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha} - \ln \alpha = 0 \Leftrightarrow \ln \alpha = \frac{1}{\alpha}$

$$f(\alpha) = (\alpha-1)(1-\ln \alpha) = (\alpha-1) \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right)$$

$$f(\alpha) = (\alpha-1) \left(\frac{\alpha-1}{\alpha} \right) \Leftrightarrow f(\alpha) = \frac{(\alpha-1)^2}{\alpha} \quad [0,25]$$

b) L'intersection de (Γ) avec (Ox) :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow (x-1)(1-\ln x) = 0$$

$$\Leftrightarrow x-1=0 \text{ ou } 1-\ln x$$

$$\Leftrightarrow x=1 \text{ ou } x=e \Leftrightarrow (1,0) \text{ et } (e,0)$$

$$f \cap (Ox) = \{(1,0), (e,0)\} \quad [0,25]$$

a) D'après le T.V de f sur l'intervalle $I = [\alpha, +\infty[$ h est continue et continue et strictement décroissante de $I = [\alpha, +\infty[$ vers $J =]-\infty, f(\alpha)]$

donc h réalise une bijection [0,25]

297

b) Calcul de $(h^{-1})'(0)$

On a $h(e) = 0 \Leftrightarrow h^{-1}(0) = e$

On a aussi $h'(e) = \frac{1}{e} - \ln e \Rightarrow h'(e) = \frac{1}{e} - 1$

$h'(e) = \frac{1-e}{e}$

$(h^{-1})'(x_0) = \frac{1}{h'(h^{-1}(x_0))}$

$(h^{-1})'(0) = \frac{1}{h'(h^{-1}(0))} = \frac{1}{h'(e)} = \frac{1}{\frac{1-e}{e}} = \frac{e}{1-e}$

$\Leftrightarrow (h^{-1})'(0) = \frac{e}{1-e}$ [0,25]

5.a) Montrons que $\int_1^e (x-1) \ln x \, dx = \frac{e^2-3}{4}$

On pose $\begin{cases} u = \ln x \\ v' = x-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u' = \frac{1}{x} \\ v = \frac{1}{2}x^2 - x \end{cases}$

$\int_1^e uv' = [uv]_1^e - \int_1^e u'v$

$\int_1^e (x-1) \ln x \, dx = \left[\left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) dx$

$= \left[\left(\frac{1}{2}e^2 - e \right) \ln e - \left(\frac{1}{2}(1)^2 - 1 \right) \ln 1 \right] - \int_1^e \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x \right) dx$

$= \frac{1}{2}e^2 - e - \left[\frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{4}x^2 \right]_1^e$

$= \frac{1}{2}e^2 - e - \left[\left(\frac{1}{12}e^3 - \frac{1}{4}e^2 \right) - \left(\frac{1}{12}(1)^3 - \frac{1}{4}(1)^2 \right) \right]$

$\frac{1}{2}e^2 - e - \frac{1}{12}e^3 + \frac{1}{4}e^2 + \frac{3}{4} = \frac{2e^2 - e^3 - 3}{4} = \frac{e^2-3}{4}$

$\Leftrightarrow \int_1^e (x-1) \ln x \, dx = \frac{e^2-3}{4}$ [0,25]

b) $\mathcal{A} = \int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e (x-1)(1-\ln x) \, dx$

$= \int_1^e [x-1 - (x-1)\ln x] \, dx$

$= \int_1^e (x-1) \, dx - \int_1^e (x-1) \ln x \, dx$


$= \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^e - \frac{e^2-3}{4}$

$= \left(\frac{1}{2}e^2 - e \right) - \left(\frac{1}{2}(1)^2 - 1 \right) - \frac{e^2-3}{4} = \frac{2e^2 - 4e + 2 - e^2 + 3}{4} = \frac{e^2 - 4e + 5}{4}$

$\frac{e^2 - 4e + 5}{4} \quad \mathcal{A} = \int_1^e f(x) \, dx = \frac{e^2 - 4e + 5}{4} = 2,23$ [0,5]

c) Représentation graphique [0,5]

$\alpha = 1,75 \quad f(\alpha) = 0,3$



JUSTIFICATION DE L'EXERCICE [1]

Cette partie n'est pas demandée dans l'exercice

$U_n = 3^n + n - 1 ; V_n = U_{n+1} - U_n \text{ et } W_n = \ln\left(\frac{1+V_n}{2}\right)$

1. $U_1 = 3^1 + 1 - 1 \Leftrightarrow U_1 = 3$

$U_2 = 3^2 + 2 - 1 \Leftrightarrow U_2 = 10$

$U_3 = 3^3 + 3 - 1 \Leftrightarrow U_3 = 29$

$U_2 - U_1 = 10 - 3 = 7 \Leftrightarrow [U_2 - U_1 = 7]$

$U_3 - U_2 = 29 - 10 = 19 \Leftrightarrow [U_3 - U_2 = 19]$

$[U_3 - U_2 \neq U_2 - U_1] \text{ Donc } (U_n) \text{ n'est pas S.A}$

$\frac{U_2}{U_1} = \frac{10}{3} \text{ et } \frac{U_3}{U_2} = \frac{29}{10}$

$\left[\frac{U_2}{U_1} \neq \frac{U_3}{U_2} \right] \text{ Donc } (U_n) \text{ n'est pas S.G}$

Donc (U_n) n'est ni S.A ni S.G

Réponse C

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^{n+1}}{3} + \frac{n-1}{1} \right) = +\infty$

Donc (U_n) est divergente

Réponse B

3. On pose :

$a_n = 3^n$ c'est une S.G de raison $q = 3$ et de premier terme

$a_0 = 1$

$b_n = n - 1$ c'est une S.A de raison $r = 1$ et de premier terme

$b_0 = -1$

$A_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n$

$\Leftrightarrow A_n = a_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} = 1 \frac{3^{n+1} - 1}{3 - 1} \Leftrightarrow A_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$

$B_n = b_0 + b_1 + \dots + b_n$

$B_n = \frac{n+1}{2} (b_0 + b_n) = \frac{n+1}{2} (-1 + n - 1)$

$\Leftrightarrow B_n = \frac{(n+1)(n-2)}{2}$

$U_n = 3^n + n - 1 \Leftrightarrow U_n = a_n + b_n$

On a $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

$\begin{cases} U_0 = a_0 + b_0 \\ U_1 = a_1 + b_1 \\ \vdots \\ U_n = a_n + b_n \end{cases}$

$S_n = A_n + B_n \Leftrightarrow S_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2} + \frac{(n+1)(n-2)}{2}$

Réponse A

4.

$V_n = U_{n+1} - U_n = 3^{n+1} + (n+1) - 1 - (3^n + n - 1)$
 $= 3 \times 3^n + n + 1 - 1 - 3^n - n + 1 = (3 - 1) \times 3^n + 1$

$V_n = 2 \times 3^n + 1$

Réponse A

5. $V_n \geq 2019 \Leftrightarrow 2 \times 3^n + 1 \geq 2019 \Leftrightarrow 3^n \geq 1009$

$\Leftrightarrow \ln(3^n) \geq \ln(1009) \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(1009)}{\ln(3)} = 6,29 \Leftrightarrow n \geq 7$

Le plus petit entier est $n_0 = 7$

Réponse B

$W_n = \ln\left(\frac{1+V_n}{2}\right) = \ln\left(\frac{1+2 \times 3^n + 1}{2}\right) = \ln(3^n)$

$\Leftrightarrow W_n = n \ln(3)$ c'est une S.A de raison $r = \ln(3)$ et de premier $W_0 = 0$ donc $T_n = W_0 + W_1 + \dots + W_n$

$T_n = \frac{n+1}{2} (W_0 + W_n) = \frac{n+1}{2} (0 + n \ln(3))$

$\Leftrightarrow T_n = \frac{n^2 + n}{2} \ln(3)$

Réponse C

218

Exercice 1 (3 points)

Soit (u_n) la suite numérique définie par $u_n = 3^n + n - 1$. On pose $v_n = u_{n+1} - u_n$ et $w_n = \ln\left(\frac{-1+v_n}{2}\right)$.

Parmi les réponses proposées pour chaque question ci-après, une seule est correcte.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La suite (u_n) est :	arithmétique	géométrique	ni arithmétique, ni géométrique	0.5 pt
2	La suite (u_n) est	convergente	divergente	bornée	0.5 pt
3	Si $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$, alors la valeur de S_n est	$\frac{3^{n+1}-1}{2} + \frac{(n+1)(n-2)}{2}$	$\frac{1-3^{n+1}}{-2} + \frac{(n+1)(n-1)}{2}$	$\frac{1-3^{n+1}}{2} + \frac{(n+1)(n-2)}{2}$	0.5 pt
4	Le terme général de la suite (v_n) est :	$v_n = 2 \times 3^n + 1$	$v_n = 2 \times 3^n + 2n + 1$	$v_n = 3^n + 1$	0.5 pt
5	Le plus petit entier naturel n tel que $v_n \geq 2019$ est :	$n = 6$	$n = 7$	$n = 8$	0.5 pt
6	Si $T_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$, alors la valeur de T_n est	$\frac{(n+1)^2}{2} \ln 3$	$\ln\left(\frac{3^{n+1}-1}{2}\right)$	$\frac{n^2+n}{2} \ln 3$	0.5 pt

Recopier sur la feuille de réponse et compléter le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée.

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 (5 points)

1° a) Déterminer les racines carrées du nombre complexe $-3+4i$

0.5 pt

b) En déduire les solutions, dans \mathbb{C} , de l'équation $z^2 + (3-6i)z - 6-10i = 0$.

0.5 pt

2° Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -2+2i$; $z_B = i$ et $z_C = -1+4i$.

a) Placer les points A, B et C.

0.5 pt

b) Déterminer la nature du triangle ABC.

0.5 pt

c) Déterminer l'affixe du point D tel que ABDC soit un parallélogramme.

0.25 pt

3° Pour tout nombre complexe $z \neq i$; on pose : $f(z) = \frac{z+1-4i}{z-i}$.

a) Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z)| = 1$.

0.75 pt

b) Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M d'affixe z tel que $f(z)$ soit imaginaire pur.

0.75 pt

c) Déterminer et construire l'ensemble Γ_3 des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z) - 1| = \sqrt{2}$.

0.75 pt

4° On pose, pour tout entier $n \geq 1$; $z_n = (z_A)^n$.

a) Ecrire z_n sous forme trigonométrique.

0.25 pt

b) Déterminer la longueur du segment OM_{2019} , où M_{2019} est le point d'affixe z_{2019} .

0.25 pt

Exercice 3 (6 points)

A. 1° Déterminer la solution générale de l'équation différentielle (E): $y'' - 4y' + 4y = 0$.

0.5 pt

B. On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = h(x) + 2x - 2 = (x-1)(2+e^{2x})$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. Interpréter graphiquement.

b) Montrer que la droite D d'équation $y = 2x - 2$ est asymptote à (C) et étudier leurs positions relatives.

2° a) Montrer que $f'(x) = 2 + (2x-1)e^{2x}$ et en déduire l'expression de $f''(x)$. (f' et f'' étant respectivement la dérivée première et la dérivée seconde de f).

b) Montrer que le point $A(0; -3)$ est un point d'inflexion pour la courbe (C) .

c) Etudier les variations de f' et en déduire qu'elle est strictement positive sur \mathbb{R} .

d) Dresser le tableau de variation de f .

3° a) Déterminer le point B de (C) où la tangente T est parallèle à la droite D . Ecrire une équation de T .

b) Tracer D , T et (C) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

c) Discuter graphiquement suivant les valeurs du paramètre réel m le nombre de solutions de l'équation $x - 1 = me^{-2x}$.

Exercice 4 : (6 points)

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = (x-1)(1-\ln x)$ et Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1° On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{1}{x} - \ln x$.

a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

b) Calculer la dérivée $g'(x)$ puis dresser le tableau de variation de g .

c) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet sur $]0; +\infty[$ une unique solution α telle que $1,7 < \alpha < 1,8$.

d) En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$.

2° a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement.

b) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = g(x)$, où f' est la dérivée de f .

c) Dresser le tableau de variation de f .

3° a) Montrer que $f(\alpha) = \frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$ où α est le réel trouvé dans la question 1°c).

b) Déterminer les points d'intersection de la courbe Γ avec l'axe (Ox) .

4° Soit h la restriction de f sur l'intervalle $I = [\alpha; +\infty[$.

a) Montrer que h réalise une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle $J =]-\infty; f(\alpha)]$.

b) Calculer $(h^{-1})'(0)$.

c) Construire Γ et Γ' dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où Γ' est la courbe de h^{-1} .

5° a) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e (x-1) \ln x dx = \frac{e^2-3}{4}$.

b) En déduire l'aire du domaine plan délimité par la courbe Γ , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x=1$ et $x=e$.

Fin

CORRECTION DU BAC D 2019

Session Normale

Série : SN
Epreuve : Mathématiques
Durée : 4 heures
Coefficient : 6

DATE: Vendredi 14/06/2019

Exercice 1 (3 points)

N°Question	1	2	3	4	5	6
Réponse	C	B	A	A	B	C
Note	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Exercice 2 (5 points)

1. a) On pose $Z = x + iy$ et $u = -3 + 4i$

$$|u| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5 \Leftrightarrow |u| = 5$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = |u| = 5 & (1) \\ x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(u) = -3 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(u) = -3 & (2) \\ 2xy = \operatorname{Im}(u) = 4 & (3) \end{cases}$$

$$(1) + (2) \quad 2x^2 = 2 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

$$(1) - (2) \quad 2y^2 = 8 \Leftrightarrow y^2 = 4 \Leftrightarrow y = \pm 2$$

De (3) on a $2xy = 4 \Leftrightarrow xy = 2 > 0$

donc x et y sont de même signe d'où

$$Z_1 = 1 + 2i \text{ et } Z_2 = -1 - 2i \quad [0,5]$$

b)

$$Z^2 + (3 - 6i)Z - 6 - 10i = 0$$

$$\Delta = (3 - 6i)^2 - 4(-6 - 10i) = 9 - 36i - 36 + 24 + 40i$$

$$\Delta = -3 + 4i = (1 + 2i)^2 \Rightarrow \delta = 1 + 2i$$

$$Z_1 = \frac{-b - \delta}{2} = \frac{-3 + 6i - 1 - 2i}{2} = \frac{-4 + 4i}{2} \Leftrightarrow Z_1 = -2 + 2i$$


$$Z_2 = \frac{-b + \delta}{2} = \frac{-3 + 6i + 1 + 2i}{2} = \frac{-2 + 8i}{2} \Leftrightarrow Z_2 = -1 + 4i \quad [0,5]$$

2.

$$a) Z_A = -2 + 2i \Leftrightarrow A(-2, 2)$$

$$Z_B = i \Leftrightarrow B(0, 1)$$

$$Z_C = -1 + 4i \Leftrightarrow C(-1, 4) \text{ Voir figure } [0,5]$$



$$b) \frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B} = \frac{-2 + 2i + 1 - 4i}{-2 + 2i - 1} = \frac{-1 - 2i}{-3 + 2i} = i \Leftrightarrow \frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B} = i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B} \right| = 1 \\ \text{et} \\ \operatorname{Arg} \left(\frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B} \right) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{AC}{AB} = 1 \Leftrightarrow BA = BC \\ \text{et} \\ (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

Donc le triangle ABC est rectangle et isocèle en A [0,5]

d) ABDC est un parallélogramme ssi

$$\overline{CD} = \overline{AB} \Leftrightarrow Z_D - Z_C = Z_B - Z_A$$

$$\Leftrightarrow Z_D = Z_B - Z_A + Z_C \Leftrightarrow Z_D = i + 2 - 2i - 1 + 4i$$

$$\Leftrightarrow Z_D = 1 + 3i \Leftrightarrow D(1, 3) \quad [0,25]$$

(Le point D et sa représentation graphique ne sont pas demandé)

$$3. f(Z) = \frac{Z + 1 - 4i}{Z - i} \Leftrightarrow f(Z) = \frac{Z - Z_C}{Z - Z_B}$$

$$Z \neq i \Leftrightarrow Z \neq Z_B \Leftrightarrow M \neq B$$

$$a) |f(Z)| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{Z - Z_C}{Z - Z_B} \right| = 1 \Leftrightarrow \frac{MC}{MB} = 1 \Leftrightarrow MB = MC$$

Donc l'ensemble (Γ_1) des points M est la médiatrice du segment [BC]. [0,5]

b)

$$f(Z) \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} f(Z) = 0 \\ \text{ou} \\ \operatorname{Arg} f(Z) = \frac{\pi}{2} [\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Z - Z_C = 0 \Leftrightarrow Z = Z_C \\ \text{ou} \\ \operatorname{Arg} \left(\frac{Z - Z_C}{Z - Z_B} \right) = \frac{\pi}{2} [\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} M = C \\ \text{ou} \\ (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}) = \frac{\pi}{2} [\pi] \end{cases} \text{ Donc l'ensemble } \Gamma_2 \text{ des points M est}$$

le cercle de diamètre [BC] privé de B. [0,5]

$$c) |f(Z) - 1| = \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| \frac{Z + 1 - 4i}{Z - i} - 1 \right| = \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{Z + 1 - 4i - Z + i}{Z - i} \right| = \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| \frac{1 - 3i}{Z - i} \right| = \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{|1 - 3i|}{|Z - i|} = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{10}}{|Z - i|} = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1}{|Z - i|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{|Z - i|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow |Z - i| = \sqrt{5} \Leftrightarrow BM = \sqrt{5}.$$

Donc l'ensemble (Γ_3) des points M est le cercle de centre C et de rayon $\sqrt{5}$. [0,5]

$$4. \forall n \geq 1 \quad Z_n = (Z_A)^n \quad M_n(Z_n)$$

$$a) Z_A = -2 + 2i$$

$$|Z_A| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad \theta = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \quad \operatorname{Arg}(Z_A) = \frac{3\pi}{4} [2\pi]$$

$$|Z_n| = |Z_A|^n = (2\sqrt{2})^n$$

$$\operatorname{Arg}(Z_n) = \operatorname{Arg}((Z_A)^n) = n \operatorname{Arg}(Z_A) = \frac{3n\pi}{4} [2\pi]$$

$$Z_n = (2\sqrt{2})^n \left(\cos \left(\frac{3n\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{3n\pi}{4} \right) \right) \quad [0,25]$$

$$c) OM_{2019} = |Z_{2019}| = |Z_A|^{2019} = (2\sqrt{2})^{2019}$$

$$OM_{2019} = (2\sqrt{2})^{2019} \quad [0,25]$$

Exercice 3 (5 points)

PARTIE A

1. (E) $y'' - 4y' + 4y = 0$

On pose l'équation caractéristique :

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \quad \Delta = 16 - 16 = 0 \quad r_1 = r_2 = r = \frac{4}{2} = 2$$

Donc $h(x) = (Ax + B)e^{2x}$

2. $h(x) = (Ax + B)e^{2x}$

$(uv)' = u'v + v'u$

$h'(x) = Ae^{2x} + 2(Ax + B)e^{2x}$

$\Leftrightarrow h'(x) = (2Ax + A + 2B)e^{2x}$

$\begin{cases} h(0) = -1 \\ h'(0) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (A(0) + B)e^0 = -1 \\ (2A(0) + A + 2B)e^0 = -1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} B = -1 \\ A + 2B = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = -1 \\ A = 1 \end{cases} \Leftrightarrow h(x) = (x - 1)e^{2x}$

PARTIE B

1. $f(x) = (x - 1)e^{2x} + 2x - 2 = (x - 1)(2 + e^{2x})$

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\underbrace{(x - 1)}_{\rightarrow -\infty} \underbrace{\left(2 + \underbrace{e^{2x}}_{\rightarrow 0} \right)}_{\rightarrow 2} \right) = -\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ [0,25]

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{(x - 1)}_{\rightarrow +\infty} \underbrace{(2 + e^{2x})}_{\rightarrow +\infty} \right) = +\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ [0,25]

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - 1)(2 + e^{2x})}{x}$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{\left(1 - \frac{1}{x} \right)}_{\rightarrow 1} \underbrace{\left(2 + \frac{e^{2x}}{x} \right)}_{\rightarrow +\infty} \right) = +\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ [0,25]

Donc la courbe (C) admet une branche parabolique (BP) de direction (Oy) au voisinage de $+\infty$ [0,25]

b) On pose $D: y = 2x - 2$

$f(x) - y = f(x) - (2x - 2) = (x - 1)e^{2x}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 1)e^{2x}$

$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2} \underbrace{(2x)e^{2x}}_{\rightarrow 0} - \underbrace{e^{2x}}_{\rightarrow 0} \right) = 0$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - y) = 0$ [0,25]

Donc la droite $D: y = 2x - 2$ est une asymptote oblique à la courbe (C) au voisinage de $-\infty$ [0,25]

Position relative de (C) et (D)

On étudie le signe de $f(x) - y = (x - 1)e^{2x}$

Comme $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^{2x} > 0$ alors le signe de $f(x) - y$ est celui de $x - 1$

$x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ [0,25]

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - y$	+	0	-
Position relative de (C) par rapport à (D)	C/D	C ∩ D = {Ω}	D/C

$D: y = 2x - 2 \quad x = 1 \Leftrightarrow y = 0 \quad \text{donc } \Omega(1, 0)$

2.a) $f(x) = (x - 1)(2 + e^{2x})$

$(uv)' = u'v + v'u$

$f'(x) = 2 + e^{2x} + 2(x - 1)e^{2x}$

$= 2 + (1 + 2x - 2)e^{2x}$

$\Leftrightarrow f'(x) = 2 + (2x - 1)e^{2x}$ [0,25]

$f''(x) = 2e^{2x} + 2(2x - 1)e^{2x} = (2 + 4x - 2)e^{2x}$

$\Leftrightarrow f''(x) = 4xe^{2x}$ [0,25]

b) Comme $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^{2x} > 0$ alors le signe de $f''(x)$ est celui de $4x$

Signe de $f''(x)$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

$f(0) = (0 - 1)(2 + e^0) = -3$ Donc le point $A(0, -3)$

est un point d'inflexion à la courbe (C) [0,5]

c) Tableau de variations (TV) de f'

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f'(x)$		1	

$f'(0) = 2 + (2(0) - 1)e^0 = 1$

D'après le TV de f' elle admet une valeur minimale absolue qui est $f'(0) = 1$

Donc $\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) \geq 1 > 0$

$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) > 0$ [0,25]

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+

d) TV de f

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$		$+\infty$

3.a) $D: y = 2x - 2$ son coefficient directeur est $\alpha = 2$

$T // D \Leftrightarrow f'(x) = 2 \Leftrightarrow 2 + (2x - 1)e^{2x} = 2$

$\Leftrightarrow (2x - 1)e^{2x} = 0 \Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} - 1\right)\left(2 + e^{2\left(\frac{1}{2}\right)}\right) \Leftrightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{2+e}{2} = -2,35$

$B\left(\frac{1}{2}, -\frac{2+e}{2}\right) \approx (0,5; -2,35)$ [0,25]

Equation de la tangente (T) à (C) au point A :

$T: y = f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow T: y = 2\left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{2+e}{2}$

$T: y = 2x - \frac{4+e}{2}$ [0,25]

c) $x - 1 = me^{-2x}$

$\Leftrightarrow (x - 1)e^{2x} = m$

$\Leftrightarrow (x - 1)e^{2x} + 2x - 2 = 2x - 2 + m$ [0,25]


$\Leftrightarrow f(x) = 2x - 2 + m$

$$\Rightarrow f(x) = 2x + m' \quad \text{avec} \quad m' = -2 + m$$

Donc le nombre de solutions de l'équation paramétrique revient au nombre de points d'intersections de la courbe (C) avec la droite $D_m: y = 2x - 2 + m$ ou $D'_m: y = 2x + m'$ avec $m' = -2 + m$ qui est parallèle à D et T.

m'		Nombre de solutions
$m' < -\frac{4+e}{2}$	$m < -\frac{e}{2}$	0
$m' = -\frac{4+e}{2}$	$m = -\frac{e}{2}$	1
$-\frac{4+e}{2} < m' < -2$	$-\frac{e}{2} < m < 0$	2
$m' \geq -2$	$m \geq 0$	1

b) Représentation graphique [0,5]



Exercice 4 (7 points)

1. $\forall x \in]0, +\infty[\quad g(x) = \frac{1}{x} - \ln x$

a) $\lim_{0^+} g(x) = \lim_{0^+} \left(\frac{1}{x} - \ln(x) \right) = +\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{0^+} g(x) = +\infty$ [0,25]

$\lim_{+\infty} g(x) = \lim_{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \ln(x) \right) = -\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{+\infty} g(x) = -\infty$ [0,25]

b) $g(x) = \frac{1}{x} - \ln(x)$

$\Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} = -\frac{1+x}{x^2} < 0$ [0,25]

x	0	α	$+\infty$
$g'(x)$		-	
$g(x)$	$+\infty$	0	$-\infty$

0,25

c) D'après le T.V de g elle est continue et change de signe une fois sur $[0, +\infty[$ donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0, +\infty[$ [0,25]
g est continue sur $[1, 7; 1, 8]$.

De plus

$g(1,7) = 0,05 > 0$ et $g(1,8) = -0,03 < 0$

$\Leftrightarrow [g(1,7) \times g(1,8) < 0]$

D'après le théorème de la valeur intermédiaire (V.I)

$\exists! \alpha \in]1,7; 1,8[/ g(\alpha) = 0$ [0,25]

b) Donc d'après le T.V de g son signe est

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$		+	-

0,25

2.a) $f(x) = (x-1)(1-\ln x)$

$\lim_{0^+} f(x) = \lim_{0^+} \left(\left(\frac{x-1}{-1} \right) \left(\frac{1-\ln x}{+\infty} \right) \right) = -\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{0^+} f(x) = -\infty$ [0,25]

Donc $x = 0$ est A.V à la courbe (Γ). [0,25]

$\lim_{+\infty} f(x) = \lim_{+\infty} \left(\left(\frac{x-1}{+\infty} \right) \left(\frac{1-\ln x}{-\infty} \right) \right) = -\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{+\infty} f(x) = -\infty$ [0,25]

$\lim_{+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{+\infty} \left(\frac{(x-1)(1-\ln x)}{x} \right)$

$= \lim_{+\infty} \left(\left(1 - \frac{1}{x} \right) \left(\frac{1-\ln x}{-\infty} \right) \right) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{+\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$

Donc la courbe (Γ) admet une B.P de direction (Oy) au voisinage de $+\infty$. [0,25]

b) $f(x) = (x-1)(1-\ln x)$

$(uv)' = u'v + v'u$

$f'(x) = (1-\ln x) + (x-1) \left(-\frac{1}{x} \right)$

$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{1}{x} - \ln x \Leftrightarrow f'(x) = g(x)$ [0,5]

c) Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$		$f(\alpha)$	

$-\infty$ $0,5$ $-\infty$

3.a) $g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha} - \ln \alpha = 0 \Leftrightarrow \ln \alpha = \frac{1}{\alpha}$

$f(\alpha) = (\alpha-1)(1-\ln \alpha) = (\alpha-1) \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right)$

$f(\alpha) = (\alpha-1) \left(\frac{\alpha-1}{\alpha} \right) \Leftrightarrow f(\alpha) = \frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$ [0,25]

b) L'intersection de (Γ) avec (Ox) :

$f(x) = 0 \Leftrightarrow (x-1)(1-\ln x) = 0$

$\Leftrightarrow x-1=0$ ou $1-\ln x$

$\Leftrightarrow x=1$ ou $x=e \Leftrightarrow (1,0)$ et $(e,0)$

$f \cap (Ox) = \{(1,0), (e,0)\}$ [0,25]

a) D'après le T.V de f sur l'intervalle $I = [\alpha, +\infty[$ h est continue et continue et strictement décroissante de $I = [\alpha, +\infty[$ vers $J =]-\infty, f(\alpha)]$

donc h réalise une bijection [0,25]

297

b) Calcul de $(h^{-1})'(0)$

On a $h(e) = 0 \Leftrightarrow h^{-1}(0) = e$

On a aussi $h'(e) = \frac{1}{e} - \ln e \Rightarrow h'(e) = \frac{1}{e} - 1$

$h'(e) = \frac{1-e}{e}$

$(h^{-1})'(x_0) = \frac{1}{h'(h^{-1}(x_0))}$

$(h^{-1})'(0) = \frac{1}{h'(h^{-1}(0))} = \frac{1}{h'(e)} = \frac{1}{\frac{1-e}{e}} = \frac{e}{1-e}$

$\Leftrightarrow (h^{-1})'(0) = \frac{e}{1-e}$ [0,25]

5.a) Montrons que $\int_1^e (x-1) \ln x \, dx = \frac{e^2-3}{4}$

On pose $\begin{cases} u = \ln x \\ v' = x-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u' = \frac{1}{x} \\ v = \frac{1}{2}x^2 - x \end{cases}$

$\int_1^e uv' = [uv]_1^e - \int_1^e u'v$

$\int_1^e (x-1) \ln x \, dx = \left[\left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) dx$

$= \left[\left(\frac{1}{2}e^2 - e \right) \ln e - \left(\frac{1}{2}(1)^2 - 1 \right) \ln 1 \right] - \int_1^e \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x \right) dx$

$= \frac{1}{2}e^2 - e - \left[\frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{4}x^2 \right]_1^e$

$= \frac{1}{2}e^2 - e - \left[\left(\frac{1}{12}e^3 - \frac{1}{4}e^2 \right) - \left(\frac{1}{12}(1)^3 - \frac{1}{4}(1)^2 \right) \right]$

$\frac{1}{2}e^2 - e - \frac{1}{12}e^3 + \frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{12} - \frac{1}{4} = \frac{2e^2 - e^3 - 3}{4} = \frac{e^2-3}{4}$

$\Leftrightarrow \int_1^e (x-1) \ln x \, dx = \frac{e^2-3}{4}$ [0,25]

b) $\mathcal{A} = \int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e (x-1)(1-\ln x) \, dx$

$= \int_1^e [x-1 - (x-1)\ln x] \, dx$

$= \int_1^e (x-1) \, dx - \int_1^e (x-1)\ln x \, dx$


$= \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^e - \frac{e^2-3}{4}$

$= \left(\frac{1}{2}e^2 - e \right) - \left(\frac{1}{2}(1)^2 - 1 \right) - \frac{e^2-3}{4} = \frac{2e^2 - 4e + 2 - e^2 + 3}{4} = \frac{e^2 - 4e + 5}{4}$

$\frac{e^2 - 4e + 5}{4} \quad \mathcal{A} = \int_1^e f(x) \, dx = \frac{e^2 - 4e + 5}{4} = 2,23$ [0,5]

c) Représentation graphique [0,5]

$\alpha = 1,75 \quad f(\alpha) = 0,3$



JUSTIFICATION DE L'EXERCICE [1]

Cette partie n'est pas demandée dans l'exercice

$U_n = 3^n + n - 1 ; V_n = U_{n+1} - U_n \text{ et } W_n = \ln\left(\frac{1+V_n}{2}\right)$

1. $U_1 = 3^1 + 1 - 1 \Leftrightarrow U_1 = 3$

$U_2 = 3^2 + 2 - 1 \Leftrightarrow U_2 = 10$

$U_3 = 3^3 + 3 - 1 \Leftrightarrow U_3 = 29$

$U_2 - U_1 = 10 - 3 = 7 \Leftrightarrow [U_2 - U_1 = 7]$

$U_3 - U_2 = 29 - 10 = 19 \Leftrightarrow [U_3 - U_2 = 19]$

$[U_3 - U_2 \neq U_2 - U_1] \text{ Donc } (U_n) \text{ n'est pas S.A.}$

$\frac{U_2}{U_1} = \frac{10}{3} \text{ et } \frac{U_3}{U_2} = \frac{29}{10}$

$\left[\frac{U_2}{U_1} \neq \frac{U_3}{U_2} \right] \text{ Donc } (U_n) \text{ n'est pas S.G.}$

Donc (U_n) n'est ni S.A. ni S.G.

Réponse C

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^{n+1}}{3} + \frac{n-1}{1} \right) = +\infty$

Donc (U_n) est divergente

Réponse B

3. On pose :

$a_n = 3^n$ c'est une S.G. de raison $q = 3$ et de premier terme

$a_0 = 1$

$b_n = n - 1$ c'est une S.A. de raison $r = 1$ et de premier terme

$b_0 = -1$

$A_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n$

$\Leftrightarrow A_n = a_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} = 1 \frac{3^{n+1} - 1}{3 - 1} \Leftrightarrow A_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$

$B_n = b_0 + b_1 + \dots + b_n$

$B_n = \frac{n+1}{2} (b_0 + b_n) = \frac{n+1}{2} (-1 + n - 1)$

$\Leftrightarrow B_n = \frac{(n+1)(n-2)}{2}$

$U_n = 3^n + n - 1 \Leftrightarrow U_n = a_n + b_n$

On a $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

$\begin{cases} U_0 = a_0 + b_0 \\ U_1 = a_1 + b_1 \\ \vdots \\ U_n = a_n + b_n \end{cases}$

$S_n = A_n + B_n \Leftrightarrow S_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2} + \frac{(n+1)(n-2)}{2}$

Réponse A

4.

$V_n = U_{n+1} - U_n = 3^{n+1} + (n+1) - 1 - (3^n + n - 1)$
 $= 3 \times 3^n + n + 1 - 1 - 3^n - n + 1 = (3 - 1) \times 3^n + 1$

$V_n = 2 \times 3^n + 1$

Réponse A

5. $V_n \geq 2019 \Leftrightarrow 2 \times 3^n + 1 \geq 2019 \Leftrightarrow 3^n \geq 1009$

$\Leftrightarrow \ln(3^n) \geq \ln(1009) \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(1009)}{\ln(3)} = 6,29 \Leftrightarrow n \geq 7$

Le plus petit entier est $n_0 = 7$

Réponse B

$W_n = \ln\left(\frac{1+V_n}{2}\right) = \ln\left(\frac{1+2 \times 3^n + 1}{2}\right) = \ln(3^n)$

$\Leftrightarrow W_n = n \ln(3)$ c'est une S.A. de raison $r = \ln(3)$ et de premier $W_0 = 0$ donc $T_n = W_0 + W_1 + \dots + W_n$

$T_n = \frac{n+1}{2} (W_0 + W_n) = \frac{n+1}{2} (0 + n \ln(3))$

$\Leftrightarrow T_n = \frac{n^2 + n}{2} \ln(3)$

Réponse C

218