Table 2: Coverage (%) − Shrinkage

Scenario I: all means are 0 for T0,T1,...,T10

	None adjustment										
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**	**Joint**
0%	95.05	94.71	94.69	95.12	94.77	95.24	94.91	94.98	94.89	95.16	72.79
Imputation using linear regression											
10%	95.27	94.62	94.36	94.53	94.79	94.63	94.40	94.73	94.61	94.71	71.41
20%	95.23	94.77	94.90	95.24	95.26	94.80	95.09	95.17	94.94	94.81	72.19
30%	95.31	95.60	95.12	95.32	95.14	95.54	95.51	95.36	95.69	95.19	73.89
40%	95.72	95.62	96.01	95.87	95.53	95.98	95.63	95.88	95.77	95.79	75.81
Imputation using predictive mean matching method											
10%	94.28	93.58	93.46	93.61	93.90	93.64	93.38	93.78	93.84	93.75	67.40
20%	92.97	92.76	92.43	92.60	93.02	92.45	92.62	92.91	92.65	92.68	63.02
30%	91.14	91.47	91.02	91.35	91.06	91.62	91.12	91.22	91.72	91.11	57.60
40%	89.64	89.36	89.86	89.79	89.60	89.59	89.76	89.60	89.64	89.41	51.42
Imputation using propensity−score method											
10%	94.30	93.49	93.48	93.47	93.90	93.68	93.23	93.80	93.64	93.60	67.12
20%	92.85	92.41	92.23	92.78	92.91	92.11	92.63	92.79	92.61	92.37	62.10
30%	90.93	91.09	90.69	91.00	90.60	91.23	90.93	90.82	91.31	91.04	56.43
40%	89.06	89.12	88.89	88.79	88.69	89.17	89.08	89.34	88.92	88.97	49.43

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 2: Coverage (%) − Shrinkage

Scenario I: all means are 0 for T0,T1,...,T10

	Many−to−one adjustment										
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**	**Joint**
0%	99.31	99.24	99.34	99.29	99.14	99.16	99.17	99.15	99.00	99.17	94.38
Imputation using linear regression											
10%	99.47	99.30	99.32	99.15	99.30	99.21	99.07	99.16	99.16	99.22	94.56
20%	99.47	99.40	99.35	99.48	99.43	99.23	99.38	99.41	99.18	99.31	95.18
30%	99.47	99.57	99.36	99.40	99.33	99.45	99.50	99.41	99.47	99.43	95.78
40%	99.54	99.45	99.50	99.47	99.43	99.54	99.56	99.51	99.40	99.52	95.89
Imputation using predictive mean matching method											
10%	99.26	98.97	99.00	98.98	98.96	99.05	98.74	98.85	98.84	98.91	92.69
20%	98.93	98.85	98.79	98.83	98.90	98.54	98.81	98.83	98.51	98.67	91.46
30%	98.28	98.41	98.25	98.23	97.94	98.36	98.13	98.21	98.23	98.20	88.59
40%	97.59	97.60	97.76	97.51	97.30	97.53	97.48	97.61	97.14	97.51	84.31
Imputation using propensity−score method											
10%	99.28	99.02	98.99	98.99	98.97	99.00	98.74	98.90	98.89	98.93	92.85
20%	98.84	98.75	98.75	98.87	98.84	98.45	98.78	98.66	98.33	98.49	90.85
30%	98.35	98.49	97.94	97.95	98.00	98.13	98.16	98.08	98.11	97.77	87.88
40%	97.34	97.37	97.52	97.13	97.03	97.04	97.24	97.36	96.80	97.11	82.82

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 2: Coverage (%) − Shrinkage

Scenario II: mu0=0, mu1=1.5, mu2=2.0, ..., mu10=6.0

	None adjustment										
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**	**Joint**
0%	94.98	95.11	95.25	95.36	95.05	94.76	95.06	95.46	94.70	95.03	73.01
Imputation using linear regression											
10%	94.78	95.16	94.74	94.18	94.48	94.79	94.44	94.54	94.95	94.56	70.36
20%	95.24	94.68	95.31	95.30	95.20	95.16	95.24	95.47	95.10	95.03	73.21
30%	95.01	95.74	95.50	95.12	95.33	95.36	95.37	95.42	95.30	95.42	74.20
40%	96.00	95.77	95.71	96.04	95.86	95.87	95.60	95.94	95.84	95.62	76.07
Imputation using predictive mean matching method											
10%	93.85	94.00	93.77	93.07	93.28	93.67	93.56	93.73	93.84	93.48	66.07
20%	93.28	92.64	92.99	92.98	93.04	92.97	92.93	93.02	92.85	92.82	63.72
30%	91.49	91.77	91.43	91.62	91.43	91.30	91.73	91.71	91.45	91.48	58.77
40%	89.38	89.24	88.86	89.35	89.15	89.25	89.41	89.58	89.51	89.31	50.35
Imputation using propensity−score method											
10%	93.77	94.03	93.58	93.22	93.11	93.68	93.41	93.70	93.79	93.46	65.67
20%	93.16	92.37	92.79	92.67	92.62	92.61	92.80	92.71	92.42	92.46	62.64
30%	90.83	91.40	91.03	90.98	90.60	90.48	90.76	90.71	90.54	90.79	55.58
40%	89.11	88.93	88.41	88.42	88.68	88.52	88.03	88.42	87.95	87.56	46.68

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 2: Coverage (%) − Shrinkage

Scenario II: mu0=0, mu1=1.5, mu2=2.0, ..., mu10=6.0

	Many−to−one adjustment										
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**	**Joint**
0%	99.28	99.28	99.28	99.31	99.20	99.12	99.19	99.31	98.94	99.32	94.29
Imputation using linear regression											
10%	99.45	99.35	99.38	99.25	99.22	99.28	99.25	99.26	99.32	99.15	94.91
20%	99.45	99.46	99.48	99.22	99.33	99.32	99.27	99.37	99.31	99.08	95.43
30%	99.34	99.42	99.42	99.43	99.42	99.39	99.30	99.27	99.36	99.37	95.44
40%	99.48	99.54	99.46	99.40	99.46	99.54	99.48	99.43	99.52	99.40	96.32
Imputation using predictive mean matching method											
10%	99.24	99.07	99.10	98.90	98.94	99.11	99.07	99.03	98.99	98.85	93.12
20%	98.82	98.71	98.85	98.76	98.64	98.68	98.59	98.72	98.64	98.49	91.60
30%	98.30	98.42	98.51	98.48	98.41	98.11	98.23	98.17	98.10	98.16	88.75
40%	97.63	97.61	97.41	97.32	97.32	97.57	97.16	97.37	97.43	97.04	84.00
Imputation using propensity−score method											
10%	99.17	99.07	99.13	98.88	98.90	99.04	99.03	99.06	99.00	98.84	93.08
20%	98.76	98.72	98.73	98.65	98.57	98.66	98.52	98.68	98.53	98.25	90.95
30%	98.06	98.22	98.16	98.18	98.16	97.93	97.94	97.99	97.70	97.63	87.38
40%	97.48	97.48	97.04	97.28	97.10	96.90	96.87	96.72	96.75	96.27	81.39

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 3: Average interval length (expansion %) − Shrinkage

Scenario I: all means are 0 for T0,T1,...,T10

	None adjustment									
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**
0%	4.027	4.049	4.069	4.089	4.103	4.126	4.148	4.167	4.185	4.210
Imputation using linear regression										
10%	4.184 (3.90)	4.201 (3.76)	4.218 (3.66)	4.239 (3.65)	4.266 (3.97)	4.284 (3.81)	4.310 (3.90)	4.324 (3.76)	4.344 (3.80)	4.364 (3.66)
20%	4.543 (12.80)	4.561 (12.63)	4.579 (12.55)	4.604 (12.58)	4.634 (12.93)	4.657 (12.86)	4.678 (12.78)	4.699 (12.76)	4.712 (12.59)	4.747 (12.75)
30%	5.033 (24.96)	5.079 (25.43)	5.081 (24.89)	5.114 (25.04)	5.147 (25.44)	5.170 (25.29)	5.184 (24.97)	5.222 (25.33)	5.236 (25.12)	5.254 (24.81)
40%	5.787 (43.70)	5.799 (43.22)	5.846 (43.67)	5.887 (43.96)	5.934 (44.61)	5.961 (44.45)	5.963 (43.76)	6.008 (44.18)	6.028 (44.04)	6.072 (44.24)
Imputation using predictive mean matching method										
10%	4.005 (−0.56)	4.022 (−0.68)	4.037 (−0.77)	4.059 (−0.75)	4.082 (−0.51)	4.102 (−0.60)	4.123 (−0.60)	4.139 (−0.68)	4.156 (−0.68)	4.179 (−0.74)
20%	4.114 (2.16)	4.130 (2.00)	4.148 (1.94)	4.172 (2.02)	4.198 (2.30)	4.217 (2.20)	4.234 (2.09)	4.257 (2.15)	4.269 (2.01)	4.302 (2.18)
30%	4.229 (5.00)	4.260 (5.21)	4.271 (4.96)	4.291 (4.94)	4.318 (5.24)	4.337 (5.11)	4.357 (5.05)	4.386 (5.24)	4.397 (5.08)	4.417 (4.91)
40%	4.345 (7.89)	4.364 (7.78)	4.386 (7.80)	4.419 (8.06)	4.443 (8.29)	4.468 (8.27)	4.486 (8.16)	4.504 (8.09)	4.518 (7.96)	4.545 (7.96)
Imputation using propensity−score method										
10%	4.014 (−0.34)	4.033 (−0.41)	4.046 (−0.55)	4.070 (−0.49)	4.093 (−0.25)	4.112 (−0.35)	4.135 (−0.31)	4.148 (−0.46)	4.168 (−0.39)	4.189 (−0.51)
20%	4.139 (2.78)	4.157 (2.66)	4.172 (2.55)	4.200 (2.71)	4.224 (2.95)	4.242 (2.80)	4.258 (2.65)	4.282 (2.75)	4.297 (2.69)	4.325 (2.75)
30%	4.252 (5.59)	4.282 (5.76)	4.296 (5.58)	4.313 (5.47)	4.341 (5.81)	4.362 (5.70)	4.384 (5.68)	4.409 (5.81)	4.423 (5.70)	4.436 (5.38)
40%	4.342 (7.82)	4.361 (7.70)	4.388 (7.85)	4.418 (8.03)	4.444 (8.30)	4.465 (8.22)	4.485 (8.13)	4.502 (8.04)	4.522 (8.06)	4.544 (7.95)

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 3: Average interval length (expansion %) − Shrinkage

Scenario I: all means are 0 for T0,T1,...,T10

	Many−to−one adjustment									
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**
0%	5.470	5.474	5.479	5.480	5.482	5.487	5.492	5.493	5.498	5.502
Imputation using linear regression										
10%	5.809 (6.20)	5.815 (6.22)	5.822 (6.26)	5.829 (6.38)	5.843 (6.59)	5.849 (6.60)	5.865 (6.79)	5.873 (6.91)	5.880 (6.95)	5.889 (7.03)
20%	6.309 (15.33)	6.319 (15.42)	6.333 (15.59)	6.347 (15.83)	6.369 (16.18)	6.388 (16.42)	6.401 (16.56)	6.417 (16.80)	6.423 (16.82)	6.449 (17.21)
30%	6.980 (27.59)	7.029 (28.39)	7.022 (28.17)	7.054 (28.72)	7.084 (29.21)	7.104 (29.48)	7.112 (29.51)	7.151 (30.17)	7.164 (30.30)	7.178 (30.46)
40%	8.006 (46.36)	8.016 (46.43)	8.065 (47.20)	8.110 (48.00)	8.165 (48.93)	8.192 (49.31)	8.188 (49.09)	8.240 (50.00)	8.264 (50.30)	8.315 (51.11)
Imputation using predictive mean matching method										
10%	5.564 (1.70)	5.569 (1.72)	5.574 (1.74)	5.579 (1.82)	5.587 (1.92)	5.594 (1.95)	5.604 (2.04)	5.611 (2.15)	5.616 (2.14)	5.625 (2.23)
20%	5.724 (4.63)	5.728 (4.64)	5.739 (4.75)	5.749 (4.92)	5.764 (5.14)	5.776 (5.27)	5.783 (5.30)	5.797 (5.53)	5.802 (5.52)	5.822 (5.80)
30%	5.883 (7.54)	5.908 (7.92)	5.910 (7.87)	5.926 (8.15)	5.942 (8.39)	5.958 (8.58)	5.969 (8.69)	5.991 (9.05)	5.999 (9.11)	6.011 (9.25)
40%	6.044 (10.49)	6.060 (10.70)	6.074 (10.86)	6.104 (11.39)	6.124 (11.71)	6.145 (12.00)	6.158 (12.13)	6.173 (12.36)	6.185 (12.50)	6.207 (12.80)
Imputation using propensity−score method										
10%	5.576 (1.94)	5.583 (1.99)	5.588 (1.99)	5.595 (2.10)	5.603 (2.20)	5.610 (2.24)	5.621 (2.36)	5.626 (2.42)	5.633 (2.46)	5.641 (2.52)
20%	5.757 (5.25)	5.765 (5.30)	5.773 (5.38)	5.788 (5.62)	5.802 (5.84)	5.812 (5.92)	5.818 (5.94)	5.834 (6.20)	5.844 (6.28)	5.858 (6.46)
30%	5.913 (8.09)	5.938 (8.47)	5.944 (8.50)	5.958 (8.73)	5.975 (9.00)	5.992 (9.21)	6.007 (9.38)	6.025 (9.68)	6.038 (9.82)	6.044 (9.84)
40%	6.035 (10.32)	6.051 (10.54)	6.073 (10.85)	6.100 (11.32)	6.122 (11.68)	6.141 (11.93)	6.156 (12.10)	6.170 (12.31)	6.191 (12.60)	6.208 (12.83)

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 3: Average interval length (expansion %) − Shrinkage

Scenario II: mu0=0, mu1=1.5, mu2=2.0, ..., mu10=6.0

	None adjustment									
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**
0%	4.036	4.048	4.065	4.088	4.111	4.125	4.147	4.169	4.184	4.203
Imputation using linear regression										
10%	4.160 (3.07)	4.180 (3.27)	4.207 (3.50)	4.223 (3.31)	4.248 (3.34)	4.261 (3.30)	4.285 (3.31)	4.300 (3.13)	4.329 (3.46)	4.347 (3.42)
20%	4.539 (12.47)	4.562 (12.70)	4.592 (12.98)	4.606 (12.66)	4.630 (12.63)	4.662 (13.03)	4.668 (12.56)	4.697 (12.65)	4.719 (12.78)	4.747 (12.95)
30%	5.040 (24.88)	5.072 (25.32)	5.097 (25.39)	5.121 (25.26)	5.143 (25.10)	5.155 (24.99)	5.190 (25.15)	5.218 (25.14)	5.240 (25.25)	5.267 (25.32)
40%	5.803 (43.80)	5.846 (44.42)	5.841 (43.71)	5.872 (43.64)	5.911 (43.78)	5.931 (43.79)	5.967 (43.88)	6.016 (44.29)	6.012 (43.69)	6.095 (45.02)
Imputation using predictive mean matching method										
10%	3.984 (−1.29)	4.006 (−1.03)	4.029 (−0.87)	4.046 (−1.04)	4.068 (−1.04)	4.080 (−1.07)	4.107 (−0.97)	4.120 (−1.19)	4.147 (−0.88)	4.164 (−0.94)
20%	4.113 (1.92)	4.128 (2.00)	4.156 (2.26)	4.168 (1.96)	4.191 (1.95)	4.218 (2.26)	4.229 (1.98)	4.244 (1.80)	4.272 (2.11)	4.298 (2.25)
30%	4.238 (5.02)	4.266 (5.40)	4.284 (5.39)	4.310 (5.43)	4.320 (5.08)	4.336 (5.12)	4.362 (5.18)	4.387 (5.22)	4.408 (5.35)	4.426 (5.31)
40%	4.345 (7.65)	4.374 (8.07)	4.394 (8.10)	4.409 (7.84)	4.440 (8.00)	4.453 (7.97)	4.475 (7.91)	4.484 (7.55)	4.520 (8.03)	4.544 (8.11)
Imputation using propensity−score method										
10%	3.993 (−1.06)	4.014 (−0.82)	4.039 (−0.63)	4.056 (−0.80)	4.078 (−0.80)	4.091 (−0.82)	4.117 (−0.74)	4.128 (−0.99)	4.158 (−0.61)	4.174 (−0.70)
20%	4.140 (2.59)	4.153 (2.60)	4.183 (2.91)	4.195 (2.62)	4.218 (2.60)	4.245 (2.93)	4.255 (2.59)	4.276 (2.55)	4.298 (2.73)	4.328 (2.97)
30%	4.263 (5.63)	4.293 (6.06)	4.311 (6.06)	4.339 (6.14)	4.348 (5.76)	4.368 (5.89)	4.393 (5.93)	4.422 (6.07)	4.446 (6.26)	4.471 (6.38)
40%	4.353 (7.87)	4.378 (8.15)	4.399 (8.23)	4.419 (8.10)	4.454 (8.35)	4.481 (8.64)	4.505 (8.62)	4.520 (8.40)	4.563 (9.06)	4.593 (9.28)

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 3: Average interval length (expansion %) − Shrinkage

Scenario II: mu0=0, mu1=1.5, mu2=2.0, ..., mu10=6.0

	Many−to−one adjustment									
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**
0%	5.474	5.476	5.478	5.482	5.485	5.489	5.493	5.496	5.499	5.503
Imputation using linear regression										
10%	5.791 (5.79)	5.797 (5.87)	5.811 (6.09)	5.818 (6.13)	5.829 (6.27)	5.835 (6.30)	5.843 (6.37)	5.855 (6.53)	5.867 (6.70)	5.874 (6.74)
20%	6.300 (15.09)	6.317 (15.36)	6.341 (15.76)	6.347 (15.78)	6.365 (16.03)	6.388 (16.39)	6.390 (16.33)	6.414 (16.70)	6.426 (16.86)	6.447 (17.16)
30%	6.988 (27.65)	7.017 (28.14)	7.039 (28.50)	7.057 (28.74)	7.083 (29.13)	7.089 (29.15)	7.122 (29.65)	7.145 (30.00)	7.166 (30.31)	7.192 (30.69)
40%	8.023 (46.56)	8.069 (47.35)	8.056 (47.08)	8.092 (47.61)	8.131 (48.23)	8.153 (48.53)	8.192 (49.13)	8.251 (50.12)	8.236 (49.78)	8.339 (51.55)
Imputation using predictive mean matching method										
10%	5.549 (1.36)	5.557 (1.48)	5.565 (1.59)	5.570 (1.61)	5.578 (1.68)	5.581 (1.67)	5.590 (1.76)	5.598 (1.85)	5.607 (1.97)	5.611 (1.96)
20%	5.717 (4.45)	5.725 (4.55)	5.741 (4.81)	5.743 (4.77)	5.759 (4.98)	5.773 (5.17)	5.778 (5.19)	5.785 (5.26)	5.800 (5.47)	5.814 (5.65)
30%	5.893 (7.65)	5.911 (7.94)	5.922 (8.11)	5.941 (8.37)	5.950 (8.46)	5.956 (8.52)	5.974 (8.76)	5.992 (9.02)	6.007 (9.23)	6.020 (9.39)
40%	6.040 (10.34)	6.064 (10.74)	6.080 (11.00)	6.091 (11.12)	6.116 (11.51)	6.127 (11.62)	6.145 (11.87)	6.151 (11.91)	6.183 (12.44)	6.203 (12.71)
Imputation using propensity−score method										
10%	5.562 (1.60)	5.569 (1.70)	5.578 (1.83)	5.584 (1.87)	5.592 (1.94)	5.596 (1.96)	5.604 (2.02)	5.611 (2.10)	5.624 (2.26)	5.626 (2.24)
20%	5.754 (5.11)	5.760 (5.18)	5.779 (5.51)	5.783 (5.49)	5.797 (5.69)	5.812 (5.89)	5.814 (5.85)	5.830 (6.08)	5.839 (6.18)	5.858 (6.46)
30%	5.929 (8.30)	5.951 (8.68)	5.962 (8.85)	5.984 (9.16)	5.992 (9.23)	6.003 (9.36)	6.020 (9.60)	6.045 (10.00)	6.062 (10.24)	6.082 (10.51)
40%	6.057 (10.65)	6.075 (10.95)	6.095 (11.27)	6.111 (11.48)	6.143 (11.99)	6.169 (12.40)	6.188 (12.65)	6.199 (12.79)	6.241 (13.49)	6.265 (13.85)

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 2: Coverage (%) − Non−shrinkage

Scenario I: all means are 0 for T0,T1,...,T10

	None adjustment										
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**	**Joint**
0%	95.05	94.71	94.69	95.12	94.77	95.24	94.91	94.98	94.89	95.16	72.79
Imputation using linear regression											
10%	95.27	94.62	94.36	94.53	94.79	94.63	94.40	94.73	94.61	94.71	71.41
20%	95.23	94.77	94.90	95.24	95.26	94.80	95.09	95.17	94.94	94.81	72.19
30%	95.31	95.60	95.12	95.32	95.14	95.54	95.51	95.36	95.69	95.19	73.89
40%	95.72	95.62	96.01	95.87	95.53	95.98	95.63	95.88	95.77	95.79	75.81
Imputation using predictive mean matching method											
10%	94.28	93.58	93.46	93.61	93.90	93.64	93.38	93.78	93.84	93.75	67.40
20%	92.97	92.76	92.43	92.60	93.02	92.45	92.62	92.91	92.65	92.68	63.02
30%	91.14	91.47	91.02	91.35	91.06	91.62	91.12	91.22	91.72	91.11	57.60
40%	89.64	89.36	89.86	89.79	89.60	89.59	89.76	89.60	89.64	89.41	51.42
Imputation using propensity−score method											
10%	94.30	93.49	93.48	93.47	93.90	93.68	93.23	93.80	93.64	93.60	67.12
20%	92.85	92.41	92.23	92.78	92.91	92.11	92.63	92.79	92.61	92.37	62.10
30%	90.93	91.09	90.69	91.00	90.60	91.23	90.93	90.82	91.31	91.04	56.43
40%	89.06	89.12	88.89	88.79	88.69	89.17	89.08	89.34	88.92	88.97	49.43

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 2: Coverage (%) − Non−shrinkage

Scenario I: all means are 0 for T0,T1,...,T10

	Many−to−one adjustment										
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**	**Joint**
0%	98.96	98.91	99.15	99.18	98.96	99.02	99.03	99.04	98.90	99.17	93.36
Imputation using linear regression											
10%	99.32	99.10	98.95	98.98	99.10	99.13	98.87	99.17	99.04	99.11	93.49
20%	99.24	99.20	99.05	99.28	99.30	99.17	99.25	99.28	99.19	99.31	94.34
30%	99.23	99.45	99.21	99.31	99.21	99.29	99.33	99.30	99.36	99.37	95.00
40%	99.35	99.34	99.42	99.31	99.34	99.42	99.47	99.44	99.27	99.42	95.16
Imputation using predictive mean matching method											
10%	99.01	98.74	98.70	98.75	98.83	98.82	98.55	98.86	98.73	98.81	91.87
20%	98.55	98.43	98.28	98.54	98.53	98.29	98.56	98.63	98.38	98.38	89.88
30%	97.85	97.97	97.64	97.81	97.63	98.00	98.04	98.01	98.07	98.02	86.78
40%	97.20	97.01	97.38	97.06	96.91	97.12	97.09	97.34	96.81	97.16	82.11
Imputation using propensity−score method											
10%	99.04	98.73	98.66	98.74	98.78	98.79	98.57	98.87	98.63	98.78	91.57
20%	98.47	98.31	98.39	98.63	98.49	98.23	98.54	98.56	98.35	98.48	89.65
30%	97.93	97.99	97.61	97.65	97.64	97.78	97.93	97.80	97.98	97.62	85.84
40%	96.68	96.89	97.00	96.69	96.66	96.66	96.95	96.91	96.60	96.97	80.61

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 2: Coverage (%) − Non−shrinkage

Scenario II: mu0=0, mu1=1.5, mu2=2.0, ..., mu10=6.0

	None adjustment										
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**	**Joint**
0%	94.98	95.11	95.25	95.36	95.05	94.76	95.06	95.46	94.70	95.03	73.01
Imputation using linear regression											
10%	94.78	95.16	94.74	94.18	94.48	94.79	94.44	94.54	94.95	94.56	70.36
20%	95.24	94.68	95.31	95.30	95.20	95.16	95.24	95.47	95.10	95.03	73.21
30%	95.01	95.74	95.50	95.12	95.33	95.36	95.37	95.42	95.30	95.42	74.20
40%	96.00	95.77	95.71	96.04	95.86	95.87	95.60	95.94	95.84	95.62	76.07
Imputation using predictive mean matching method											
10%	93.85	94.00	93.77	93.07	93.28	93.67	93.56	93.73	93.84	93.48	66.07
20%	93.28	92.64	92.99	92.98	93.04	92.97	92.93	93.02	92.85	92.82	63.72
30%	91.49	91.77	91.43	91.62	91.43	91.30	91.73	91.71	91.45	91.48	58.77
40%	89.38	89.24	88.86	89.35	89.15	89.25	89.41	89.58	89.51	89.31	50.35
Imputation using propensity−score method											
10%	93.77	94.03	93.58	93.22	93.11	93.68	93.41	93.70	93.79	93.46	65.67
20%	93.16	92.37	92.79	92.67	92.62	92.61	92.80	92.71	92.42	92.46	62.64
30%	90.83	91.40	91.03	90.98	90.60	90.48	90.76	90.71	90.54	90.79	55.58
40%	89.11	88.93	88.41	88.42	88.68	88.52	88.03	88.42	87.95	87.56	46.68

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 2: Coverage (%) − Non−shrinkage

Scenario II: mu0=0, mu1=1.5, mu2=2.0, ..., mu10=6.0

	Many−to−one adjustment										
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**	**Joint**
0%	99.07	99.15	99.09	99.04	99.12	99.15	99.18	99.21	98.92	99.16	93.46
Imputation using linear regression											
10%	99.19	99.17	99.18	99.10	99.16	99.16	99.15	99.17	99.23	98.99	93.84
20%	99.26	99.18	99.26	99.10	99.18	99.18	99.23	99.34	99.19	98.88	94.41
30%	99.21	99.30	99.28	99.31	99.22	99.26	99.19	99.18	99.24	99.22	94.59
40%	99.30	99.40	99.28	99.35	99.29	99.32	99.38	99.32	99.40	99.33	95.41
Imputation using predictive mean matching method											
10%	98.94	98.82	98.89	98.67	98.87	98.89	98.89	98.88	98.92	98.70	91.98
20%	98.42	98.33	98.59	98.44	98.48	98.57	98.35	98.44	98.48	98.34	90.06
30%	97.87	98.09	98.04	98.08	97.89	97.86	98.05	97.86	97.93	97.94	86.93
40%	97.08	97.22	96.89	96.91	96.80	97.07	96.78	97.18	97.14	96.99	81.60
Imputation using propensity−score method											
10%	98.94	98.82	98.90	98.70	98.82	98.84	98.92	98.91	98.84	98.63	91.83
20%	98.36	98.29	98.60	98.30	98.38	98.43	98.30	98.48	98.31	98.29	89.43
30%	97.47	97.79	97.72	97.82	97.76	97.44	97.69	97.70	97.43	97.43	85.26
40%	96.82	97.00	96.56	96.81	96.53	96.65	96.37	96.23	96.46	96.14	78.96

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 3: Average interval length (expansion %) − Non−shrinkage

Scenario I: all means are 0 for T0,T1,...,T10

	None adjustment									
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**
0%	4.027	4.049	4.069	4.089	4.103	4.126	4.148	4.167	4.185	4.210
Imputation using linear regression										
10%	4.184 (3.90)	4.201 (3.76)	4.218 (3.66)	4.239 (3.65)	4.266 (3.97)	4.284 (3.81)	4.310 (3.90)	4.324 (3.76)	4.344 (3.80)	4.364 (3.66)
20%	4.543 (12.80)	4.561 (12.63)	4.579 (12.55)	4.604 (12.58)	4.634 (12.93)	4.657 (12.86)	4.678 (12.78)	4.699 (12.76)	4.712 (12.59)	4.747 (12.75)
30%	5.033 (24.96)	5.079 (25.43)	5.081 (24.89)	5.114 (25.04)	5.147 (25.44)	5.170 (25.29)	5.184 (24.97)	5.222 (25.33)	5.236 (25.12)	5.254 (24.81)
40%	5.787 (43.70)	5.799 (43.22)	5.846 (43.67)	5.887 (43.96)	5.934 (44.61)	5.961 (44.45)	5.963 (43.76)	6.008 (44.18)	6.028 (44.04)	6.072 (44.24)
Imputation using predictive mean matching method										
10%	4.005 (−0.56)	4.022 (−0.68)	4.037 (−0.77)	4.059 (−0.75)	4.082 (−0.51)	4.102 (−0.60)	4.123 (−0.60)	4.139 (−0.68)	4.156 (−0.68)	4.179 (−0.74)
20%	4.114 (2.16)	4.130 (2.00)	4.148 (1.94)	4.172 (2.02)	4.198 (2.30)	4.217 (2.20)	4.234 (2.09)	4.257 (2.15)	4.269 (2.01)	4.302 (2.18)
30%	4.229 (5.00)	4.260 (5.21)	4.271 (4.96)	4.291 (4.94)	4.318 (5.24)	4.337 (5.11)	4.357 (5.05)	4.386 (5.24)	4.397 (5.08)	4.417 (4.91)
40%	4.345 (7.89)	4.364 (7.78)	4.386 (7.80)	4.419 (8.06)	4.443 (8.29)	4.468 (8.27)	4.486 (8.16)	4.504 (8.09)	4.518 (7.96)	4.545 (7.96)
Imputation using propensity−score method										
10%	4.014 (−0.34)	4.033 (−0.41)	4.046 (−0.55)	4.070 (−0.49)	4.093 (−0.25)	4.112 (−0.35)	4.135 (−0.31)	4.148 (−0.46)	4.168 (−0.39)	4.189 (−0.51)
20%	4.139 (2.78)	4.157 (2.66)	4.172 (2.55)	4.200 (2.71)	4.224 (2.95)	4.242 (2.80)	4.258 (2.65)	4.282 (2.75)	4.297 (2.69)	4.325 (2.75)
30%	4.252 (5.59)	4.282 (5.76)	4.296 (5.58)	4.313 (5.47)	4.341 (5.81)	4.362 (5.70)	4.384 (5.68)	4.409 (5.81)	4.423 (5.70)	4.436 (5.38)
40%	4.342 (7.82)	4.361 (7.70)	4.388 (7.85)	4.418 (8.03)	4.444 (8.30)	4.465 (8.22)	4.485 (8.13)	4.502 (8.04)	4.522 (8.06)	4.544 (7.95)

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 3: Average interval length (expansion %) − Non−shrinkage

Scenario I: all means are 0 for T0,T1,...,T10

	Many−to−one adjustment									
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**
0%	5.405	5.435	5.461	5.489	5.508	5.539	5.569	5.594	5.618	5.652
Imputation using linear regression										
10%	5.756 (6.49)	5.779 (6.34)	5.802 (6.24)	5.831 (6.22)	5.868 (6.54)	5.893 (6.38)	5.929 (6.47)	5.948 (6.32)	5.976 (6.37)	6.003 (6.21)
20%	6.248 (15.60)	6.273 (15.42)	6.298 (15.33)	6.332 (15.35)	6.374 (15.71)	6.406 (15.64)	6.434 (15.55)	6.463 (15.53)	6.481 (15.37)	6.530 (15.53)
30%	6.918 (27.99)	6.981 (28.46)	6.985 (27.91)	7.030 (28.06)	7.075 (28.45)	7.107 (28.31)	7.127 (27.99)	7.180 (28.34)	7.198 (28.13)	7.224 (27.81)
40%	7.942 (46.94)	7.959 (46.44)	8.023 (46.91)	8.080 (47.18)	8.143 (47.84)	8.181 (47.69)	8.185 (46.98)	8.247 (47.42)	8.275 (47.29)	8.337 (47.50)
Imputation using predictive mean matching method										
10%	5.510 (1.95)	5.534 (1.82)	5.555 (1.72)	5.585 (1.74)	5.617 (1.98)	5.644 (1.89)	5.674 (1.88)	5.695 (1.79)	5.719 (1.80)	5.750 (1.73)
20%	5.661 (4.74)	5.684 (4.58)	5.707 (4.51)	5.741 (4.59)	5.776 (4.87)	5.803 (4.76)	5.827 (4.64)	5.858 (4.71)	5.875 (4.56)	5.920 (4.74)
30%	5.817 (7.63)	5.861 (7.84)	5.876 (7.59)	5.904 (7.56)	5.941 (7.86)	5.968 (7.73)	5.996 (7.67)	6.034 (7.86)	6.050 (7.69)	6.077 (7.52)
40%	5.976 (10.57)	6.003 (10.45)	6.033 (10.47)	6.079 (10.73)	6.111 (10.95)	6.145 (10.93)	6.171 (10.82)	6.196 (10.75)	6.215 (10.62)	6.252 (10.61)
Imputation using propensity−score method										
10%	5.522 (2.16)	5.548 (2.08)	5.567 (1.94)	5.599 (1.99)	5.631 (2.23)	5.658 (2.13)	5.689 (2.17)	5.707 (2.01)	5.735 (2.08)	5.763 (1.96)
20%	5.693 (5.33)	5.718 (5.20)	5.739 (5.08)	5.778 (5.25)	5.810 (5.49)	5.835 (5.33)	5.857 (5.17)	5.890 (5.28)	5.911 (5.21)	5.950 (5.27)
30%	5.846 (8.17)	5.888 (8.34)	5.907 (8.16)	5.931 (8.04)	5.970 (8.38)	5.998 (8.27)	6.028 (8.25)	6.063 (8.37)	6.082 (8.26)	6.101 (7.94)
40%	5.966 (10.38)	5.992 (10.25)	6.029 (10.40)	6.070 (10.58)	6.106 (10.86)	6.136 (10.77)	6.163 (10.67)	6.187 (10.58)	6.214 (10.60)	6.245 (10.49)

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 3: Average interval length (expansion %) − Non−shrinkage

Scenario II: mu0=0, mu1=1.5, mu2=2.0, ..., mu10=6.0

	None adjustment									
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**
0%	4.036	4.048	4.065	4.088	4.111	4.125	4.147	4.169	4.184	4.203
Imputation using linear regression										
10%	4.160 (3.07)	4.180 (3.27)	4.207 (3.50)	4.223 (3.31)	4.248 (3.34)	4.261 (3.30)	4.285 (3.31)	4.300 (3.13)	4.329 (3.46)	4.347 (3.42)
20%	4.539 (12.47)	4.562 (12.70)	4.592 (12.98)	4.606 (12.66)	4.630 (12.63)	4.662 (13.03)	4.668 (12.56)	4.697 (12.65)	4.719 (12.78)	4.747 (12.95)
30%	5.040 (24.88)	5.072 (25.32)	5.097 (25.39)	5.121 (25.26)	5.143 (25.10)	5.155 (24.99)	5.190 (25.15)	5.218 (25.14)	5.240 (25.25)	5.267 (25.32)
40%	5.803 (43.80)	5.846 (44.42)	5.841 (43.71)	5.872 (43.64)	5.911 (43.78)	5.931 (43.79)	5.967 (43.88)	6.016 (44.29)	6.012 (43.69)	6.095 (45.02)
Imputation using predictive mean matching method										
10%	3.984 (−1.29)	4.006 (−1.03)	4.029 (−0.87)	4.046 (−1.04)	4.068 (−1.04)	4.080 (−1.07)	4.107 (−0.97)	4.120 (−1.19)	4.147 (−0.88)	4.164 (−0.94)
20%	4.113 (1.92)	4.128 (2.00)	4.156 (2.26)	4.168 (1.96)	4.191 (1.95)	4.218 (2.26)	4.229 (1.98)	4.244 (1.80)	4.272 (2.11)	4.298 (2.25)
30%	4.238 (5.02)	4.266 (5.40)	4.284 (5.39)	4.310 (5.43)	4.320 (5.08)	4.336 (5.12)	4.362 (5.18)	4.387 (5.22)	4.408 (5.35)	4.426 (5.31)
40%	4.345 (7.65)	4.374 (8.07)	4.394 (8.10)	4.409 (7.84)	4.440 (8.00)	4.453 (7.97)	4.475 (7.91)	4.484 (7.55)	4.520 (8.03)	4.544 (8.11)
Imputation using propensity−score method										
10%	3.993 (−1.06)	4.014 (−0.82)	4.039 (−0.63)	4.056 (−0.80)	4.078 (−0.80)	4.091 (−0.82)	4.117 (−0.74)	4.128 (−0.99)	4.158 (−0.61)	4.174 (−0.70)
20%	4.140 (2.59)	4.153 (2.60)	4.183 (2.91)	4.195 (2.62)	4.218 (2.60)	4.245 (2.93)	4.255 (2.59)	4.276 (2.55)	4.298 (2.73)	4.328 (2.97)
30%	4.263 (5.63)	4.293 (6.06)	4.311 (6.06)	4.339 (6.14)	4.348 (5.76)	4.368 (5.89)	4.393 (5.93)	4.422 (6.07)	4.446 (6.26)	4.471 (6.38)
40%	4.353 (7.87)	4.378 (8.15)	4.399 (8.23)	4.419 (8.10)	4.454 (8.35)	4.481 (8.64)	4.505 (8.62)	4.520 (8.40)	4.563 (9.06)	4.593 (9.28)

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv

Table 3: Average interval length (expansion %) − Non−shrinkage

Scenario II: mu0=0, mu1=1.5, mu2=2.0, ..., mu10=6.0

	Many−to−one adjustment									
Missing rate	**T1vs.T0**	**T2vs.T0**	**T3vs.T0**	**T4vs.T0**	**T5vs.T0**	**T6vs.T0**	**T7vs.T0**	**T8vs.T0**	**T9vs.T0**	**T10vs.T0**
0%	5.417	5.433	5.457	5.488	5.519	5.538	5.568	5.598	5.618	5.643
Imputation using linear regression										
10%	5.725 (5.69)	5.753 (5.88)	5.790 (6.11)	5.813 (5.91)	5.847 (5.94)	5.865 (5.90)	5.898 (5.92)	5.919 (5.72)	5.958 (6.06)	5.983 (6.02)
20%	6.242 (15.24)	6.273 (15.46)	6.316 (15.74)	6.334 (15.41)	6.368 (15.38)	6.412 (15.78)	6.421 (15.31)	6.460 (15.39)	6.490 (15.53)	6.530 (15.70)
30%	6.929 (27.90)	6.973 (28.34)	7.007 (28.42)	7.040 (28.28)	7.070 (28.10)	7.087 (27.98)	7.136 (28.15)	7.174 (28.14)	7.205 (28.26)	7.242 (28.32)
40%	7.961 (46.96)	8.020 (47.61)	8.014 (46.87)	8.057 (46.80)	8.110 (46.95)	8.137 (46.94)	8.188 (47.04)	8.256 (47.47)	8.250 (46.85)	8.365 (48.23)
Imputation using predictive mean matching method										
10%	5.484 (1.23)	5.514 (1.49)	5.546 (1.65)	5.569 (1.47)	5.600 (1.47)	5.617 (1.43)	5.654 (1.53)	5.671 (1.30)	5.709 (1.63)	5.732 (1.57)
20%	5.660 (4.48)	5.680 (4.55)	5.719 (4.81)	5.735 (4.50)	5.767 (4.49)	5.804 (4.80)	5.820 (4.51)	5.840 (4.32)	5.879 (4.64)	5.914 (4.79)
30%	5.830 (7.62)	5.868 (8.01)	5.893 (7.99)	5.929 (8.03)	5.942 (7.67)	5.964 (7.70)	6.000 (7.76)	6.035 (7.80)	6.064 (7.94)	6.089 (7.90)
40%	5.975 (10.30)	6.016 (10.73)	6.044 (10.76)	6.064 (10.48)	6.107 (10.65)	6.126 (10.61)	6.156 (10.55)	6.168 (10.18)	6.217 (10.67)	6.250 (10.76)
Imputation using propensity−score method										
10%	5.496 (1.45)	5.525 (1.70)	5.559 (1.88)	5.582 (1.71)	5.613 (1.71)	5.630 (1.67)	5.666 (1.76)	5.682 (1.50)	5.724 (1.89)	5.745 (1.80)
20%	5.694 (5.12)	5.712 (5.12)	5.753 (5.43)	5.771 (5.14)	5.801 (5.11)	5.840 (5.45)	5.852 (5.10)	5.881 (5.05)	5.912 (5.24)	5.953 (5.49)
30%	5.861 (8.19)	5.902 (8.62)	5.927 (8.62)	5.966 (8.70)	5.977 (8.30)	6.005 (8.43)	6.041 (8.49)	6.080 (8.61)	6.113 (8.81)	6.147 (8.93)
40%	5.984 (10.47)	6.018 (10.76)	6.048 (10.83)	6.075 (10.70)	6.123 (10.95)	6.160 (11.23)	6.193 (11.22)	6.214 (11.00)	6.274 (11.67)	6.315 (11.89)

Requested replicates per setting: 10000 | Imputations: 40 | Successful sample sizes: completion_summary.csv