Table 1: Simultaneous statistical inferences of mean differences in IBScovars dose response based on propensity-score imputation.

Methods	Dose Comparison	Point Estimate of $(\mu_i - \mu_0)$ 95% Confidence Interval
Proposed method with shrinkage	1 vs. 0	0.243 (-0.121, 0.608)
	2 vs. 0	0.352 (-0.013, 0.718)
	3 vs. 0	0.193 (-0.127, 0.514)
	4 vs. 0	0.298 (-0.087, 0.682)
Proposed method without shrinkage	1 vs. 0	0.243 (-0.122, 0.609)
	2 vs. 0	0.352 (-0.005, 0.710)
	3 vs. 0	0.193 (-0.121, 0.507)
	4 vs. 0	0.298 (-0.093, 0.689)
Dunnett's procedure with naive case deletion	1 vs. 0	0.292 (-0.067, 0.651)
	2 vs. 0	0.326 (-0.010, 0.662)
	3 vs. 0	0.208 (-0.137, 0.554)
	4 vs. 0	0.305 (-0.070, 0.679)




Figure 1: Forest plot showing the point estimates and 95% confidence intervals for each imputed dataset, the pooled results, and the naive case-deletion result for the IBScovars application. The primary missing-data setting is 30% MAR and the imputation method shown is propensity-score imputation .