Table 1: Simultaneous statistical inferences of mean differences in IBScovars dose response based on regression imputation.

Methods	Dose Comparison	Point Estimate of $(\mu_i - \mu_0)$ 95% Confidence Interval
Proposed method with shrinkage	1 vs. 0	0.260 (-0.102, 0.622)
	2 vs. 0	0.327 (-0.040, 0.694)
	3 vs. 0	0.184 (-0.179, 0.547)
	4 vs. 0	0.302 (-0.078, 0.681)
Proposed method without shrinkage	1 vs. 0	0.260 (-0.100, 0.621)
	2 vs. 0	0.327 (-0.030, 0.684)
	3 vs. 0	0.184 (-0.174, 0.543)
	4 vs. 0	0.302 (-0.085, 0.688)
Dunnett's procedure with naive case deletion	1 vs. 0	0.292 (-0.067, 0.651)
	2 vs. 0	0.326 (-0.010, 0.662)
	3 vs. 0	0.208 (-0.137, 0.554)
	4 vs. 0	0.305 (-0.070, 0.679)




Figure 1: Forest plot showing the point estimates and 95% confidence intervals for each imputed dataset, the pooled results, and the naive case-deletion result for the IBScovars application. The primary missing-data setting is 30% MAR and the imputation method shown is regression imputation .