

ПРОГРАММА КОРМЛЕНИЯ ДОЙНОГО СТАДА

Четыре этапа одной коровы

От телёнка до сухостоя. БВМКК-1-к и БВМКК-2-к для выращивания ремонтного молодняка, БВМКК-61-1С-к для высокопродуктивных коров — в лактацию и в сухостойный период.

Продуктивность коровы закладывается не в первую лактацию, а в первые месяцы жизни. **Нетели и коровы с хорошим рубцом используют питательные вещества корма более эффективно, что ведёт к получению от них больших надоев молока.** Полноценное и сбалансированное кормление молодняка является основой успешного выращивания ремонтных тёлочек.

Дальше корова живёт в двух чередующихся режимах. В лактацию рацион работает на продуктивность. В сухостой — на то, чтобы следующая лактация вообще состоялась: **основной задачей в кормлении сухостойных коров является недопущение критических сбоев в организме при отёле и переходе к периоду лактации.**

Каждому из четырёх этапов соответствует своя рецептура. Совпадает база — минеральный комплекс, адсорбенты, ферментно-пробиотическая часть; различаются белковая плотность, витамины и вся балансировка.

10–15 %

Прибавка надоя от аминокислотного комплекса **без ухудшения качества молока** — за счёт того, что весь поступающий с кормом сырой протеин участвует в синтезе белка.



Линейка БВМКК

ФАСОВКА 25 КГ · МАРКИРОВКА
ПО ЭТАПУ И ИСПОЛНЕНИЮ

ЦИКЛ КОРМЛЕНИЯ · ЧЕТЫРЕ ЭТАПА

цикл замкнут: после сухостоя корова возвращается в лактацию

ЭТАП 1 · СТАРТ	ЭТАП 2 · ДОРАЩИВАНИЕ	ЭТАП 3 · ЛАКТАЦИЯ	ЭТАП 4 · СУХОСТОЙ
БВМКК-1-к	БВМКК-2-к	БВМКК-61-1С-к	БВМКК-61-1С-к
телёнок 10–75 дней · ввод 40 %	76–115 дней · ввод 5 % или 20 %	около 305 дней · ввод 5 % или 20 %	около 60 дней · ввод 5 %

КАК ЭТО ПОКУПАЕТСЯ

Два исполнения под сырьевую базу хозяйства

Если белковое сырьё у вас своё. Концентрат вводится на 5 % и работает как минерально-витаминная, аминокислотная и ферментная часть рациона. Шрот подсолнечный или жмых рапсовый вы ставите сами — 15 % на дорашивании, 20 % в лактацию и 10 % в сухостой.

Если белок закрываем мы. Исполнение с вводом 20 % уже содержит белковую часть. В хозяйстве остаётся только зерновая группа — 80 % рациона, отдельная закупка шрота не требуется.

ЭТАП 1

БВМКК-1-к гранулированный

телята 10–75 дней · ввод 40 %

В первые месяцы жизни телёта интенсивно развиваются: происходит становление рубцового пищеварения и формирование иммунной системы. С усилением процессов брожения в рубце ускоряется **рост ворсинок слизистой оболочки**. По мере развития рубцового пищеварения они быстро растут и к взрослому состоянию достигают высоты 1 см, что во много раз увеличивает их поверхность, через которую всасываются питательные вещества. Такое развитие ворсинок рубца сохраняется на протяжении всей жизни животного.

Наиболее активно рост ворсинок происходит в момент перехода на растительные корма. Но если в этот момент у телёнка недоразвит рубец, животное будет отставать в развитии и не достигнет высокой продуктивности. Эффективнее скармливать зерно в смеси с **гранулами нашего БВМКК-1** — так называемые **мюсли**.

Баланс кальций / фосфор

Находится в таком правильном соотношении для этого периода, что обеспечивает хорошее развитие скелета и укрепление костяной ткани, развитие мышечной ткани.

Витаминно-минеральный комплекс

Отлично сбалансирован по необходимым витаминам и микроэлементам, что усиливает иммунную систему организма и сопротивляемость телёта заболеваниям.

Повышенное содержание витамина А

Эффективно как профилактическое средство от диареи, «кашля» у телёта.

Молочный белок

Увеличивает биологическую ценность протеина, так как недостаточно развит рубец, а также является залогом высокой продуктивности особенно для будущего дойного стада.

Льняной жмых

Повышает питательность протеина, является дополнительным источником витаминов группы В и вит. Е, а остатки льняного масла благоприятно влияют на пищеварение и перистальтику кишечника.

Сливочно-ванильный ароматизатор

Придаёт гранулам приятный сливочно-молочный аромат, что способствует их лучшему поеданию.

850–1100 г/сут

В корм телёнка включены все необходимые витамины и микроэлементы, минеральные компоненты в необходимых количествах и соотношениях, обеспечивающие высокое усвоение белка и **увеличение привесов**.

ЦИКЛ КОРМЛЕНИЯ

цикл замкнут: после сухостоя корова возвращается в лактацию

ЭТАП 1	ЭТАП 2	ЭТАП 3	ЭТАП 4
Телёнок	Доращивание	Лактация	Сухостой
БВМКК-1-к · 10–75 дней	БВМКК-2-к · 76–115 дней	БВМКК-61-1С-к · около 305 дней	БВМКК-61-1С-к · около 60 дней
ЭТОТ ПРОДУКТ			

НОРМЫ ВВОДА

БВМКК-1-к, гранулы	40 %
Овёс, цельное зерно	30 %
Кукуруза, цельное зерно	30 %
Форма скармливания	мюсли

СОСТАВ

Шрот соевый · Шрот подсолнечный · **Жмых льняной** · **Сухое обезжиренное молоко** · Монокальцийфосфат кормовой · Мел кормовой · Соль пищевая · Масло растительное · Дополнительный минеральный комплекс · Ароматизатор · Энрастим · **Витамин А** · Витаминно-минеральный концентрат ПКР-1 (0,1 %)

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА, %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ В 100 КГ	ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ, МДЖ/КГ
БВМКК-1-к	37,35	3,34	10,81	2,10	1,17	2,06	95	10,8

ЭТАП 2

БВМКК-2-к

телята 76–115 дней

В состав помимо всех необходимых для роста и развития телёнка витаминов, микроэлементов и минеральных веществ, а также оптимального соотношения кальция / фосфор, входят **живые ферментно-пробиотические культуры**, которые заселяют рубец полезной микрофлорой, при этом повышая её активность, нормализуют процессы пищеварения в рубце, стимулируют развитие преджелудков, улучшают перевариваемость и усвоение питательных веществ корма, предотвращают развитие дисбактериоза и дисперсии, обеспечивают профилактику дисфункции ЖКТ телят, позволяют более эффективно использовать клетчатку корма.

Живые ферментно-пробиотические культуры

Заселяют рубец полезной микрофлорой, нормализуют процессы пищеварения, стимулируют развитие преджелудков и позволяют более эффективно использовать клетчатку корма.

Дополнительный минеральный комплекс

Укрепляет иммунитет животных, что ведёт к увеличению сохранности поголовья, положительно влияет на поедаемость кормов, что соответственно увеличивает среднюю живую массу животных. Телята очень легко переходят на менее затратные (дешёвые) корма.

1200–1400 г/сут

Совокупный эффект ферментно-пробиотических культур и минерального комплекса приводит к **увеличению привесов** на этом уровне.

ЦИКЛ КОРМЛЕНИЯ

цикл замкнут: после сухостоя корова возвращается в лактацию

ЭТАП 1	ЭТАП 2	ЭТАП 3	ЭТАП 4
Телёнок	Доразивание	Лактация	Сухостой
БВМКК-1-к · 10–75 дней	БВМКК-2-к · 76–115 дней	БВМКК-61-1С-к · около 305 дней	БВМКК-61-1С-к · около 60 дней
	ЭТОТ ПРОДУКТ		

НОРМЫ ВВОДА

Исполнение А · ввод БВМКК	5 % · 75 г/гол
Шрот подсолнечный или жмых рапсовый	15 %
Зерновая группа	80 %
Исполнение Б · ввод БВМКК	20 % · 300 г/гол
Зерновая группа	80 %

СОСТАВ

Шрот подсолнечный · Дрожжевая кормовая смесь · Монокальцийфосфат кормовой · Мел кормовой · Соль пищевая · Масло растительное · **Адсорбентный комплекс · Ферментно-пробиотический комплекс** · Дополнительный минеральный комплекс · Ароматизатор · Витамин А · Витаминно-минеральный концентрат ПКР-2 (0,1 %)

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧАТКА, %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЭ, МДЖ/КГ
Исполнение А · ввод 5 %	12,57	1,45	0,35	13,84	5,70	14,28	31	3,8
Исполнение Б · ввод 20 %	32,51	2,31	9,85	3,87	2,12	4,01	75	8,8

ЭТАП 3

БВМКК-61-1С-к · лактация

высокопродуктивные коровы

Особенности состава БВМКК, которые **никак не отражены в показателях качества**. Аминокислотный комплекс, состоящий из нескольких незаменимых аминокислот, сбалансирован таким образом, что весь поступающий с кормом сырой протеин полностью участвует в синтезе белка, что предотвращает не только негативное воздействие на печень, но и приводит к **увеличению надоев молока на 10–15 % без ухудшения его качества**.

Дополнительный минеральный комплекс

Положительно влияет на поедаемость кормов, укрепление иммунитета животных, способствует *укреплению копытного рога*, увеличению надоев, *увеличению содержания белка в молоке*; а также приводит к *снижению концентрации соматических клеток* в молоке и *увеличению жирности молока*. Отдельные компоненты способствуют *снижению межотельного периода* и *увеличению продуктивного долголетия коров*.

Оптимальный баланс фосфор / кальций / магний

Способствует увеличению продуктивности и поддержанию отличного состояния лактирующих коров.

Живая дрожжевая культура и ферментно-пробиотический комплекс

Стимулируют развитие полезных рубцовых бактерий, что влияет на увеличение в рубце ферментов, расщепляющих клетчатку и крахмал до простых сахаров, повышая при этом *энергетическую ценность кормов*. Стабилизируется pH рубца, что *предотвращает развитие ацидоза и кетоза*. Корма быстрее перевариваются и лучше усваиваются, что улучшает конверсию корма, а соответственно *растёт молочная продуктивность животного*.

Комплекс адсорбентов микотоксинов

Состоит из комбинации высокоэффективных адсорбентов, минерального и органического происхождения, что очень эффективно против широкого спектра микотоксинов, способствует максимальному выведению их из организма, улучшению состояния ЖКТ и здоровья печени, повышению продуктивности животных и их сохранности.

ЦИКЛ КОРМЛЕНИЯ

цикл замкнут: после сухостоя корова возвращается в лактацию

ЭТАП 1	ЭТАП 2	ЭТАП 3	ЭТАП 4
Телёнок	Доразивание	Лактация	Сухостой
БВМКК-1-к · 10–75 дней	БВМКК-2-к · 76–115 дней	БВМКК-61-1С-к · около 305 дней	БВМКК-61-1С-к · около 60 дней
ЭТОТ ПРОДУКТ			

НОРМЫ ВВОДА

Исполнение А · ввод БВМКК	5 %
Суточная дача	300–400 г/гол
Шрот подсолнечный или жмых рапсовый	20 %
Зерновая группа	75 %
Исполнение Б · ввод БВМКК	20 %
Суточная дача	1200 г/гол
Зерновая группа	80 %

СОСТАВ

Шрот подсолнечный · **Дрожжевая кормовая смесь** · Монокальцийфосфат · Соль пищевая · Мел кормовой · Масло растительное · **Дополнительный минеральный комплекс** · **Комплекс адсорбентов микотоксинов** · **Ферментно-пробиотический комплекс** · Витаминно-минеральный комплекс П60-3

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧ., %	ЛИЗИН, %	МЕТ. + ЦИСТИН, %	ТРИПТ., %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЗ, МДЖ/КГ
Исполнение А · ввод 5 %	19,25	0,81	4,25	1,08	0,57	0,24	7,26	2,80	9,58	44	5,1
Исполнение Б · ввод 20 %	25,89	1,21	6,97	1,38	0,73	0,23	5,48	2,96	7,28	60	7,1

ЭТАП 4

БВМКК-61-1С-к · сухостой

сухостойный период

Основной задачей в кормлении сухостойных коров является недопущение критических сбоев в организме при отёле и переходе к периоду лактации. С этой задачей прекрасно справляется наш концентрат.

Дополнительный минеральный комплекс + повышенное содержание витамина Е

Положительно влияет на укрепление иммунитета животных, существенно уменьшается число послеродовых осложнений (кетозы, ацидозы, задержка плаценты), а также способствует рождению здоровых и крепких телят.

Оптимальный баланс фосфор / кальций / магний

Составлен таким образом, чтобы после отёла избежать резкой потери уровня кальция в крови (гипокальциемии) в связи с большими потерями этого элемента с молоком и низкой мобилизацией из костей, что в дальнейшем позволяет избежать таких проблем, как родильный парез, смещение (дисплазия) сычуга, задержка последа.

Ферментно-пробиотический комплекс

Стабилизирует pH рубца, предотвращая его закисление, что служит профилактикой ацидоза и кетоза; подготавливает микрофлору ЖКТ и поддерживает ворсинки рубца в здоровом состоянии для дальнейшего перехода на высокое содержание концентрированных кормов в период раздоя.

Комплекс адсорбентов микотоксинов

Комбинация высокоэффективных адсорбентов минерального и органического происхождения, эффективная против широкого спектра микотоксинов; способствует улучшению состояния ЖКТ и здоровья печени, а также положительно влияет на развитие плода в период стельности коров.

ЦИКЛ КОРМЛЕНИЯ

цикл замкнут: после сухостоя корова возвращается в лактацию

ЭТАП 1	ЭТАП 2	ЭТАП 3	ЭТАП 4
Телёнок	Дорацивание	Лактация	Сухостой
БВМКК-1-к · 10–75 дней	БВМКК-2-к · 76–115 дней	БВМКК-61-1С-к · около 305 дней	БВМКК-61-1С-к · около 60 дней
			ЭТОТ ПРОДУКТ

НОРМЫ ВВОДА

Ввод БВМКК	5 %
Суточная дача	150 г/гол
Шрот подсолнечный или жмых рапсовый	10 %
Зерновая группа	85 %

СОСТАВ

Шрот подсолнечный · Монокальцийфосфат · Соль пищевая · Мел кормовой · Масло растительное · **Дополнительный минеральный комплекс · Витамин Е · Комплекс адсорбентов микотоксинов · Ферментно-пробиотический комплекс** · Витаминно-минеральный комплекс П60-3

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧ., %	ЛИЗИН, %	МЕТ. + ЦИСТИН, %	ТРИПТ., %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЗ, МДЖ/КГ
Сухостой · ввод 5 %	22,00	1,98	11,0	0,74	0,89	0,26	5,63	2,69	9,57	—	6,0

ЗАО «АГРОСТАНДАРТ»

220114, г. Минск, ул. Филимонова, 49, офис 6 · УНП 190917649
р/с BY10BELB30120068140010226000 в РКЦ «ЛУЧ» ОАО «Банк БелВЭБ»,
г. Минск, пр. Независимости, 95, BIC BELBYY2X

+375 44 730-52-42

тел/факс (017) 352-36-80, 352-36-70
minsk@agrostandart.by · www.agrostandart.by