

ПРОГРАММА ОТКОРМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Три фазы рубца

Белково-витаминно-минеральные концентраты БВМКК для молодняка КРС от 10 до 400 дней — от становления рубцового пищеварения до финального откорма.

В первые месяцы жизни телята интенсивно развиваются. В этот период приходит становление рубцового пищеварения и формирования иммунной системы. Основным и важным моментом при этом является развитие преджелудков, а точнее микрофлоры, которая играет очень важную роль в пищеварении в процессах брожения.

С усилением этих процессов в рубце ускоряется **рост ворсинок слизистой оболочки**. По мере развития рубцового пищеварения они быстро растут и к взрослому состоянию достигают высоты 1 см, что во много раз увеличивает их поверхность, через которую всасываются питательные вещества. **Такое развитие ворсинок рубца сохраняется на протяжении всей жизни животного.**

Наиболее активно рост ворсинок происходит в момент перехода на растительные корма. Но если в этот момент у телёнка недоразвит рубец, животное будет отставать в развитии и не достигнет в дальнейшем высокой продуктивности.

1 см

Высота ворсинки рубца у взрослого животного. **Эту точку роста нельзя пройти повторно** — она определяет продуктивность на всю жизнь.



Линейка БВМКК

ФАСОВКА 25 КГ · МАРКИРОВКА
ПО ФАЗЕ И ИСПОЛНЕНИЮ

ЦИКЛ КОРМЛЕНИЯ · ТРИ ФАЗЫ

схема; фазы показаны равными по ширине

ФАЗА 1 · СТАРТ

БВМКК-1-к

10–75 дней · гранулы для мюслей, ввод 40 %

ФАЗА 2 · РАЗВИТИЕ

БВМКК-2-к

76–115 дней · ввод 5 % или 20 %

ФАЗА 3 · ОТКОРМ

БВМКК-3-к

116–400 дней · ввод 5 % или 10 %

КАК ЭТО ПОКУПАЕТСЯ

Два исполнения под сырьевую базу хозяйства

Если белковое сырьё у вас своё. Концентрат вводится на 5 % и работает как минерально-витаминная, ферментная и пробиотическая часть рациона. Шрот хлопковый вы ставите сами — 15 % на фазе 2 и 0–5 % на откорме.

Если белок закрываем мы. Исполнение с вводом 20 % на фазе 2 и 10 % на откорме уже содержит белковую часть. В хозяйстве остаётся только зерновая группа — 80 % и 90 %.

ФАЗА 1

БВМКК-1-к гранулированный

телята 10–75 дней · ввод 40 %

В настоящее время наряду с комбикормами-концентратами практикуют скормливание телятам в первый месяц жизни цельного зерна. Это усиливает секрецию пищеварительных желёз, особенно слюнных, способствует более раннему началу жвачки, развитию преджелудков. Однако зёрна злаковых бедны протеином, биологически активными веществами, поэтому эффективнее скормливать их в составе смеси с **гранулами нашего БВМКК-1**, получая при этом так называемые **мюсли**. Зерно и гранулы концентрата обладают практически одинаковыми размерами, что имеет большое значение при приготовлении мюслей, раздаче и непосредственном скормливании их телятам.

Баланс кальция / фосфор

Находится в таком правильном соотношении для этого периода, что обеспечивает хорошее развитие скелета и укрепление костяной ткани, развитие мышечной ткани.

Витаминно-минеральный комплекс

Отлично сбалансированный по необходимым витаминам и микроэлементам, что усиливает иммунную систему организма и сопротивляемость телят заболеваниям.

Повышенное содержание витамина А

Эффективно как профилактическое средство от диареи, «кашля» у телят.

Молочный белок

Увеличивает биологическую ценность протеина, так как недостаточно развит рубец, а также является залогом высокой продуктивности животного в будущем, особенно для дойного стада.

Льняной жмых

Также повышает питательность протеина, является дополнительным источником витаминов группы В и вит. Е, а наличие остатков льняного масла в жмыхе, обладающего обволакивающими способностями, благоприятно влияет на процессы пищеварения и перистальтики всего кишечника.

Сливочно-ванильный ароматизатор

Придаёт гранулам приятный сливочно-молочный аромат, что способствует их лучшему поеданию.

850–1100 г/сут

В корм телёнка включены все необходимые витамины и микроэлементы, минеральные компоненты в необходимых количествах и соотношениях, которые обеспечивают высокое усвоение белка, а соответственно и **увеличение привесов**.

ЦИКЛ КОРМЛЕНИЯ

схема; фазы показаны равными по ширине

ФАЗА 1 БВМКК-1-к 10–75 дней · ввод 40 % ЭТОТ ПРОДУКТ	ФАЗА 2 БВМКК-2-к 76–115 дней · ввод 5 % или 20 %	ФАЗА 3 БВМКК-3-к 116–400 дней · ввод 5 % или 10 %
---	--	---

НОРМЫ ВВОДА	СОСТАВ
БВМКК-1-к, гранулы	Шрот соевый · Шрот подсолнечный · Жмых льняной · Сухое обезжиренное молоко · Монокальцийфосфат кормовой · Мел кормовой · Соль пищевая · Масло растительное · Дополнительный минеральный комплекс · Ароматизатор · Энрастим · Витамин А · Витаминно-минеральный концентрат ПКР-1 (0,1 %)
Овёс, цельное зерно	
Кукуруза, цельное зерно	
Форма скормливания	мюсли

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА							на 1 кг концентрата	
	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧАТКА, %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЭ, МДЖ/КГ
БВМКК-1-к	37,35	3,34	10,81	2,10	1,17	2,06	95	10,8

ФАЗА 2

БВМКК-2-к

телята 76–115 дней

В состав помимо всех необходимых для роста и развития телёнка витаминов, микроэлементов и минеральных веществ, а также оптимального соотношения кальция / фосфор, входят **живые ферментно-пробиотические культуры**, которые заселяют рубец полезной микрофлорой, при этом повышая её активность, нормализуют процессы пищеварения в рубце, стимулируют развитие преджелудков, улучшают перевариваемость и усвоение питательных веществ корма, предотвращают развитие дисбактериоза и дисперсии, обеспечивают профилактику дисфункции ЖКТ телят, позволяют более эффективно использовать клетчатку корма.

Живые ферментно-пробиотические культуры

Заселяют рубец полезной микрофлорой, нормализуют процессы пищеварения, стимулируют развитие преджелудков и позволяют более эффективно использовать клетчатку корма.

Дополнительный минеральный комплекс

Укрепляет иммунитет животных, что ведёт к увеличению сохранности поголовья, положительно влияет на поедаемость кормов, что соответственно увеличивает среднюю живую массу животных. Телята очень легко переходят на менее затратные (дешёвые) корма.

1200–1400 г/сут

Совокупный эффект ферментно-пробиотических культур и минерального комплекса приводит к **увеличению привесов** на этом уровне.

ЦИКЛ КОРМЛЕНИЯ

схема; фазы показаны равными по ширине

ФАЗА 1

БВМКК-1-к

10–75 дней · ввод 40 %

ФАЗА 2

БВМКК-2-к

76–115 дней · ввод 5 % или 20 %

ЭТОТ ПРОДУКТ

ФАЗА 3

БВМКК-3-к

116–400 дней · ввод 5 % или 10 %

НОРМЫ ВВОДА

Исполнение А · ввод БВМКК	5 %
Суточная дача	75 г/гол
Шрот хлопковый (сырьё хозяйства)	15 %
Зерновая группа	80 %
Исполнение Б · ввод БВМКК	20 %
Суточная дача	300 г/гол
Зерновая группа	80 %

СОСТАВ

Шрот подсолнечный · Дрожжевая кормовая смесь · Монокальцийфосфат кормовой · Мел кормовой · Соль пищевая · Масло растительное · **Адсорбентный комплекс · Ферментно-пробиотический комплекс** · Дополнительный минеральный комплекс · Ароматизатор · Витамин А · Витаминно-минеральный концентрат ПКР-2 (0,1 %)

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧАТКА, %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЭ, МДЖ/КГ
Исполнение А ввод 5 %	12,57	1,45	0,35	13,84	5,70	14,28	31	3,8
Исполнение Б ввод 20 %	32,51	2,31	9,85	3,87	2,12	4,01	75	8,8

ФАЗА 3
БВМКК-3-к

молодняк 116–400 дней

Финальная и самая длинная фаза программы: рубец сформирован, и задача концентрата — поднять отдачу с каждого килограмма рациона. Особенности состава:

Живая дрожжевая культура и ферментно-пробиотический комплекс

Стимулируют развитие полезных рубцовых бактерий, увеличивают в рубце количество ферментов, расщепляющих клетчатку и крахмал до простых сахаров, и стабилизируют pH рубца.

Дополнительный минеральный комплекс

Положительно влияет на поедаемость кормов, укрепление иммунитета животных, увеличение средней живой массы животных, а также улучшение кондиций мяса на выходе.

ЦИКЛ КОРМЛЕНИЯ

схема; фазы показаны равными по ширине

ФАЗА 1	ФАЗА 2	ФАЗА 3
БВМКК-1-к	БВМКК-2-к	БВМКК-3-к
10–75 дней · ввод 40 %	76–115 дней · ввод 5 % или 20 %	116–400 дней · ввод 5 % или 10 %
		ЭТОТ ПРОДУКТ

НОРМЫ ВВОДА

Исполнение А · ввод БВМКК	5 % · 200 г/гол
Шрот хлопковый (сырьё хозяйства)	0–5 %
Зерновая группа	90–95 %
Исполнение Б · ввод БВМКК	10 % · 400 г/гол
Зерновая группа	90 %

СОСТАВ

Шрот подсолнечный · **Дрожжевая кормовая смесь** · Монокальцийфосфат кормовой · Мел кормовой · Соль пищевая · Масло растительное · **Адсорбентный комплекс** · **Ферментно-пробиотический комплекс** · Дополнительный минеральный комплекс · Ароматизатор · Витаминно-минеральный концентрат ПКР-2 (0,1 %)

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧАТКА, %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЭ, МДЖ/КГ
Исполнение А ввод 5 %	17,04	1,64	0,52	11,73	1,28	19,05	49	6,0
Исполнение Б ввод 10 %	28,08	2,13	8,25	6,07	1,05	9,65	65	7,6

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

производственный опыт

Опыт проводился на одном из крупнейших комплексов по откорму КРС в нашей республике. Бычкам на откорме к основному рациону скармливали в сутки **4 кг комбикорма из 95 % зерна и 5 % нашего БВМКК-3**. При этом улучшилась кондиция мяса.

460 → 570 кг
СРЕДНИЙ СДАВАЕМЫЙ
ВЕС ПО ГОДУ

–1 месяц
СОКРАЩЕНИЕ ПЕРИОДА
ОТКОРМА

≈ 2 кг/сут
ПРИВЕСЫ НА
ПОСЛЕДНЕМ ПЕРИОДЕ

ЗАО «АГРОСТАНДАРТ»

220114, г. Минск, ул. Филимонова, 49, офис 6 · УНП 190917649
р/с BY10BELB30120068140010226000 в РКЦ «ЛУЧ» ОАО «Банк БелВЭБ»,
г. Минск, пр. Независимости, 95, BIC BELBYY2X

+375 44 730-52-42

тел/факс (017) 352-36-80, 352-36-70
minsk@agrostandart.by · www.agrostandart.by