



Белково-витаминно-минеральные концентраты
для индюков и индюшек: стартер, гроуэр, финишер

Программа выращивания индейки





Недельный привес индюков
на финишном периоде

+200–300 г

Сверх польских табличных норм — по
результатам эксперимента в фермерском
хозяйстве «Островецкое» Гродненской области.

Три этапа выращивания

Для успешного выращивания индюков необходимо придерживаться определённых и особенных требований в кормлении. **Учитывая эти требования, нами были разработаны рецептуры корма на всех этапах (стартер, гроуэр, финишер), которые отработаны и проверены на практике.** При этом они показали отличный экономический эффект.

При составлении рецептур была принята во внимание потребность индейки в полноценном протеине. Чтобы обеспечить птицу им, а также незаменимыми аминокислотами, в состав рецептов включены компоненты с содержанием биологического белка (животного происхождения), что очень важно, **особенно в начальный период жизни индюшат**, для обеспечения их нормального роста, жизнеспособности и высокой сохранности.



Линейка БВМКК

ФАСОВКА 25 КГ · МАРКИРОВКА
ПО ЭТАПУ ВЫРАЩИВАНИЯ

СТАРТЕР

БВМКК-11п

1–5 недель · ввод 15 %

ГРОУЭР

БВМКК-12п

6–9 / 9–13 недель · ввод 8 %

ФИНИШЕР

БВМКК-13п

от 14 недель до убоя · ввод 5 %

Протеин и энергия

Высокое содержание протеина

Для обеспечения нормального роста, жизнеспособности и высокой сохранности разработаны корма с высоким содержанием протеина и обменной энергии.

Нужное соотношение на всех этапах

Содержание сырого протеина и обменной энергии выдерживается в нужном соотношении на всех этапах выращивания и изменяется в зависимости от возраста птицы.

Особенности состава рецептур



При составлении рецептур была принята во внимание потребность индейки в полноценном протеине. Ниже — то, за счёт чего концентраты линейки работают на привес, сохранность и стоимость рациона.

Незаменимые аминокислоты

Лизин, метионин, треонин, триптофан полностью покрывают потребность птицы в аминокислотах и сбалансированы таким образом, чтобы полностью участвовать в синтезе белка.

Дополнительный минеральный комплекс

Включает в себя дополнительные минеральные компоненты, что ведёт к укреплению иммунитета птицы, к большей её сохранности; улучшает процессы пищеварения, что влечёт хорошую поедаемость корма, а соответственно увеличиваются привесы птицы; улучшается качество мяса (экономическая эффективность).

Ферментно-пробиотический комплекс

Подавляет развитие патогенных микроорганизмов и способствует формированию полезной микрофлоры в пищеварительном тракте. Всё это приводит к увеличению сохранности поголовья и увеличению привесов птицы, улучшению качества мяса.

Баланс кальция / фосфор / магний

Выдерживается на всех этапах роста, изменяется в зависимости от возраста птицы и сохраняется в нужном соотношении. За счёт баланса трёх минералов происходит полное усвоение поступающего кальция и фосфора.

Ферментный и ферментно-пробиотический комплексы

Способствуют эффективному использованию клетчатки зерновых и шротов, а именно: расщепляют её до простейших углеводов, что приводит к полному их усваиванию, а это позволяет существенно снизить стоимость рационов за счёт большего включения в рацион шротов; облегчают усваивание сырого протеина и незаменимых аминокислот, содержащихся в корме с сырьём.

Белок животного происхождения

Компоненты с содержанием биологического белка обеспечивают птицу полноценным протеином и незаменимыми аминокислотами — особенно важно в начальный период жизни индюшат.

Ферментный и ферментно-пробиотический комплексы позволяют существенно снизить стоимость рационов за счёт большего включения в рацион шротов. Рецепт корма рассчитывается исходя из сырьевой базы хозяйства.

БВМКК-11п

стартер · 1–5 недель · ввод 15 %

В состав рецепта включены компоненты с содержанием биологического белка (животного происхождения), что очень важно в **начальный период жизни индюшат** для обеспечения их нормального роста, жизнеспособности и высокой сохранности.

Нормы ввода

Ввод БВМКК-11п	15 %
Возраст	1–5 недель
Рецепт комбикорма	под сырьевую базу

Состав

Шрот соевый · мука рыбная · лизин монохлоргидрат · метионин кормовой · монокальцийфосфат кормовой · соль пищевая · мел молотый · сода пищевая · антибиотик кормовой · кокцидиостатик · витамин В4 · витамин Е · ферментный комплекс (энзим, фитаза) · ферментно-пробиотический комплекс · дополнительный минеральный комплекс · витаминно-минеральный комплекс П5-1 КОББ / П5-1

Показатели качества · на 1 кг концентрата

СЫРОЙ ПРОТЕИН	СЫРОЙ ЖИР	СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	ЛИЗИН	МЕТИОНИН + ЦИСТИН	ТРЕОНИН
41,38 %	3,41 %	2,05 %	2,94 %	2,05 %	1,71 %
ТРИПТОФАН	КАЛЬЦИЙ	ФОСФОР	НАТРИЙ	ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	
0,48 %	10,49 %	3,47 %	1,15 %	230 ккал/100 г	

Витамины и микроэлементы · в 1 т концентрата

A	D ₃	E	K ₃	B ₁	B ₂	B ₃
80,4 млн МЕ	26,8 млн МЕ	435 г	26,8 г	26,8 г	60,3 г	100,5 г
B ₄	B ₅	B ₆	B ₁₂	B _c	C	H
4020 г	402 г	26,8 г	0,134 г	10,05 г	—	1,01 г
Fe	Cu	Zn	Mn	Co	I	Se
268 г	134 г	670 г	804 г	—	6,7 г	2,01 г

41,38 %

сырого протеина в концентрате — для нормального роста, жизнеспособности и **высокой сохранности** в начальный период жизни индюшат.

СТАРТЕР

БВМКК-11п

1–5 недель · ввод 15 %

ЭТОТ ПРОДУКТ

ГРОУЭР

БВМКК-12п

6–9 / 9–13 недель · ввод 8 %

ФИНИШЕР

БВМКК-13п

от 14 недель до убоя · ввод 5 %

БВМКК-12п

гроуэр · 6–9 / 9–13 недель · ввод 8 %

Содержание сырого протеина и обменной энергии выдерживается в нужном соотношении и изменяется в зависимости от возраста птицы. **Ферментный и ферментно-пробиотический комплексы** позволяют существенно снизить стоимость рациона за счёт большего включения шротов.

Нормы ввода

Ввод БВМКК-12п	8 %
Возраст	6–9 / 9–13 недель
Рецепт комбикорма	под сырьевую базу

Состав

Шрот подсолнечный · мука рыбная · лизин монохлоргидрат · метионин кормовой · треонин кормовой · монокальцийфосфат кормовой · соль пищевая · мел молотый · сода пищевая · антибиотик кормовой · кокцидиостатик (±) · витамин В4 · витамин Е · **ферментный комплекс (энзим, фитаза)** · **ферментно-пробиотический комплекс** · дополнительный минеральный комплекс · витаминно-минеральный комплекс П5-1 КОББ / П5-1

Показатели качества · на 1 кг концентрата

СЫРОЙ ПРОТЕИН	СЫРОЙ ЖИР	СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА	ЛИЗИН	МЕТИОНИН + ЦИСТИН	ТРЕОНИН
23,82 %	0,85 %	4,15 %	4,45 %	5,84 %	3,06 %
ТРИПТОФАН	КАЛЬЦИЙ	ФОСФОР	НАТРИЙ	ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ	
0,17 %	16,04 %	5,48 %	1,90 %	187 ккал/100 г	

Витамины и микроэлементы · в 1 т концентрата

A	D ₃	E	K ₃	B ₁	B ₂	B ₃
175 млн МЕ	62,5 млн МЕ	1125 г	50 г	50 г	112,5 г	187,5 г
B ₄	B ₅	B ₆	B ₁₂	B _c	C	H
7500 г	750 г	50 г	0,25 г	25 г	—	2,5 г
Fe	Cu	Zn	Mn	Co	I	Se
500 г	187,5 г	1250 г	1500 г	—	12,5 г	3,75 г

810 → 1440 г

недельный привес индюков с 6-й по 13-ю неделю в эксперименте ФХ «Островецкое» — **весь** период гроуэра на наших кормах.

СТАРТЕР
БВМКК-11п

1–5 недель · ввод 15 %

ГРОУЭР
БВМКК-12п

6–9 / 9–13 недель · ввод 8 %

ЭТОТ ПРОДУКТ
ФИНИШЕР
БВМКК-13п

от 14 недель до убоя · ввод 5 %

БВМКК-13п

финишер · от 14 недель до убоя · ввод 5 %

Финишный период — тот, на котором корма линейки показали наибольшее превышение польских табличных норм: **на 200–300 г недельного привеса**, что привело к большему выходу мяса птицы при сокращении кормодней.

Нормы ввода

Ввод БВМКК-13п	5 %
Возраст	от 14 недель до убоя
Рецепт комбикорма	под сырьевую базу

Состав

Шрот подсолнечный · мука мясокостная · лизин монохлоридрат · метионин кормовой · треонин кормовой · монокальцийфосфат кормовой · соль пищевая · мел молотый · сода пищевая · витамин В4 · витамин Е · ферментный комплекс (энзим, фитаза) · ферментно-пробиотический комплекс · дополнительный минеральный комплекс · витаминно-минеральный комплекс П5-1 (±)

Показатели качества · на 1 кг концентрата

СЫРОЙ ПРОТЕИН 26,08 %	СЫРОЙ ЖИР 0,76 %	СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА 1,17 %	ЛИЗИН 5,95 %	МЕТИОНИН + ЦИСТИН 3,01 %	ТРЕОНИН 1,11 %
ТРИПТОФАН 0,02 %	КАЛЬЦИЙ 17,1 %	ФОСФОР 5,87 %	НАТРИЙ 1,5 %	ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ 225 ккал/100 г	

Витамины и микроэлементы · в 1 т концентрата

A 200 млн МЕ	D ₃ 60 млн МЕ	E 650 г	K ₃ 60 г	B ₁ 20 г	B ₂ 100 г	B ₃ 200 г
B ₄ 12 000 г	B ₅ 400 г	B ₆ 40 г	B ₁₂ 0,4 г	B _c 10 г	C 1000 г	H 2 г
Fe 200 г	Cu 50 г	Zn 1000 г	Mn 2000 г	Co 10 г	I 14 г	Se 10 г

до 1600 г

недельный привес индюков на финише (15-я неделя) — **на 200–300 г выше польских табличных норм.**

СТАРТЕР

БВМКК-11п

1–5 недель · ввод 15 %

ГРОУЭР

БВМКК-12п

6–9 / 9–13 недель · ввод 8 %

ФИНИШЕР

БВМКК-13п


от 14 недель до убоя · ввод 5 %

ЭТОТ ПРОДУКТ

Личные достижения

Эксперимент проводился в фермерском хозяйстве «Островецкое» Гродненской области. В сравнении с предоставленными польскими табличными нормами по недельным привесам индюков, **результаты на наших кормах превосходили эти нормы, особенно на финишном периоде, на 200–300 г.** Что привело к большему выходу мяса птицы при сокращении кормодней.

ВОЗРАСТ	ИНДЮКИ, Г	ИНДЮШКИ, Г
ГРОУЭР		
6-я неделя	810	640
7-я неделя	950	750
8-я неделя	1070	820
9-я неделя	1200	880
10-я неделя	1310	910
11-я неделя	1330	940
12-я неделя	1410	960
13-я неделя	1440	980
ФИНИШЕР		
14-я неделя	1570	970 · убой
15-я неделя	1600	900 · убой
16-я неделя	1590	—
17-я неделя	1530	—
18-я неделя	1550	—
19-я неделя	1540	—
20-я неделя	1510	—



+200–300 г

недельного привеса индюков на финишном периоде сверх польских табличных норм — **большой выход мяса при сокращении кормодней.**



Считаем рацион под ваше хозяйство

ЗАО «Агροстандарт»

УНП 190917649 · ОКПО 377556385000
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 49, офис № 6
р/с BY90BAPB301266371001000000000
в ОАО «Белагропромбанк»,
220036, г. Минск, пр. Жукова, 3, БИК BAPBY2X

Отдел продаж

+375 44 730-52-42

тел/факс (017) 352-36-80, 352-36-70
(029) 653-61-84

minsk@agrostandart.by
www.agrostandart.by

