

Tutorium 3

Aufgabe 1: Trace Equivalence

Gegeben seien die folgenden zwei Lösungen zum Getränkeautomaten aus dem letzten Tutorium.



1.a) Gib $Traces(VM)$ und $Traces(VM')$ an.

Lösung

$$A = \{ coin \cdot \overline{coffee}, coin \cdot coin \cdot \overline{tea} \}$$

$$Traces(VM) = A^* \cdot \{ \lambda, coin, coin \cdot coin \}$$

$$Traces(VM') = A^* \cdot \{ \lambda, coin, coin \cdot coin \}$$

Alternativ auch:

$$Traces(VM) = L \left(\left(coin \cdot \overline{coffee} + coin \cdot coin \cdot \overline{tea} \right)^* \cdot (\epsilon + coin + coin \cdot coin) \right)$$

$$Traces(VM') = L \left(\left(coin \cdot \overline{coffee} + coin \cdot coin \cdot \overline{tea} \right)^* \cdot (\epsilon + coin + coin \cdot coin) \right)$$

\Lösung

1.b) Wie stehen diese Mengen in Beziehung und was können wir daraus ableiten?

Lösung


Es gilt $Traces(VM) = Traces(VM')$. Wir können daraus lediglich folgern, dass die beiden Prozesse VM und VM' für sich alleine dasselbe Verhalten haben. Nehmen wir z. B. den Informatiker aus dem letzten Tutorium in etwas abgewandelter Form: $CS' \stackrel{\text{def}}{=} \overline{coin}.coffee.CS'$ und schalten ihn parallel zu den Getränkeautomaten, dann sehen wir, dass die beiden Systeme nicht dasselbe Verhalten haben.

Vergleiche $(VM' \mid CS') \setminus \{ coffee, coin \} \xrightarrow{\tau} (VM'_2 \mid CS'_1) \setminus \{ coffee, coin \} \not\rightarrow$ und

$(VM \mid CS') \setminus \{ coffee, coin \} \xrightarrow{\tau} (VM_1 \mid CS'_1) \setminus \{ coffee, coin \} \xrightarrow{\tau} (VM \mid CS') \setminus \{ coffee, coin \}$.

\Lösung

Aufgabe 2: Starke Bisimulation I



Gib für die folgenden Paare an, ob sie **stark bisimilar** sind, sich **gegenseitig stark simulieren** und/oder einer den anderen **stark simuliert**. Gib die jeweilige Relation an.

Beweise exemplarisch für Aufgabe 2.b) die angegebene Eigenschaft.

2.a) p_1 und q_1

$q_1 \lesssim p_1$ und $p_1 \lesssim q_1$.

q_1 simuliert p_1 stark (\mathcal{R}) und p_1 simuliert q_1 stark (\mathcal{S}). Somit simulieren sich p_1 und q_1 gegenseitig stark, also $p_1 \simeq q_1$. Sie sind aber nicht stark bisimilar.

$\mathcal{R} = \{ (p_1, q_1), (p_2, q_2), (p_3, q_2), (p_4, q_3), (p_5, q_4) \}$

$\mathcal{S} = \{ (q_1, p_1), (q_2, p_2), (q_3, p_4), (q_4, p_5) \}$

Sie sind nicht stark bisimilar, da $(p_3, q_2) \in \mathcal{R}$, aber $(q_2, p_3) \notin \mathcal{S}$.

$(q_2, p_3) \notin \mathcal{S}$, da $q_2 \rightarrow$, aber $p_3 \not\rightarrow$. $(p_3, q_2) \in \mathcal{R}$ muss aber gelten, da $(p_1, q_1) \in \mathcal{R}$ und $q_1 \xrightarrow{a} q_2$ die einzige Möglichkeit ist, um $p_1 \xrightarrow{a} p_3$ stark zu simulieren.

2.b) q_1 und r_1

q_1 und r_1 sind stark bisimilar, wie wir an \mathcal{R} zeigen werden.

Sei $\mathcal{R} = \{ (q_1, r_1), (q_2, r_2), (q_2, r_3), (q_3, r_4), (q_4, r_5), (q_3, r_7), (q_4, r_6) \}$. Nun bleibt zu beweisen, dass \mathcal{R} eine starke Bisimulation ist:

- Betrachte $(q_1, r_1) \in \mathcal{R}$.

Transitionen in q_1 :

- Für $q_1 \xrightarrow{a} q_2$ wähle $r_1 \xrightarrow{a} r_2$ und $(q_2, r_2) \in \mathcal{R}$.

Transitionen in r_1 :

- Für $r_1 \xrightarrow{a} r_2$ wähle $q_1 \xrightarrow{a} q_2$ und $(q_2, r_2) \in \mathcal{R}$.
- Für $r_1 \xrightarrow{a} r_3$ wähle $q_1 \xrightarrow{a} q_2$ und $(q_2, r_3) \in \mathcal{R}$.

- Betrachte $(q_2, r_2) \in \mathcal{R}$.

Transitionen in q_2 :

- Für $q_2 \xrightarrow{a} q_3$ wähle $r_2 \xrightarrow{a} r_4$ und $(q_3, r_4) \in \mathcal{R}$.
- Für $q_2 \xrightarrow{b} q_4$ wähle $r_2 \xrightarrow{b} r_5$ und $(q_4, r_5) \in \mathcal{R}$.

Transitionen in r_2 :

- Für $r_2 \xrightarrow{a} r_4$ wähle $q_2 \xrightarrow{a} q_3$ und $(q_3, r_4) \in \mathcal{R}$.
- Für $r_2 \xrightarrow{b} r_5$ wähle $q_2 \xrightarrow{b} q_4$ und $(q_4, r_5) \in \mathcal{R}$.

- Betrachte $(q_2, r_3) \in \mathcal{R}$.

Transitionen in q_2 :

- Für $q_2 \xrightarrow{a} q_3$ wähle $r_3 \xrightarrow{a} r_7$ und $(q_3, r_7) \in \mathcal{R}$.
- Für $q_2 \xrightarrow{b} q_4$ wähle $r_3 \xrightarrow{b} r_6$ und $(q_4, r_6) \in \mathcal{R}$.

Transitionen in r_3 :

- Für $r_3 \xrightarrow{a} r_7$ wähle $q_2 \xrightarrow{a} q_3$ und $(q_3, r_7) \in \mathcal{R}$.
- Für $r_3 \xrightarrow{b} r_6$ wähle $q_2 \xrightarrow{b} q_4$ und $(q_4, r_6) \in \mathcal{R}$.

- Betrachte $(q_3, r_4) \in \mathcal{R}$.

Keine Transitionen in q_3 oder r_4 möglich.

- Betrachte $(q_4, r_5) \in \mathcal{R}$.

Keine Transitionen in q_4 oder r_5 möglich.


- Betrachte $(q_3, r_7) \in \mathcal{R}$.

Keine Transitionen in q_3 oder r_7 möglich.

- Betrachte $(q_4, r_6) \in \mathcal{R}$.

Keine Transitionen in q_4 oder r_6 möglich.

Da \mathcal{R} eine starke Bisimulation ist und $(q_1, r_1) \in \mathcal{R}$, können wir folgern, dass $q_1 \sim r_1$.



\Lösung

2.c) p_1 und r_1

----- Lösung -----

Da wir bereits wissen, dass $q_1 \sim r_1$ gilt, wissen wir auch, dass r_1 von p_1 stark simuliert wird ($r_1 \lesssim p_1$) und p_1 von r_1 stark simuliert wird ($r_1 \lesssim p_1$). Somit simulieren sich p_1 und r_1 gegenseitig stark. Sie sind aber nicht stark bisimilar.

\Lösung

2.d) p_1 und s

----- Lösung -----

s simuliert p_1 stark.

$\mathcal{R} = \{ (p_1, s), (p_2, s), (p_3, s), (p_4, s), (p_5, s) \}$

\Lösung

2.e) q_1 und s

----- Lösung -----

s simuliert q_1 .

$\mathcal{R} = \{ (q_1, s), (q_2, s), (q_3, s), (q_4, s) \}$

\Lösung

2.f) r_1 und s

----- Lösung -----

Da $r_1 \sim q_1$ und q_1 von s stark simuliert wird ($q_1 \lesssim s$), folgern wir, dass s auch r_1 stark simuliert ($s \lesssim r_1$).

\Lösung

Aufgabe 3: Starke Bisimulation II

Untersuche die in Aufgabe 1 gegebenen Prozesse darauf, ob sie **stark bisimilar** sind, sich **gegenseitig stark simulieren** und/oder einer den anderen **stark simuliert**. Beweise deine Aussage.

----- Lösung -----

VM simuliert VM' stark ($VM' \lesssim VM$).

$\mathcal{R} = \{ (VM', VM), (VM'_1, VM_1), (VM'_2, VM_1), (VM'_3, VM_2) \}$

- Betrachte $(VM', VM) \in \mathcal{R}$.

Transitionen in VM' :

- Für $VM' \xrightarrow{\text{coin}} VM'_1$ wähle $VM \xrightarrow{\text{coin}} VM_1$ und $(VM'_1, VM_1) \in \mathcal{R}$.
- Für $VM' \xrightarrow{\text{coin}} VM'_2$ wähle $VM \xrightarrow{\text{coin}} VM_1$ und $(VM'_2, VM_1) \in \mathcal{R}$.

- Betrachte $(VM'_1, VM_1) \in \mathcal{R}$.

Transitionen in VM'_1 :

- Für $VM'_1 \xrightarrow{\text{coffee}} VM'$ wähle $VM_1 \xrightarrow{\text{coffee}} VM$ und $(VM', VM) \in \mathcal{R}$.

- Betrachte $(VM'_2, VM_1) \in \mathcal{R}$.

Transitionen in VM'_2 :

- Für $VM'_2 \xrightarrow{\text{coin}} VM'_3$ wähle $VM_1 \xrightarrow{\text{coin}} VM_2$ und $(VM'_3, VM_2) \in \mathcal{R}$.

- Betrachte $(VM'_3, VM_2) \in \mathcal{R}$.

Transitionen in VM'_3 :

- Für $VM'_3 \xrightarrow{\text{tea}} VM'$ wähle $VM_2 \xrightarrow{\text{tea}} VM$ und $(VM', VM) \in \mathcal{R}$.

Da \mathcal{R} eine starke Simulation ist und $(VM', VM) \in \mathcal{R}$, können wir folgern, dass VM' von VM stark simuliert wird ($VM' \lesssim VM$).

\Lösung

Aufgabe 4: Starke Bisimulation III

Beweise oder widerlege für die folgenden Aussagen. Falls sie nicht gelten, gib an unter welchen Bedingungen sie gelten würden.

4.a) Wenn $P \sim Q$, dann $(P + R) \sim (Q + R)$

Gilt.

Aus $P \sim Q$ folgt: Es gibt eine starke Bisimulation \mathcal{B}_{PQ} mit $(P, Q) \in \mathcal{B}_{PQ}$.

Sei $\mathcal{B} = \mathcal{B}_{PQ} \cup \text{Id}_{\text{Proc}} \cup \{ (P + R, Q + R) \}$.

Wir zeigen, dass \mathcal{B} eine starke Bisimulation ist.

- Betrachte $\mathcal{B}_{PQ} \subseteq \mathcal{B}$.
 - \mathcal{B}_{PQ} ist bereits nach Voraussetzung eine Bisimulation.
- Betrachte $\text{Id}_{\text{Proc}} \subseteq \mathcal{B}$.
 - Id_{Proc} ist per Definition eine Bisimulation.
- Betrachte $(P + R, Q + R) \in \mathcal{B}$.
 - Transitionen in $P + R$:
 1. Fall: SUM1

$$\text{SUM1} \frac{\overline{P \xrightarrow{a} P'}}{P + R \xrightarrow{a} P'}$$

wegen $P \sim Q$ gibt es auch einen Übergang $Q \xrightarrow{a} Q'$. Also gibt es auch einen Übergang in $Q + R$

$$\text{SUM1} \frac{\overline{Q \xrightarrow{a} Q'}}{Q + R \xrightarrow{a} Q'}$$

und $(P', Q') \in \mathcal{B}_{PQ}$.

2. Fall: SUM2

$$\text{SUM2} \frac{\overline{R \xrightarrow{b} R'}}{P + R \xrightarrow{b} R'}$$

in $Q + R$ gibt es den Übergang

$$\text{SUM2} \frac{\overline{R \xrightarrow{b} R'}}{Q + R \xrightarrow{b} R'}$$

und $(R', R') \in \text{Id}_{\text{Proc}}$.

– Transitionen in $Q + R$:

Da $P + R$ und $Q + R$ die gleiche Struktur haben, läuft dieser Fall analog ab.

Da \mathcal{B} eine starke Bisimulation ist und $(P + R, Q + R) \in \mathcal{B}$, können wir folgern, dass $P + R \sim Q + R$.

----- Lösung -----

4.b) $(a.0 + b.P) \setminus \{ a \} \sim b.P$

----- Lösung -----

Gilt nicht; Gegenbeispiel: $P \stackrel{\text{def}}{=} a.0$.

Unter der Bedingung, dass weder die Aktion a , noch ihre co-Aktion \bar{a} in P enthalten ist, gilt diese Bisimulation.

----- Lösung -----

4.c) $(P + Q)[f] \sim (P[f] + Q[f])$

----- Lösung -----

Gilt.

Sei $\mathcal{B} = \text{Id}_{\text{Proc}} \cup \{ ((P + Q)[f], P[f] + Q[f]) \}$.

- Betrachte $\text{Id}_{\text{Proc}} \subseteq \mathcal{B}$.
 - Id_{Proc} ist per Definition eine Bisimulation.
- Betrachte $((P + Q)[f], P[f] + Q[f]) \in \mathcal{B}$.
 - Transitionen in $(P + Q)[f]$:
 1. Fall: SUM1

$$\text{REL} \frac{\text{SUM1} \frac{\overline{P \xrightarrow{a} P'}}{P + Q \xrightarrow{a} P'}}{(P + Q)[f] \xrightarrow{f(a)} P'[f]}$$

in $P[f] + Q[f]$ gibt es den Übergang

$$\text{REL} \frac{\overline{P \xrightarrow{a} P'}}{P[f] \xrightarrow{f(a)} P'[f]} \\ \text{SUM1} \frac{P[f] \xrightarrow{f(a)} P'[f]}{P[f] + Q[f] \xrightarrow{f(a)} P'[f]}$$

und $(P'[f], P'[f]) \in \text{Id}_{\text{Proc}}$.

2. Fall: SUM2

$$\text{SUM2} \frac{\overline{Q \xrightarrow{b} Q'}}{P + Q \xrightarrow{b} Q'} \\ \text{REL} \frac{P + Q \xrightarrow{b} Q'}{(P + Q)[f] \xrightarrow{f(b)} Q'[f]}$$

in $P[f] + Q[f]$ gibt es den Übergang

$$\text{REL} \frac{\overline{Q \xrightarrow{b} Q'}}{Q[f] \xrightarrow{f(b)} Q'[f]} \\ \text{SUM2} \frac{Q[f] \xrightarrow{f(b)} Q'[f]}{P[f] + Q[f] \xrightarrow{f(b)} Q'[f]}$$

und $(Q'[f], Q'[f]) \in \text{Id}_{\text{Proc}}$.

– Transitionen in $P[f] + Q[f]$:

1. Fall: SUM1

$$\text{REL} \frac{\overline{P \xrightarrow{a} P'}}{P[f] \xrightarrow{f(a)} P'[f]} \\ \text{SUM1} \frac{P[f] \xrightarrow{f(a)} P'[f]}{P[f] + Q[f] \xrightarrow{f(a)} P'[f]}$$

in $(P + Q)[f]$ gibt es den Übergang

$$\text{SUM1} \frac{\overline{P \xrightarrow{a} P'}}{P + Q \xrightarrow{a} P'} \\ \text{REL} \frac{P + Q \xrightarrow{a} P'}{(P + Q)[f] \xrightarrow{f(a)} P'[f]}$$

und $(P'[f], P'[f]) \in \text{Id}_{\text{Proc}}$.

2. Fall: SUM2

$$\text{REL} \frac{\overline{Q \xrightarrow{b} Q'}}{Q[f] \xrightarrow{f(b)} Q'[f]} \\ \text{SUM2} \frac{Q[f] \xrightarrow{f(b)} Q'[f]}{P[f] + Q[f] \xrightarrow{f(b)} Q'[f]}$$

in $(P + Q)[f]$ gibt es den Übergang

$$\text{SUM2} \frac{\overline{Q \xrightarrow{b} Q'}}{P + Q \xrightarrow{b} Q'} \\ \text{REL} \frac{P + Q \xrightarrow{b} Q'}{(P + Q)[f] \xrightarrow{f(b)} Q'[f]}$$

und $(Q'[f], Q'[f]) \in \text{Id}_{\text{Proc}}$.

Da \mathcal{B} eine starke Bisimulation ist und $((P + Q)[f], P[f] + Q[f]) \in \mathcal{B}$, können wir folgern, dass $(P + Q)[f] \sim P[f] + Q[f]$.

\Lösung

4.d) $\left((a.P \mid \bar{b}.Q) [a/b, b/a] \right) \setminus \{a, b\} \sim 0$



Lösung

Gilt.

Da die Aktionen a und b auf unterster Ebene unter Restriktionen stehen, wäre nur ein COM3 Schritt möglich. Dieser Schritt ist allerdings nicht möglich, da a keine co-Aktion zu b ist.

Lösung

Aufgabe 5: Starke Bisimulation IV



5.a) Wird s_1 von r_1 stark simuliert ($s_1 \lesssim r_1$)?

Lösung

Ja, r_1 simuliert s_1 stark ($s_1 \lesssim r_1$).

Sei $\mathcal{S} = \{ (s_1, r_1), (s_2, r_1), (s_3, r_2), (s_4, r_2) \}$.

- Betrachte $(s_1, r_1) \in \mathcal{S}$.

Transitionen in s_1 :

- Für $s_1 \xrightarrow{c} s_2$ wähle $r_1 \xrightarrow{c} r_1$ und $(s_2, r_1) \in \mathcal{S}$.
- Für $s_1 \xrightarrow{a} s_3$ wähle $r_1 \xrightarrow{a} r_2$ und $(s_3, r_2) \in \mathcal{S}$.

- Betrachte $(s_2, r_1) \in \mathcal{S}$.

Transitionen in s_2 :

- Für $s_2 \xrightarrow{c} s_1$ wähle $r_1 \xrightarrow{c} r_1$ und $(s_1, r_1) \in \mathcal{S}$.

- Betrachte $(s_3, r_2) \in \mathcal{S}$.

Transitionen in s_3 :

- Für $s_3 \xrightarrow{c} s_4$ wähle $r_2 \xrightarrow{c} r_2$ und $(s_4, r_2) \in \mathcal{S}$.

- Betrachte $(s_4, r_2) \in \mathcal{S}$.

Transitionen in s_4 :

- Für $s_4 \xrightarrow{c} s_3$ wähle $r_2 \xrightarrow{c} r_2$ und $(s_3, r_2) \in \mathcal{S}$.
- Für $s_4 \xrightarrow{b} s_2$ wähle $r_2 \xrightarrow{b} r_1$ und $(s_2, r_1) \in \mathcal{S}$.

Lösung

5.b) Wird r_1 von s_1 stark simuliert ($r_1 \lesssim s_1$)?

Lösung

s_1 simuliert r_1 nicht stark.



Angenommen s_1 simuliert r_1 stark, dann existiert eine Simulation \mathcal{R} mit $(r_1, s_1) \in \mathcal{R}$. Mit dem Übergang \xrightarrow{c} muss dann auch gelten, dass $(r_1, s_2) \in \mathcal{R}$. Da nun aber gilt, dass $r_1 \xrightarrow{a}$, aber $s_2 \not\xrightarrow{a}$, kann diese Simulation nicht existieren.

r_1 und s_1 simulieren sich nicht gegenseitig stark. Gilt, da s_1 r_1 nicht stark simuliert.

r_1 und s_1 sind nicht stark bisimilar. Gilt, da s_1 r_1 nicht stark simuliert.

Lösung

Aufgabe 6: Starke Bisimulation V



Beweise, dass $s \sim t$ gilt.

Lösung

Sei $\mathcal{R} = \{ (s, t), (s_1, t_1), (s_3, t_2), (s_4, t_2), (s_2, t_3), (s_4, t_4) \}$.

- Betrachte $(s, t) \in \mathcal{R}$.
Transitionen in s :
 - Für $s \xrightarrow{a} s_1$ wähle $t \xrightarrow{a} t_1$ und $(s_1, t_1) \in \mathcal{R}$.
 - Für $s \xrightarrow{a} s_2$ wähle $t \xrightarrow{a} t_3$ und $(s_2, t_3) \in \mathcal{R}$.
 Transitionen in t :
 - Für $t \xrightarrow{a} t_1$ wähle $s \xrightarrow{a} s_1$ und $(s_1, t_1) \in \mathcal{R}$.
 - Für $t \xrightarrow{a} t_3$ wähle $s \xrightarrow{a} s_2$ und $(s_2, t_3) \in \mathcal{R}$.
- Betrachte $(s_1, t_1) \in \mathcal{R}$.
Transitionen in s_1 :
 - Für $s_1 \xrightarrow{a} s_3$ wähle $t_1 \xrightarrow{a} t_2$ und $(s_3, t_2) \in \mathcal{R}$.
 - Für $s_1 \xrightarrow{b} s_4$ wähle $t_1 \xrightarrow{b} t_2$ und $(s_4, t_2) \in \mathcal{R}$.
 Transitionen in t_1 :
 - Für $t_1 \xrightarrow{a} t_2$ wähle $s_1 \xrightarrow{a} s_3$ und $(s_3, t_2) \in \mathcal{R}$.
 - Für $t_1 \xrightarrow{b} t_2$ wähle $s_1 \xrightarrow{b} s_4$ und $(s_4, t_2) \in \mathcal{R}$.
- Betrachte $(s_3, t_2) \in \mathcal{R}$.
Transitionen in s_3 :
 - Für $s_3 \xrightarrow{a} s$ wähle $t_2 \xrightarrow{a} t$ und $(s, t) \in \mathcal{R}$.
 Transitionen in t_2 :
 - Für $t_2 \xrightarrow{a} t$ wähle $s_3 \xrightarrow{a} s$ und $(s, t) \in \mathcal{R}$.
- Betrachte $(s_4, t_2) \in \mathcal{R}$.
Transitionen in s_4 :
 - Für $s_4 \xrightarrow{a} s$ wähle $t_2 \xrightarrow{a} t$ und $(s, t) \in \mathcal{R}$.
 Transitionen in t_2 :
 - Für $t_2 \xrightarrow{a} t$ wähle $s_4 \xrightarrow{a} s$ und $(s, t) \in \mathcal{R}$.
- Betrachte $(s_2, t_3) \in \mathcal{R}$.
Transitionen in s_2 :
 - Für $s_2 \xrightarrow{a} s_4$ wähle $t_3 \xrightarrow{a} t_4$ und $(s_4, t_4) \in \mathcal{R}$.
 Transitionen in t_3 :
 - Für $t_3 \xrightarrow{a} t_4$ wähle $s_2 \xrightarrow{a} s_4$ und $(s_4, t_4) \in \mathcal{R}$.
- Betrachte $(s_4, t_4) \in \mathcal{R}$.
Transitionen in s_4 :
 - Für $s_4 \xrightarrow{a} s$ wähle $t_4 \xrightarrow{a} t$ und $(s, t) \in \mathcal{R}$.
 Transitionen in t_4 :
 - Für $t_4 \xrightarrow{a} t$ wähle $s_4 \xrightarrow{a} s$ und $(s, t) \in \mathcal{R}$.

Da \mathcal{R} eine starke Bisimulation ist und $(s, t) \in \mathcal{R}$, können wir folgern, dass $s \sim t$.

\Lösung