

Übungsblatt 9

mpgi4@cg.tu-berlin.de

WiSe 2014/2015

Aufgabe 1: Komplexe Zahlen

Die Menge der geordneten Paare (a, b) von reellen Zahlen zusammen mit den beiden Verknüpfungen

$$(a, b) + (c, d) := (a + c, b + d) \quad (1a)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ad + bc) \quad (1b)$$

definiert den Körper \mathbb{C} der *komplexen Zahlen*. Ist $z = (a, b)$ eine komplexen Zahl, so bezeichnet man mit $\Re(z) := a$ den *Realteil* und mit $\Im(z) := b$ den *Imaginärteil* von z . Identifiziert man jede reelle Zahl $x \in \mathbb{R}$ mit der komplexen Zahl $(x, 0)$, so kann man \mathbb{R} als Teilkörper der komplexen Zahlen auffassen. Bezeichnet man nun die komplexe Zahl $(0, 1)$ mit i , so gilt $i^2 = -1$ und jede komplexe Zahl $z = (a, b)$ kann eindeutig in der Form $z = a + bi$ geschrieben werden.

Rechnen mit komplexen Zahlen Beim Rechnen mit komplexen Zahlen kann man (meistens) wie im Reellen verfahren und i^2 durch -1 ersetzen, wenn es auftritt:

Addition:

$$(a + bi) + (c + di) = a + bi + c + di = (a + c) + (b + d)i \quad (2a)$$

Subtraktion

$$(a + bi) - (c + di) = a + bi - c + di = (a - c) + (b - d)i \quad (2b)$$

Multiplikation

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i \quad (2c)$$

Division

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{a + bi}{c + di} \cdot \frac{c - di}{c - di} = \frac{ac - adi + bci - bdi^2}{c^2 - (di)^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i \quad (2d)$$

Absolutbetrag Der *Absolutbetrag* einer komplexen Zahl $z = a + bi$ ist definiert als:

$$|z| = |a + bi| := \sqrt{a^2 + b^2} \quad (3)$$

Für alle $z \in \mathbb{C}$ ist also $|z| \geq 0$ und es gilt $|z| = 0$ genau dann wenn $z = 0$ ist. Außerdem gelten die folgenden Rechenregeln:

a) $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$

b) $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}$ (für $w \neq 0$)

c) $|z + w| \leq |z| + |w|$

Konjugation Die zu einer komplexen Zahl $z = a + bi$ *konjugierte* komplexe Zahl ist definiert als:

$$\bar{z} = \overline{a + bi} := a - bi \quad (4)$$

Es gelten die folgenden Rechenregeln:

a) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$

b) $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$

c) $\bar{\bar{z}} = z$

d) $\bar{z} \cdot z = |z|^2$

Mit Hilfe der konjugierten einer komplexen Zahl $z \neq 0$, lässt sich deren Inverses besonders einfach darstellen:

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad (5)$$

Außerdem gilt:

$$\Re(z) = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad \text{und} \quad \Im(z) = \frac{z - \bar{z}}{2}, \quad (6)$$

woraus insbesondere folgt, dass $z = \bar{z}$ genau dann gilt, wenn die komplexe Zahl z reell ist, d.h., wenn $\Im(z) = 0$ ist.

Für eine komplexwertige Matrix mit m Zeilen und n Spalten

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{m \times n} \quad (7)$$

wird mit

$$A^* = \overline{A}^T = \begin{pmatrix} \overline{a_{11}} & \cdots & \overline{a_{1m}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{a_{n1}} & \cdots & \overline{a_{nn}} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times m} \quad (8)$$

die *konjugiert-transponierte Matrix* von A bezeichnet. Für eine komplexe Zahl z wird daher auch oft die Schreibweise z^* für die Konjugierte verwendet.

Aufgabe 2: Exponentialfunktion und trigonometrische Funktionen

Die Exponentialfunktion und die trigonometrischen Funktionen Sinus und Kosinus werden für komplexe Zahlen wie im Reellen mittels Reihendarstellung definiert:

$$\exp(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \quad \sin(z) := \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \cos(z) := \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!} \quad (9)$$

Im Reellen konvergieren die Reihen absolut. Für beliebige komplexen Zahlen konvergieren somit auch die Reihen der Real- und Imaginärteile absolut, woraus die absolute Konvergenz im komplexen folgt. Es gilt $\exp(0) = 1$, $\exp(1) = e$, wobei $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ die Eulerschen Zahl bezeichnet, und

$$\exp(z) \cdot \exp(w) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{w^k}{k!} \right) \stackrel{1}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\nu=0}^k \frac{z^{\nu}}{\nu!} \frac{w^{k-\nu}}{(k-\nu)!} \quad (10a)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{\nu=0}^k \binom{k}{\nu} z^{\nu} w^{k-\nu} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z+w)^k}{k!} = \exp(z+w) \quad (10b)$$

für alle $z, w \in \mathbb{C}$. Für $\exp(z)$ schreibt man daher auch oft e^z .

Zwischen der komplexen Exponentialfunktion und den komplexen Sinus- und Kosinusfunktionen besteht ein Zusammenhang. Es gilt die *Eulersche Formel*:

$$\exp(iz) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iz)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^k z^k}{k!} \quad (11a)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k} z^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k+1} z^{2k+1}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad (11b)$$

$$= \cos(z) + i \sin(z) \quad (11c)$$

¹Satz vom Cauchy-Produkt: Königsberger, Konrad. 2001. Analysis 1. 5th ed. Springer. p. 72.

Aus der Reihendarstellung (9) folgt, dass der Sinus eine ungerade Funktion (d.h., $\sin(z) = -\sin(-z)$) und der Kosinus eine gerade Funktion (d.h., $\cos(z) = \cos(-z)$) ist. Entsprechend folgt:

$$\exp(-iz) = \cos(z) - i \sin(z) \quad (12)$$

Wir erhalten somit durch Addition bzw. Subtraktion von (11) und (12) die folgenden Darstellungen der Sinus- und Kosinusfunktionen:

$$\sin(z) = \frac{\exp(iz) - \exp(-iz)}{2i} \quad (13a)$$

$$\cos(z) = \frac{\exp(iz) + \exp(-iz)}{2} \quad (13b)$$

Aus der Eulersche Formel ergibt außerdem eine weitere wichtige Eigenschaft der Exponentialfunktion. Die komplexe Exponentialfunktion ist periodisch mit der komplexen Periode $2\pi i$, denn für $k \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\exp(z + 2\pi i k) = \exp(z) \cdot \exp(2\pi i k) \quad (14a)$$

$$= \exp(z) \cdot (\cos(2\pi k) + i \sin(2\pi k)) = \exp(z) \cdot (1 + i \cdot 0) = \exp(z) \quad (14b)$$

Aufgabe 3: Komplexe Zahlenebene und Polarkoordinaten-Darstellung

Da es sich bei den komplexen Zahlen um Paare von reellen Zahlen handelt, können wir diese als Punkte (bzw. besser Vektoren) in einem zwei-dimensionalen Koordinatensystem graphisch darstellen. Dies erlaubt eine geometrische Interpretation der komplexen Zahlen.

In vielen Fällen ist es dabei einfacher die komplexen Zahlen durch Länge und Winkel, anstatt durch Real- und Imaginärteil, zu beschreiben. Sei $z \neq 0$ eine von Null verschiedene komplexe Zahl und

$$\alpha + \beta i = \frac{z}{|z|}. \quad (15)$$

Dann gibt es einen eindeutig bestimmten Winkel $\varphi \in [0, 2\pi)$, so dass $\alpha = \cos(\varphi)$ und $\beta = \sin(\varphi)$ ist. Der Winkel φ wird als das *Argument* der komplexen Zahl z bezeichnet. Wir erhalten so die *Polarkoordinaten-Darstellung* von z :

$$z = |z| \cdot (\alpha + \beta i) \quad (16a)$$

$$= |z| \cdot (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = |z| \cdot \exp(i\varphi) = |z| e^{i\varphi} \quad (16b)$$

Für den Winkel φ gilt

$$\tan \varphi = \frac{\Im(z)}{\Re(z)} = \frac{\beta}{\alpha} \quad (17)$$

und kann daher mit der Umkehrfunktion des Tangents berechnet werden. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden die richtige Lösung auszuwählen. Viele Programmiersprachen definieren hierfür die sogenannte `atan2` Funktion, die abhängig vom Quadranten die richtige Lösung auswählt:


$$\text{atan2}(y, x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & y \geq 0, x < 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & y < 0, x < 0 \\ +\frac{\pi}{2} & x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & x = 0, y < 0 \\ \text{undefiniert} & x = 0, y = 0 \end{cases} \quad (18)$$

Addition und Subtraktion: Die Addition und Subtraktion von komplexen Zahlen entspricht geometrisch der normalen Addition bzw. Subtraktion von Vektoren (Abbildung 1b).


Multiplikation: Sei $z = |z| e^{i\varphi}$ und $w = |w| e^{i\psi}$. Dann erhalten wir:

$$zw = |z| \cdot |w| \cdot e^{i\varphi} \cdot e^{i\psi} = |z| \cdot |w| \cdot e^{i(\varphi+\psi)} \quad (19)$$


Bei der Multiplikation werden also die Längen multipliziert und die Winkel addiert (Abbildung 1c).




(a) Polarkoordinaten



(b) Addition



(c) Multiplikation



(d) Division

Abbildung 1: Geometrische Veranschaulichung der komplexen Zahlen.

Division: Sei $z = |z| e^{i\varphi}$ und $w = |w| e^{i\psi}$. Dann erhalten wir:

$$\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|} \cdot \frac{e^{i\varphi}}{e^{i\psi}} = \frac{|z|}{|w|} e^{i(\varphi-\psi)} \quad (20)$$

Bei der Division werden also die Längen durcheinander dividiert und die Winkel von einander subtrahiert (Abbildung 1d).

Konjugation: Die Konjugation entspricht einer Spiegelung an der reellen Achse.