Aufgabe 7

Import der Bibliotheken & Quelldaten

```
In [2]:
```

```
# Standard Python Math Bibliothek.
import math

# Lädt Matplotlib, eine Bibliothek zum Estellen von Plots & Diagrammen.
import matplotlib.pyplot as plt

# Matplotlib Plots sollen direkt im Notebook erscheinen.
%matplotlib inline

# Lädt NumPy, eine Bibliothek zur numerischen Analyse.
import numpy as np
np.random.seed(102)

# Lädt Pandas, eine Bibliothek zur Analyse von strukturierten Daten.
import pandas as pd
```

In [38]:

```
housing_df = pd.read_csv("housing.csv", sep=';', index_col=False)
print "Housing:\n", housing_df.dtypes
```

```
Housing:
crim
           float64
zn
           float64
indus
           float64
chas
              int64
nox
           float64
rm
           float64
           float64
age
           float64
dis
rad
           float64
tax
           float64
ptratio
           float64
           float64
lstat
           float64
medv
           float64
dtype: object
```

1. Basisstatistiken der Stickstoffkonzentration:

In [12]:

```
max_nox = housing_df.nox.max()
print "Maximum: ", max_nox
min_nox = housing_df.nox.min()
print "Minimum: ", min_nox
mean_nox = housing_df.nox.mean()
print "Mittelwert: ", mean_nox
median_nox = housing_df.nox.median()
print "Median: ", median_nox
stderr_nox = np.sqrt(housing_df.nox.var())
print "Standardabweichung: ", stderr_nox
```

Maximum: 0.871 Minimum: 0.385

Mittelwert: 0.554695059289

Median: 0.538

Standardabweichung: 0.115877675668

2. Stickstoffkonzentration und Kriminalität

In [21]:

```
avg_crim_over = housing_df[housing_df.nox > 0.53].crim.mean()
avg_crim_below = housing_df[housing_df.nox <= 0.53].crim.mean()

print "Durchschnittliche Kriminalitätsrate für Bezirke über dem Grenzwert:
    ", avg_crim_over
print "Durchschnittliche Kriminalitätsrate für Bezirke unter dem Grenzwert:
    ", avg_crim_below</pre>
```

Durchschnittliche Kriminalitätsrate für Bezirke über dem Grenzw ert: 6.86128145038

Durchschnittliche Kriminalitätsrate für Bezirke unter dem Grenzwert: 0.126176967213

3. Verhaltensändernde Wirkung der Stickstoffkonzentration

Nein: Korrelation impliziert keinen kausalen Zusammenhang


Es ist ebenso möglich, dass andere Faktoren, die wir nicht untersucht haben für den Zusammenhang verantwortlich sind.

4. Mittlerer Wert von Häusern

housing df.medv.hist()

Out[22]:

<matplotlib.axes.AxesSubplot at 0x10b9a2210>



Aus dem Histogramm lassen sich die Häufigkeiten (y-Achse) der verschiedenen Wertbereiche für Häuser (x-Achse) pro Vorort ablesen. Beispielsweise gibt es knapp über 150 Vororte wo der durchschnittliche Wert der Häuser bei knapp über 20000 Dollar liegt. Das Histogramm scheint in etwa eine Normalverteilung abzubilden, allerdings ist auffällig, dass es im Bereich der sehr hohen durchschnittlichen Werte noch einen Aussschlag nach oben gibt.

5. Korrelationskoeffizient des Mittleren Wertes der Häuser

```
korr crim = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.crim)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für crim: ", korr crim
zn crim = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.zn)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für zn: ", zn crim
korr indus = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.indus)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für indus: ", korr indus
korr chas = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.chas)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für chas: ", korr chas
korr nox = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.nox)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für nox: ", korr nox
korr rm = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.rm)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für rm: ", korr rm
korr age = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.age)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für age: ", korr age
korr dis = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.dis)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für dis: ", korr dis
korr rad = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.rad)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für rad: ", korr rad
korr tax = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.tax)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für tax: ", korr tax
korr ptratio = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.ptratio)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für ptratio: ", korr ptratio
korr b = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.b)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für b: ", korr b
korr lstat = np.corrcoef(housing df.medv, housing df.lstat)[0, 1]
print "Pearson's Korrelationskoeffizient für lstat: ", korr lstat
```

```
Pearson's Korrelationskoeffizient für crim: -0.388304608587
Pearson's Korrelationskoeffizient für zn: 0.360445342451
Pearson's Korrelationskoeffizient für indus: -0.483725160028
Pearson's Korrelationskoeffizient für chas: 0.17526017719
Pearson's Korrelationskoeffizient für nox: -0.427320772373
Pearson's Korrelationskoeffizient für rm: 0.695359947072
Pearson's Korrelationskoeffizient für age: -0.376954565005
Pearson's Korrelationskoeffizient für dis: 0.249928734086
Pearson's Korrelationskoeffizient für rad: -0.38162623064
Pearson's Korrelationskoeffizient für tax: -0.468535933568
Pearson's Korrelationskoeffizient für ptratio: -0.507786685538
Pearson's Korrelationskoeffizient für b: 0.333460819657
Pearson's Korrelationskoeffizient für lstat: -0.737662726174
```


6. Scatterplot des Zusammenhangs zwischen MEDV und LSTAT

In [26]:

```
housing_df.plot(kind='scatter', x='lstat', y='medv')
```

Out[26]:

<matplotlib.axes.AxesSubplot at 0x10eb60810>



Dass die beiden Parameter negativ korreliert sind, bedeutet, dass in Vororten mit höheren durchschnittlichen Hauspreisen niedrigere Anteile einkommensschwacher Personen leben und umgekehrt.

7. Zusammenhang von Crim, Nox und Lstat

In [40]:


```
housing_nox_over = housing_df[housing_df.nox > 0.53]
housing_nox_over.plot(kind='scatter', x='lstat', y='crim')
housing_nox_below = housing_df[housing_df.nox <= 0.53]
housing_nox_below.plot(kind='scatter', x='lstat', y='crim')
housing_df.plot(kind='scatter', x='nox', y='crim')
housing_df.plot(kind='scatter', x='lstat', y='crim')
korr_lstat_crim= np.corrcoef(housing_df.crim, housing_df.lstat)[0, 1]
korr_nox_crim= np.corrcoef(housing_df.crim, housing_df.nox)[0, 1]
korr_lstat_nox= np.corrcoef(housing_df.nox, housing_df.lstat)[0, 1]
print "Korrelationskoeffizient von Kriminalität und niedrigem Einkommen: ",
korr_lstat_crim
print "Korrelationskoeffizient von Kriminalität und Stickstoffkonzentratio
n", korr_nox_crim
print "Korrelationskoeffizient von niedrigem Einkommen und Stickstoffkonzen
tration", korr_lstat_nox
```


Korrelationskoeffizient von Kriminalität und niedrigem Einkomme n: 0.455621479448

Korrelationskoeffizient von Kriminalität und Stickstoffkonzentration 0.420971711392

Korrelationskoeffizient von niedrigem Einkommen und Stickstoffk

onzentration 0.590878920881





Der letzte Plot zeigt den Zusammenhang zwischen der Kriminalität und dem Anteil der Personen mit niedrigem Einkommen. Die Grafik deutet auf einen leicht positiven Zusammenhang hin, das heißt je mehr Personen mit niedrigem Einkommen in einem Vorort leben, desto höher ist dort die Kriminalität. Dies deckt sich auch eher mit bisherigen Forschungsergebnissen, als ein Zusammenhang mit der Stickstoffkonzentration (wir weiter oben untersucht).

Deswegen ist zu vermuten, dass der kausale Zusammenhang nicht zwischen NOX und CRIM besteht, sondern die Ursache für eine festgestellte Korrelation durch eine oder mehrerer andere Größen bedingt ist. Ein möglicher Zusammenhang wäre etwa über die Lage im Verhältnis zu Industriegebieten: Bezirke nahe einem Industriegebiet haben eine höhere Konzentration an Schadstoffen in der Luft. Zudem wohnen dort eher die Arbeiter aus den Fabriken, welche eher zu den einkommensschwachen Haushalten zählen.